

# ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Ι

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2011 - 2012

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ν. Μαρμαρίδης - Α. Μπεληγιάννης

ΒΟΗΘΟΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Χ. Ψαρουδάκης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ :

<http://www.math.uoi.gr/~abeligia/LinearAlgebraI/LAI.html>

**21 - 2 - 2012**

<b>Μέρος 1. Ασκήσεις Προς Λύση</b>	<b>4</b>
1. Φυλλάδιο 1 - 16/11/2011	4
2. Φυλλάδιο 2 - 23/11/2011	5
3. Φυλλάδιο 3 - 30/11/2011	7
4. Φυλλάδιο 4 - 14/12/2011	9
5. Φυλλάδιο 5 - 21/12/2011	11
6. Φυλλάδιο 6 - 1/1/2012	13
7. Φυλλάδιο 7 - 25/1/2012	15
8. Φυλλάδιο 8 - 8/2/2012	17
9. Φυλλάδιο 9 - 15/2/2012	19
<b>Μέρος 2. Προτεινόμενες Ασκήσεις Προς Λύση</b>	<b>22</b>
10. Φυλλάδιο 1 - 16/11/2011	22
11. Φυλλάδιο 2 - 23/11/2011	24
12. Φυλλάδιο 3 - 30/11/2011	26
13. Φυλλάδιο 4 - 14/12/2011	28
14. Φυλλάδιο 5 - 21/11/2011	30
15. Φυλλάδιο 6 - 11/1/2012	32
16. Φυλλάδιο 7 - 25/1/2012	33
17. Φυλλάδιο 8 - 8/2/2012	35
18. Φυλλάδιο 9 - 15/2/2012	37
<b>Μέρος 3. Συμπληρωματικές Ασκήσεις</b>	<b>39</b>
<b>Μέρος 4. Δοκιμασία 15 Λεπτών στην Τάξη</b>	<b>51</b>
19. Δοκιμασία 1 - 16/11/2011	51
20. Δοκιμασία 2 - 23/11/2011	51
21. Δοκιμασία 3 - 30/11/2011	51
22. Δοκιμασία 4 - 7/11/2011	52
23. Δοκιμασία 5 - 14/11/2011	52
24. Δοκιμασία 6 - 21/11/2011	52
25. Δοκιμασία 7 - 11/1/2012	52
26. Δοκιμασία 8 - 18/1/2012	53
27. Δοκιμασία 9 - 28/1/2012	53
28. Δοκιμασία 10 - 8/2/2012	53
29. Δοκιμασία 11 - 15/2/2012	54
<b>Μέρος 5. Λύσεις Δοκιμασιών 15 Λεπτών στην Τάξη</b>	<b>55</b>
30. Δοκιμασία 1 - 16/11/2011	55
31. Δοκιμασία 2 - 23/11/2011	55
32. Δοκιμασία 3 - 30/11/2011	56
33. Δοκιμασία 4 - 7/11/2011	57
34. Δοκιμασία 5 - 14/11/2011	57
35. Δοκιμασία 6 - 21/11/2011	58
36. Δοκιμασία 7 - 11/1/2012	59

37. Δοκιμασία 8 - 18/1/2012	60
38. Δοκιμασία 9 - 28/1/2012	61
39. Δοκιμασία 10 - 8/2/2012	62
40. Δοκιμασία 11 - 15/2/2012	65
<b>Μέρος 6. Επίλυση Επιλεγμένων Ασκήσεων</b>	<b>68</b>
41. Φυλλάδιο 1 - 22/11/2011	68
42. Φυλλάδιο 2 - 22/11/2011	72
43. Φυλλάδιο 3 - 6/12/2011	76
44. Φυλλάδιο 4 - 21/12/2011	84
45. Φυλλάδιο 5 - 19/1/2012	90
46. Φυλλάδιο 6 - 19/1/2012	93
47. Φυλλάδιο 7 - 23/1/2012	96
48. Φυλλάδιο 8 - 6/2/2012	99
49. Φυλλάδιο 9 - 15/2/2012	107
50. Φυλλάδιο 10 - 20/2/2012	115
<b>Μέρος 7. Θεωρητικά Θέματα</b>	<b>127</b>
51. Ορίζουσα Γενικευμένων άνω Τριγωνικών Πινάκων	127
52. Βαθμίδα Γραμμών και Βαθμίδα Στηλών	128

## Μέρος 1. Ασκήσεις Προς Λύση

### 1. Φυλλάδιο 1 - 16/11/2011

**Άσκηση 1.** Να γράψετε αναλυτικά τον  $6 \times 6$  πίνακα  $A = (a_{ij})$  όπου  $a_{ij} = \min\{i, j\} + i - j$ .

**Άσκηση 2.** Δίνονται οι πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Να εκτελεστούν, όπου είναι δυνατόν, οι ακόλουθοι πολλαπλασιασμοί πινάκων:

$$A \cdot B, \quad B \cdot A, \quad A \cdot C, \quad C \cdot A, \quad B \cdot C$$

**Άσκηση 3.** Έστω οι πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Να προσδιοριστεί  $3 \times 3$  πίνακας  $X$ , ο οποίος να ικανοποιεί την εξίσωση:

$$A + 3X = 2(X - B)$$

**Άσκηση 4.** Έστω  $n \in \mathbb{N}$  με  $n \geq 2$ . Ας είναι  $AT_n(\mathbb{K})$  (αντιστοίχως  $KT_n(\mathbb{K})$ ) το σύνολο των άνω (αντιστοίχως κάτω) τριγωνικών  $n \times n$  πινάκων με στοιχεία από το σώμα  $\mathbb{K}$ .

Να δείχθει ότι η τομή  $AT_n(\mathbb{K}) \cap KT_n(\mathbb{K})$  των δύο αυτών συνόλων ισούται με το σύνολο των διαγωνίων πινάκων.

**Άσκηση 5.** Δίνεται ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ . Να δείξετε ότι  $A^4 = I_3$  και ο ακολούθως να δείξετε ότι

ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος. Στην συνέχεια να βρείτε τους πίνακες  $A^{-1}$  και  $A^{2011}$ .

**Άσκηση 6.** Έστω  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Βρείτε τον πίνακα  $A^n$ ,  $n \in \mathbb{N}$ .

**Άσκηση 7.** Για κάθε  $n \geq 1$ , να βρείτε την  $n$ -οστή δύναμη του πίνακα  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

**Άσκηση 8.** Έστω  $A, B$  δύο αντιστρέψιμοι  $n \times n$  πίνακες έτσι ώστε ο πίνακας  $A + B^{-1}$  να είναι αντιστρέψιμος. Δείξτε ότι ο πίνακας  $A^{-1} + B$  είναι αντιστρέψιμος και ισχύει:

$$(A^{-1} + B)^{-1} = A \cdot (A + B^{-1})^{-1} \cdot B^{-1}$$

**Άσκηση 9.** Αν  $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}$ , να υπολογίσετε τον  $A^2$  και να αποδείξετε ότι  $A^2 - 2A - 8I_2 = 0$ .

**Άσκηση 10.** Έστω  $A$  και  $B$  δύο  $n \times n$  πίνακες τέτοιοι ώστε ο πίνακας  $I_n - (A \cdot B)^2$  να είναι αντιστρέψιμος. Δείξτε ότι

$$(I_n - (B \cdot A)^2)^{-1} = I_n + B \cdot (I_n - (A \cdot B)^2)^{-1} \cdot A \cdot B \cdot A$$

**Άσκηση 11.** Αν για τον  $n \times n$  πίνακα  $A$  ισχύει  $A^4 - A^3 + A^2 - A + I_n = 0$ , να δείξετε ότι:  $A^{-1} = -A^4$ .

**Άσκηση 12.** Θεωρούμε τους  $n \times n$  πίνακες  $A$  και  $B$ , και υποθέτουμε ότι ο  $B$  είναι αντιστρέψιμος και ισχύει:  $A + B = A \cdot B$ . Να δείξετε ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και ισχύει:  $A^{-1} + B^{-1} = I_n$ .

**Άσκηση 13.** Έστω  $A, B$  δύο  $m \times n$  πίνακες. Για ποιές τιμές των  $m, n \in \mathbb{N}$  ισχύει:

$$A = B \iff \text{tr}(A) = \text{tr}(B);$$

**Άσκηση 14.** Έστω  $A, B, C$  τρεις πίνακες έτσι ώστε να ορίζονται οι πίνακες  $A \cdot B$  και  $B \cdot C$ . Να δείξετε ότι ορίζονται οι πίνακες  $A \cdot (B \cdot C)$ ,  $(A \cdot B) \cdot C$  και επιπλέον ισχύει:  $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ .

## 2. Φυλλάδιο 2 - 23/11/2011

**Άσκηση 15.** Να υπολογίσετε την ορίζουσα του ακόλουθου πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 4 \\ 2 & -1 & 4 & -8 \\ 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 16.** Να υπολογίσετε την ορίζουσα του ακόλουθου πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 17.** Να υπολογίσετε την ορίζουσα  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \beta + \gamma & \gamma + \alpha & \alpha + \beta \end{vmatrix}$ .

**Άσκηση 18.** Αν  $\alpha, \beta$  και  $\gamma$  είναι πραγματικοί αριθμοί, τότε να δείξετε ότι

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha^2 & \beta^2 & \gamma^2 \end{vmatrix} = (\beta - \alpha)(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta) \quad (\text{ορίζουσα VANDERMONDE}).$$

**Άσκηση 19.** Να υπολογίσετε την ορίζουσα  $\begin{vmatrix} 1 + \alpha_1\beta_1 & 1 + \alpha_1\beta_2 & 1 + \alpha_1\beta_3 \\ 1 + \alpha_2\beta_1 & 1 + \alpha_2\beta_2 & 1 + \alpha_2\beta_3 \\ 1 + \alpha_3\beta_1 & 1 + \alpha_3\beta_2 & 1 + \alpha_3\beta_3 \end{vmatrix}$ .

**Άσκηση 20.** Θεωρούμε έναν πίνακα  $A \in \mathbb{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R})$  ο οποίος ικανοποιεί την σχέση:

$$A^2 + 2 \cdot A = \mathbb{O}$$

Να δείξετε ότι ο πίνακας  $A + I_3$  είναι αντιστρέψιμος, να βρείτε τον  $(A + I_3)^{-1}$ , και να υπολογίσετε την ορίζουσα  $|A|$  του  $A$ .

**Άσκηση 21.** Να ληθεί η εξίσωση  $\begin{vmatrix} 2-x & 1 & i \\ 1 & 2-x & i \\ -i & -i & 2-x \end{vmatrix} = 0$ , όπου  $i^2 = -1$ .

**Άσκηση 22.** Να υπολογισθεί η  $n \times n$  ορίζουσα  $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$ .

**Άσκηση 23.** Να υπολογισθεί η  $n \times n$  ορίζουσα  $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 3 & 2 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 3 \end{vmatrix}$ .

**Άσκηση 24.** Να υπολογισθεί η  $n \times n$  ορίζουσα  $A = \begin{pmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{pmatrix}$ .

**Άσκηση 25.** Να υπολογισθεί η  $2n \times 2n$  ορίζουσα  $\begin{vmatrix} \alpha & 0 & \cdots & 0 & \beta \\ 0 & \alpha & \cdots & \beta & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \beta & \cdots & \alpha & 0 \\ \beta & 0 & \cdots & 0 & \alpha \end{vmatrix}$ .

**Άσκηση 26.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του ακόλουθου  $n \times n$  πίνακα  $A$ , όπου  $x \in \mathbb{R}$ :

$$A = \begin{pmatrix} 1+x^2 & x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & 1+x^2 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 1+x^2 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1+x^2 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 1+x^2 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x & 1+x^2 \end{pmatrix}.$$

**Άσκηση 27.** Πόσες διαφορετικές τιμές μπορεί να έχει η ορίζουσα ενός  $5 \times 5$  πίνακα τής μορφής

$$A = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix};$$

(Με «\*» συμβολίζουμε αυθαίρετες τιμές στοιχείων του  $\mathbb{K}$ ).

### 3. Φυλλάδιο 3 - 30/11/2011

**Άσκηση 28.** Έστω  $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ . Αν  $|A| = -3$ , τότε να υπολογισθεί η ορίζουσα  $|-A^4|$ .

**Άσκηση 29.** Έστω  $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  ένας αντισυμμετρικός πίνακας. Αν ο πίνακας  $I_n + A$  είναι αντιστρέψιμος, να εξετάσετε αν και ο πίνακας  $I_n - A$  είναι αντιστρέψιμος.

**Άσκηση 30.** Αν  $A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  και ισχύει  ${}^t A = A^{-1}$ ,  ${}^t B = B^{-1}$ , να δείξετε ότι:

$$|(A+B) \cdot (A-B)| = |{}^t A \cdot B - {}^t B \cdot A|$$

**Άσκηση 31.** Έστω  $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  έτσι ώστε  ${}^t A = A$ . Να δείξετε ότι  ${}^t(\text{adj} A) = \text{adj} A$ .

**Άσκηση 32.** Έστω  $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  αντιστρέψιμος πίνακας με  $n \geq 2$ . Να αποδειχθεί ότι

$$|\text{adj} A| = |A|^{n-1}$$

**Άσκηση 33.** Έστω  $A \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  αντιστρέψιμος πίνακας με  $n \geq 2$ . Να αποδειχθεί ότι

$$\text{adj}(\text{adj} A) = |A|^{n-2} \cdot A$$

**Άσκηση 34.** Να βρεθεί η ισχυρά κλιμακωτή μορφή του πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

Ακολουθώντας, αν ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος, να βρεθεί ο  $A^{-1}$  με χρήση πράξεων επί των γραμμών του.

**Άσκηση 35.** Έστω ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Ναδειχθεί ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και στη συνέχεια

να υπολογισθεί ο  $A^{-1}$ :

- (1) με χρήση του συμπληρωματικού  $\text{adj}A$  του  $A$ ,
- (2) με τη μέθοδο στοιχειωδών μετασχηματισμών επί των γραμμών του πίνακα  $(A|I_3)$ .

**Άσκηση 36.** Αν ένας από τους πίνακες  $A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$  είναι αντιστρέψιμος, τότε ναδειχθεί ότι:

$$|A \cdot B + I_n| = |B \cdot A + I_n|$$

**Άσκηση 37.** Να λύσετε το σύστημα:

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = -1 \end{cases}$$

- (1) με τη μέθοδο Cramer,
- (2) με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss.

**Άσκηση 38.** Ναλυθούν τα συστήματα:

$$(1) \begin{cases} x_1 - 2x_2 + 2x_3 - x_4 = 3 \\ 3x_1 + x_2 + 6x_3 + 11x_4 = 16 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 + 4x_4 = 9 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 4 \\ 3x_1 + 5x_2 + 3x_3 - x_4 = 5 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ 6x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ 12x_1 + 6x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$$(4) x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 - 2x_5 = 3.$$



**Άσκηση 39.** Θεωρούμε το γραμμικό σύστημα  $(\alpha, \beta \in \mathbb{R})$ :

$$(\Sigma) \begin{cases} 2x + y + z = -6\alpha \\ 2x + y + (\beta + 1)z = 4 \\ \beta x + 3y + 2z = 3\alpha \end{cases}$$

1. Να υπολογισθούν οι τιμές του  $\beta$  για τις οποίες το  $(\Sigma)$  έχει μοναδική λύση.
2. Για τις τιμές  $\beta$  για τις οποίες το  $(\Sigma)$  δεν έχει μοναδική λύση, να λύσετε το  $(\Sigma)$  με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss.

**Άσκηση 40.** Αν  $\lambda \in \mathbb{R}$ , να λυθεί το σύστημα:

$$\begin{cases} x - y + z = 3 \\ x + y + \lambda z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \end{cases}$$

**Άσκηση 41.** Αν το πολυώνυμο  $P(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_n t^n$ , όπου  $a_i \in \mathbb{K}$ ,  $i = 0, 1, \dots, n$ , έχει  $n + 1$  διαφορετικές ρίζες, τότε να δείξετε ότι το  $P(t)$  είναι το μηδενικό πολυώνυμο.

#### 4. Φυλλάδιο 4 - 14/12/2011

**Άσκηση 42.** Θεωρούμε το σύνολο  $\mathbb{R}^3$  μαζί με τις πράξεις:

$$\oplus : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y, z) \oplus (x', y', z') = (x + x', y + y', z + z')$$

και

$$\odot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad r \odot (x, y, z) = (0, 0, 0)$$

Να εξετάσετε αν με τις παραπάνω πράξεις το σύνολο  $\mathbb{R}^3$  είναι  $\mathbb{R}$ -διανυσματικός χώρος.

**Άσκηση 43.** Στο σύνολο των  $2 \times 2$  πινάκων  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ , ορίζουμε δυο πράξεις:

$$\oplus : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \times M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad A \oplus B = -(A + B)$$

και

$$\odot : \mathbb{R} \times M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad r \odot A = -(rA)$$

Οι πράξεις στα δεξιά μέλη των ανωτέρω ορισμών είναι οι γνωστές πράξεις πρόσθεσης πινάκων και βαθμωτού πολλαπλασιασμού αριθμού με πίνακα. Να εξετάσετε ποια από τα αξιώματα που διέπουν τον ορισμό του διανυσματικού χώρου ισχύουν και ποια όχι.

**Άσκηση 44.** Στο σύνολο  $\mathbb{C}$  των μιγαδικών αριθμών ορίζουμε τις πράξεις:

$$+ : \mathbb{C} \times \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad (z_1, z_2) \longmapsto z_1 + z_2$$

και

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad (r, z) \longmapsto r \cdot z$$

Να δείξετε ότι η τριάδα  $(\mathbb{C}, +, \cdot)$  είναι διανυσματικός χώρος πάνω από το  $\mathbb{R}$ .

**Άσκηση 45.** Στο σύνολο  $\mathbb{R}^+ = \{r \in \mathbb{R} \mid r > 0\}$  ορίζουμε τις πράξεις:

$$\oplus : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad (a, b) \longmapsto a \oplus b = ab - 1$$

και

$$\odot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad (r, a) \longmapsto r \odot a = a$$

Να εξετάσετε αν η τριάδα  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$  αποτελεί διανυσματικό χώρο πάνω από το  $\mathbb{R}$ .

**Άσκηση 46.** Στο σύνολο  $\mathbb{R}$  των πραγματικών αριθμών ορίζουμε πράξεις:

$$\oplus : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (a, b) \longmapsto a \oplus b = ab$$

και

$$\odot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (\lambda, a) \longmapsto \lambda \odot a = \lambda + a$$

Να εξετάσετε αν η τριάδα  $(\mathbb{R}, \oplus, \odot)$  αποτελεί διανυσματικό χώρο πάνω από το  $\mathbb{R}$ .

**Άσκηση 47.** Ναδειχθεί ότι το υποσύνολο:

$$\mathcal{V} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid c = a - b, d = a + b\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

αποτελεί έναν  $\mathbb{R}$ -υπόχωρο του  $\mathbb{R}^4$ .

**Άσκηση 48.** Να εξετασθεί ποιά από τα ακόλουθα υποσύνολα των αντίστοιχων διανυσματικών χώρων είναι υπόχωροι:

- (1)  $\mathcal{V}_1 = \{(a, b, 1) \in \mathbb{R}^3 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}^3$ .
- (2)  $\mathcal{V}_2 = \{(a, b, a + 2b) \in \mathbb{R}^3 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}^3$ .
- (3)  $\mathcal{V}_3 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a + 2b - c = 0, a, b, c \in \mathbb{R}\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}^3$ .
- (4)  $\mathcal{V}_4 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a \geq 0 \text{ και } c \leq 0\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}^3$ .
- (5)  $\mathcal{V}_5 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid |a| + |b| + |d| = 0\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}^4$ .
- (6)  $\mathcal{V}_6 = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid A^2 = A\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .
- (7)  $\mathcal{V}_7 = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid A^2 = \mathbb{O}\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .
- (8)  $\mathcal{V}_8 = \{f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(1) = 1\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .
- (9)  $\mathcal{V}_9 = \{f : (-1, 1) \longrightarrow \mathbb{R} \mid f(1) = 0\}$ , στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathcal{F}((-1, 1), \mathbb{R})$ .

**Άσκηση 49.** Θεωρούμε το σώμα  $\mathbb{K}$  ως  $\mathbb{K}$ -διανυσματικό χώρο. Να δείξετε ότι οι μόνοι υπόχωροι του  $\mathbb{K}$  είναι οι:  $\{0\}$ , και  $\mathbb{K}$ .

**Άσκηση 50.** Να εξετασθεί ποια από τα παρακάτω υποσύνολα του  $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$  είναι  $\mathbb{R}$ -υπόχωροι:

- (1)  $\mathcal{V}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) \mid b = a + c \right\}$
- (2)  $\mathcal{V}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) \mid c > 0 \right\}$

**Άσκηση 51.** Θεωρούμε τον διανυσματικό χώρο  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  πάνω από το  $\mathbb{R}$  και τα παρακάτω υποσύνολα αυτού:

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & b \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

και

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ d & c+d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

- (1) Να δείξετε ότι οι  $\mathcal{V}$  και  $\mathcal{W}$  είναι υπόχωροι του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .
- (2) Να βρεθεί η μορφή των στοιχείων του υποχώρου  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ .

**Άσκηση 52.** Έστω  $\mathcal{E}$  ένα μη-κενό σύνολο το οποίο είναι εφοδιασμένο με δύο πράξεις:

$$\oplus : \mathcal{E} \times \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}, \quad (x, y) \longmapsto x + y$$

και

$$\odot : \mathbb{K} \times \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}, \quad (\lambda, x) \longmapsto \lambda \odot x$$

- (1) Υποθέτουμε ότι ικανοποιούνται όλα τα αξιώματα (1) - (8), ΕΚΤΟΣ από το αξίωμα:

$$x + y = y + x, \quad \forall x, y \in \mathcal{E} \quad \text{Αξίωμα (2)}$$

Να δείξετε ότι το αξίωμα (2) ικανοποιείται και επομένως η τριάδα  $(\mathcal{E}, +, \cdot)$  αποτελεί έναν  $\mathbb{K}$ -διανυσματικό χώρο.

- (2) Να δείξετε ότι το αξίωμα

$$1 \cdot x = x, \quad \forall x \in \mathcal{E} \quad \text{Αξίωμα (8)}$$

στον ορισμό ενός  $\mathbb{K}$ -διανυσματικού χώρου  $\mathcal{E}$  δεν είναι συνέπεια των αξιωμάτων (1)-(7).

## 5. Φυλλάδιο 5 - 21/12/2011

**Άσκηση 53.** Να δείξετε ότι το διάνυσμα  $\vec{x} = (3, 2, 0)$  του  $\mathbb{R}^3$  είναι γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων  $\vec{x}_1 = (1, 2, 1)$ ,  $\vec{x}_2 = (1, 1, 0)$ ,  $\vec{x}_3 = (0, 2, 1)$ .

**Άσκηση 54.** Να εξετάσετε αν τα διανύσματα  $\vec{x} = (2, -1, 1)$ ,  $\vec{y} = (0, 2, -1)$ ,  $\vec{z} = (1, -1, 0)$  του  $\mathbb{R}^3$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

**Άσκηση 55.** Να εξεταστεί εάν τα διανύσματα  $\vec{u} = (1, 3, -1)$ ,  $\vec{v} = (2, 4, 3)$ , και  $\vec{w} = (5, 9, 10)$  του  $\mathbb{R}^3$  είναι γραμμικά εξαρτημένα και αν είναι να ευρεθεί μια σχέση γραμμικής εξάρτησής τους.

**Άσκηση 56.** Να εξεταστεί εάν τα διανύσματα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \Gamma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \Delta = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα και στην συνέχεια αν παράγουν το χώρο.

**Άσκηση 57.** Αν το σύνολο διανυσμάτων  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  ενός διανυσματικού χώρου είναι γραμμικά ανεξάρτητο να δείξετε ότι το σύνολο

$$\{\vec{e}_1, \vec{e}_1 + \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_1 + \dots + \vec{e}_n\}$$

είναι επίσης γραμμικά ανεξάρτητο.

**Άσκηση 58.** Να προσδιοριστεί μια βάση και η διάσταση του  $\mathbb{R}$ -υπόχωρου

$$\mathcal{V} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid c = a - b, d = a + b\}$$

του  $\mathbb{R}^4$ .

**Άσκηση 59.** Να αποδειχθεί ότι το σύνολο των  $3 \times 3$  διαγωνίων πινάκων με πραγματικές συνιστώσες είναι υπόχωρος του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$  και κατόπιν να προσδιοριστεί μια βάση του.

**Άσκηση 60.** Έστω το ομογενές σύστημα :

$$\begin{cases} 4x_1 + 12x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 9x_2 - 2x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

Να προσδιοριστεί μια βάση του χώρου των λύσεων του συστήματος.

**Άσκηση 61.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\langle \vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3, \vec{x}_4 \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$ , όπου

$$\vec{x}_1 = (1, 1, 2, 4), \quad \vec{x}_2 = (2, -1, -5, 2), \quad \vec{x}_3 = (1, -1, -4, 0), \quad \vec{x}_4 = (2, 1, 1, 5)$$

**Άσκηση 62.** Να προσδιοριστούν όλες οι τιμές του  $a \in \mathbb{R}$ , για τις οποίες το σύνολο των διανυσμάτων

$$\{\vec{x} = (a^2, 0, 1), \vec{y} = (0, a, 2), \vec{z} = (1, 0, 1)\}$$

αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}^3$ .

**Άσκηση 63.** Έστω  $P$  ένας σταθερός αντιστρέψιμος  $3 \times 3$  πίνακας πραγματικών αριθμών. Θεωρούμε το ακόλουθο σύνολο

$$\mathcal{V}(P) = \{A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \mid \text{ο πίνακας } P^{-1}AP \text{ είναι διαγώνιος}\}$$

Να δείξετε ότι το σύνολο  $\mathcal{V}(P)$  είναι ένας υπόχωρος του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$  και ακολούθως να βρείτε μια βάση του.

**Άσκηση 64.** Στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  θεωρούμε τα υποσύνολα

$$\mathcal{F}_E = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{F}_O = \{f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R}\}$$

Να δείξετε ότι τα υποσύνολα  $\mathcal{F}_E$  και  $\mathcal{F}_O$  είναι υπόχωροι του  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$  και να προσδιορισθούν οι υπόχωροι:

$$\mathcal{F}_E + \mathcal{F}_O \quad \text{και} \quad \mathcal{F}_E \cap \mathcal{F}_O$$

**Άσκηση 65.** Έστω  $M$  ένας σταθερός  $2 \times 2$  πίνακας πραγματικών αριθμών. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\mathcal{V}(M) = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}$$

όλων των  $2 \times 2$  πίνακων οι οποίοι μετατίθενται με τον  $M$  είναι ένας υπόχωρος του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Αν

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

να βρείτε μια βάση του  $\mathcal{V}(M)$ .

**Άσκηση 66.** (1) Στον διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}^2$  θεωρούμε τις ακόλουθες δύο βάσεις:

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \left( \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2} \right), \left( -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \right\} \quad \text{και} \quad \mathcal{B}_2 = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

(α) Να προσδιοριστεί ο πίνακας μετάβασης  $P_{12}$  από τη βάση  $\mathcal{B}_1$  στη βάση  $\mathcal{B}_2$ .

(β) Έστω  $(x, y)$  οι συνιστώσες του διανύσματος  $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ , ως προς τη βάση  $\mathcal{B}_2$ . Να προσδιοριστούν οι συνιστώσες του  $\vec{v}$  ως προς τη βάση  $\mathcal{B}_1$ .

(2) Να εξεταστεί εάν μπορεί ο πίνακας

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -7 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

να αποτελεί πίνακα μετάβασης από μια βάση του  $\mathbb{R}^3$  σε μια άλλη βάση του  $\mathbb{R}^3$ .

## 6. Φυλλάδιο 6 - 1/1/2012

**Άσκηση 67.** Έστω  $\mathcal{E}$  ένας  $\mathbb{C}$ -διανυσματικός χώρος και υποθέτουμε ότι:  $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{E} = n$ . Να δείξετε ότι ο  $\mathcal{E}$  μπορεί να θεωρηθεί και ως  $\mathbb{R}$ -διανυσματικός χώρος και τότε:  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} = 2 \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{E}$ .

**Άσκηση 68.** Έστω  $\mathcal{E}$  ένας διανυσματικός χώρος υπεράνω ενός σώματος  $\mathbb{K}$ . Υποθέτουμε ότι το σύνολο

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_i, \dots, \vec{e}_n\}$$

είναι βάση του  $\mathcal{E}$ .

(1) Να δείξετε ότι τότε το σύνολο

$$\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_i + \lambda \vec{e}_j, \dots, \vec{e}_n\}$$

είναι βάση του  $\mathcal{E}$ , για κάθε  $\lambda \in \mathbb{K}$  και  $i \neq j$ .

(2) Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

(α) Το σύνολο

$$\mathcal{D} = \{\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_{n-1} + \vec{e}_n, \vec{e}_n + \vec{e}_1\}$$

είναι βάση του  $\mathcal{E}$ .

(β) Το  $n$  είναι περιττός.

**Άσκηση 69.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\langle \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \rangle$  ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$\vec{x} = (1, 1, 1, a), \quad \vec{y} = (1, 0, 1, b), \quad \vec{z} = (-2, 2, -2, c) \in \mathbb{R}^4$$

όπου  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .

**Άσκηση 70.** Έστω  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  και

$$\mathcal{V} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0\}$$

Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}$ .

**Άσκηση 71.** Έστω  $\vec{x} = (2, 1, 4, 3), \vec{y} = (2, 1, 2, 0) \in \mathbb{R}^4$ . Να δειχθεί ότι το σύνολο διανυσμάτων  $\{\vec{x}, \vec{y}\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και να βρεθούν δυο διανύσματα  $\vec{z}, \vec{w} \in \mathbb{R}^4$  έτσι ώστε το σύνολο  $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{w}\}$  να αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}^4$ .

**Άσκηση 72.** Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W})$  όπου

$$\mathcal{V} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$$

$$\mathcal{W} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$$

**Άσκηση 73.** Έστω  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5\}$  μια βάση του διανυσματικού χώρου  $\mathcal{E}$ . Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}}\langle \vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3, \vec{A}_4 \rangle$  του υπόχωρου ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$\begin{aligned} \vec{A}_1 &= \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3 + 3\vec{e}_4 + \vec{e}_5, \\ \vec{A}_2 &= 2\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 - 3\vec{e}_3 + 4\vec{e}_4 + 8\vec{e}_5, \\ \vec{A}_3 &= 6\vec{e}_1 + 17\vec{e}_2 - 7\vec{e}_3 + 10\vec{e}_4 + 22\vec{e}_5, \\ \vec{A}_4 &= \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - 3\vec{e}_3 + 2\vec{e}_4. \end{aligned}$$

**Άσκηση 74.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\langle \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \rangle$  ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$\vec{u} = (0, 1, 2), \quad \vec{v} = (0, -1, 2), \quad \vec{w} = (0, 3, 4)$$

η οποία να επεκταθεί σε μια βάση του  $\mathbb{R}^3$ .

**Άσκηση 75.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\langle A, B, \Gamma, \Delta \rangle$  ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Delta = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

και ακολούθως να συμπληρωθεί σε μια βάση του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

**Άσκηση 76.** Έστω τα ακόλουθα διανύσματα του  $\mathbb{R}^n$ :

$$\vec{x}_1 = (1, 1, 0, \dots, 0), \quad \vec{x}_2 = (0, 1, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad \vec{x}_n = (1, 0, \dots, 0, 1)$$

Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}}\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \rangle$  του υπόχωρου ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα  $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ .

**Άσκηση 77.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\langle P(t), Q(t), R(t) \rangle$  ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$P(t) = t + t^2 + t^4, \quad Q(t) = t + 2t^2 - t^4, \quad R(t) = 2t + 6t^4$$

η οποία στη συνέχεια να συμπληρωθεί σε μια βάση του  $\mathbb{R}_4[t]$ .

**Άσκηση 78.** Στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}_1[t]$  θεωρούμε τις ακόλουθες δυο βάσεις

$$\mathcal{S} = \{t, t - 3\} \quad \text{και} \quad \mathcal{T} = \{t - 1, t + 1\}.$$

- (1) Να βρεθεί ο πίνακας μετάβασης  $M_{\mathcal{S}}^{\mathcal{T}}$  από την  $\mathcal{S}$  στην  $\mathcal{T}$  και ο πίνακας μετάβασης  $M_{\mathcal{T}}^{\mathcal{S}}$  την  $\mathcal{T}$  στην  $\mathcal{S}$ .
- (2) Ποιες είναι οι συνιστώσες του διανύσματος  $P(t) = 5t + 1$  ως προς από την  $\mathcal{S}$  στην  $\mathcal{T}$  τη βάση  $\mathcal{S}$  και ως προς τη βάση  $\mathcal{T}$ ;

**Άσκηση 79.** Να βρεθεί η βαθμίδα του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 5 & -2 & 9 \\ 1 & -\lambda & 2\lambda \end{pmatrix}$$

όπου  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

## 7. Φυλλάδιο 7 - 25/1/2012

**Άσκηση 80.** Να εξεταστεί ποιες από τις ακόλουθες απεικονίσεις είναι  $\mathbb{R}$ -γραμμικές:

- (1)  $\phi_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto \phi_1(x, y, z) = (y, z, x)$ .
- (2)  $\phi_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto \phi_2(x, y, z) = (x + y + z, 1, -1)$ .
- (3)  $\phi_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto \phi_3(x, y, z) = (xyz, 0, 0)$ .
- (4)  $\phi_4 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y, z) \mapsto \phi_4(x, y, z) = (z, x + y)$ .
- (5)  $\phi_5 : \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x], f(x) \mapsto \phi_5(f(x)) = f'(x)$ .
- (6)  $\phi_6 : M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{3 \times 3}(\mathbb{R}), A \mapsto \phi_6(A) = A - {}^t A$ .

**Άσκηση 81.** Θεωρούμε τον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό  $\mathbb{R}^3$  και τις ακόλουθες γραμμικές απεικονίσεις:

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = (x + y + z, 0, 0)$$

$$g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto g(x, y, z) = (x + 2y, y - x, x + 2z)$$

Να υπολογιστεί:

- (1) η τιμή  $(f \circ g)(x, y, z), \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ ,
- (2) η τιμή  $(f \circ g)(1, 0, 1)$  και η τιμή  $(g \circ f)(1, 0, 1)$ .

Τι παρατηρείτε;

**Άσκηση 82.** Να προσδιοριστεί η γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  οι τιμές της οποίας στα διανύσματα της ακόλουθης βάσης

$$\mathcal{B} = \{\vec{\varepsilon}_1 = (1, 1, 1), \quad \vec{\varepsilon}_2 = (1, -1, 0), \quad \vec{\varepsilon}_3 = (1, 1, -2)\}$$

είναι αντίστοιχα:

$$f(\vec{\varepsilon}_1) = (0, 0, 0), \quad f(\vec{\varepsilon}_2) = (2, -1, -1), \quad f(\vec{\varepsilon}_3) = (0, 3, -3).$$

**Άσκηση 83.** Έστω η γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  η οποία ορίζεται από τη σχέση:

$$f(x, y, z) = (x + 2y, y - z, 2x + 4y)$$

Να υπολογιστεί μια βάση του πυρήνα  $\text{Ker}(f)$  και μια βάση της εικόνας  $\text{Im}(f)$  της  $f$ .

**Άσκηση 84.** Να εξεταστεί αν η γραμμική απεικόνιση

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1 + x_2, \dots, x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

είναι ισομορφισμός.

**Άσκηση 85.** Έστω  $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$  μια γραμμική απεικόνιση, όπου ο  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος  $\mathcal{E}$  έχει πεπερασμένη διάσταση.

- (1) Να δείξετε ότι η  $f$  είναι μονομορφισμός αν και μόνον αν η  $f$  στέλνει γραμμικά ανεξάρτητα σύνολα διανυσμάτων σε γραμμικά ανεξάρτητα σύνολα διανυσμάτων:

$$\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k\} : \text{γραμμικά ανεξάρτητο σύνολο} \implies$$

$$f(\mathcal{C}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_k)\} : \text{γραμμικά ανεξάρτητο σύνολο}$$

- (2) Να δείξετε ότι η  $f$  είναι ισομορφισμός αν και μόνον αν η  $f$  στέλνει τυχούσα βάση του  $\mathcal{E}$  σε βάση του  $\mathcal{E}$ :

$$f(\mathcal{B}) = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\} : \text{βάση του } \mathcal{E} \implies f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n)\} : \text{βάση του } \mathcal{E}$$

**Άσκηση 86.** Να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της γραμμικής απεικόνισης:

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + 2y, y - x, x + 2z)$$

**Άσκηση 87.** Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση:

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z, w) = (x - z + 2w, -2x + y + 2z, y + 4w)$$

- (1) Να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ .  
 (2) Να δείχθει ότι το διάνυσμα  $(1, 3, \kappa) \in \text{Im } f \Leftrightarrow \kappa = 5$ .  
 (3) Ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιούν τα  $a, b \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε  $(1, a, 1, b) \in \text{Ker } f$ ;

**Άσκηση 88.** Έστω  $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$  μια γραμμική απεικόνιση, όπου  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} < \infty$ . Έστω ότι  $f^n = 0$  και  $f^{n-1} \neq 0$ . Αν  $\vec{x} \in \mathcal{E}$ , να δείξετε ότι  $f^{n-1}(\vec{x}) \neq \vec{0}$  αν και μόνο αν το σύνολο

$$\{\vec{x}, f(\vec{x}), \dots, f^{n-1}(\vec{x})\}$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητο.



**Άσκηση 89.** Θεωρούμε τον  $2 \times 2$  πίνακα πραγματικών αριθμών

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

και έστω η γραμμική απεικόνιση

$$f: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad f(M) = AM - MA$$

Να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ .

**Άσκηση 90.** Θεωρούμε τη βάση

$$\mathcal{B} := \{\vec{e}_1 = 1, \vec{e}_2 = t, \vec{e}_3 = t^2\}$$

του  $\mathbb{R}_2[t]$  και τα διανύσματα

$$\vec{w}_1 = 1 + t, \quad \vec{w}_2 = 3 - t^2, \quad \vec{w}_3 = 4 + 2t - 3t^2$$

του  $\mathbb{R}_2[t]$ . Να προσδιορισθεί η μοναδική γραμμική απεικόνιση  $f: \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}_2[t]$  έτσι ώστε:  $f(\vec{e}_i) = \vec{w}_i$ ,  $1 \leq i \leq 3$ . Ακολουθώντας να εξετασθεί αν η  $f$  είναι ισομορφισμός. Αν η  $f$  δεν είναι ισομορφισμός να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ .

**Άσκηση 91.** Έστω  $f: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$  μια γραμμική απεικόνιση, όπου  $\mathcal{E}$  είναι ένας διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης υπεράνω ενός σώματος  $\mathbb{K}$ . Υποθέτουμε ότι  $f^2 = 0$ . Να δείξετε τα ακόλουθα:

- (1)  $\text{Im}(f) \subseteq \text{Ker}(f)$ .
- (2)  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f \geq \frac{\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E}}{2}$ .
- (3) Η ανισότητα του (2) είναι ισότητα αν και μόνον αν  $\text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$ .

## 8. Φυλλάδιο 8 - 8/2/2012

**Άσκηση 92.** Έστω  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  ένας  $n \times n$  πίνακας και  $\text{adj}(A)$  ο συμπληρωματικός του  $A$ .

- (1)  $\text{adj}(A) = \mathbb{O} \iff \text{r}(A) < n - 1$ .
- (2)  $\text{r}(A) = n \implies \text{r}(\text{adj}(A)) = n$ .
- (3)  $\text{r}(A) < n - 1 \implies \text{r}(\text{adj}(A)) = 0$ .
- (4)  $\text{r}(A) = n - 1 \implies \text{r}(\text{adj}(A)) = 1$ .

**Άσκηση 93.** Έστω  $f, g: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{F}$  και  $h: \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$  γραμμικές απεικονίσεις μεταξύ  $\mathbb{K}$ -διανυσματικών χώρων πεπερασμένης διάστασης, και  $0 \neq k \in \mathbb{K}$ . Να δείξετε ότι:

- (1)  $\text{r}(kf) = \text{r}(f)$ .
- (2)  $|\text{r}(f) - \text{r}(g)| \leq \text{r}(f + g) \leq \text{r}(f) + \text{r}(g)$ .
- (3)  $\text{r}(h \circ f) \leq \min \{\text{r}(f), \text{r}(g)\}$ .
- (4)  $\text{r}(h \circ f) = \text{r}(f) \iff \text{Im}(f) \cap \text{Ker}(h) = \{\vec{0}\}$ .
- (5)  $\text{r}(h \circ f) = \text{r}(h) \iff \text{Im}(f) + \text{Ker}(h) = \mathcal{F}$ .

**Άσκηση 94.** Να βρεθούν οι βαθμίδες των πίνακων

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ 3 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 4 & -1 & 3 & -2 & -2 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 95.** Να λυθεί το σύστημα

$$\begin{cases} x - 2y + z + w = 1 \\ x - 2y + z - w = -1 \\ x - 2y + z + 5w = 5 \end{cases}$$

**Άσκηση 96.** Να βρεθούν οι τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$ , για τις οποίες το γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} \lambda x + (3\lambda + 4)y + 2(\lambda + 1)z = 0 \\ \lambda x + (4\lambda + 2)y + (\lambda + 4)z = 0 \\ 2x + (3\lambda + 4)y + 3\lambda z = 0 \end{cases}$$

είναι συμβιβαστό, και ακολούθως να λυθεί.

**Άσκηση 97.** Έστω  $(\Sigma)$  ένα γραμμικό σύστημα  $m$  εξισώσεων με  $n$  αγνώστους. Αν  $m < n$  ναδειχθεί ότι το  $(\Sigma)$  δεν μπορεί να έχει μοναδική λύση.

**Άσκηση 98.** Αν  $\lambda \in \mathbb{R}$ , να λυθεί το ακόλουθο σύστημα:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - x_6 = 0 \\ x_2 + x_5 - x_6 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 - 2x_6 + x_7 = 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 = -\lambda \end{cases}$$

**Άσκηση 99.** Αν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ , να λυθεί το σύστημα:

$$\begin{cases} \alpha x + y + z = \alpha \\ x + \beta y + z = \beta \\ x + y + \gamma z = \gamma \end{cases}$$

**Άσκηση 100.** Να λυθεί το σύστημα ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ):

$$\begin{cases} x + \lambda y + \lambda z = 1 \\ x + y + \lambda z = \lambda \\ \lambda x + \lambda y + z = 1 \\ \lambda x + y + z = \lambda \end{cases}$$

**Άσκηση 101.** Να λυθεί το σύστημα ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ):

$$\begin{cases} x - y + z = 3 \\ x + y + \lambda z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \end{cases}$$

**Άσκηση 102.** Πότε το σύστημα

$$\begin{cases} x + 5y - 2z + 6w = \kappa \\ 4x - 3y + 7z + 12w = \lambda \\ 5x - 44y + 35z - 6w = \mu \end{cases}$$

είναι συμβιβαστό;

**Άσκηση 103.** Να βρεθούν οι τιμές του  $\kappa \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε το σύστημα :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_1 + 7x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \kappa \end{cases}$$

(1) να έχει λύση.

(2) να μην έχει λύση.

**Άσκηση 104.** Αφού υπολογίσετε την βαθμίδα του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & -1 \\ 3 & 5 & 6 & 7 & 4 & 2 \\ 4 & 7 & 10 & 13 & 16 & 1 \\ 5 & 8 & 9 & 10 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

να λύσετε το σύστημα:

$$(\Sigma) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 + 6x_5 = -1 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 7x_4 + 4x_5 = 2 \\ 4x_1 + 7x_2 + 10x_3 + 13x_4 + 16x_5 = 1 \\ 5x_1 + 8x_2 + 9x_3 + 10x_4 + 3x_5 = 3 \end{cases}$$

## 9. Φυλλάδιο 9 - 15/2/2012

**Άσκηση 105.** Έστω η γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}_3[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$ ,  $f(P(t)) = P'(t)$ . Να βρεθεί ο πίνακας της  $f$  στις κανονικές βάσεις των  $\mathbb{R}_3[t]$  και  $\mathbb{R}_2[t]$ .

**Άσκηση 106.** Έστω  $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  δύο γραμμικές απεικονίσεις. Θεωρούμε τις ακόλουθες βάσεις του  $\mathbb{R}^3$ :

$$\mathfrak{B}_1 = \{\vec{e}_1 = (1, 1, 1), \vec{e}_2 = (1, 0, 1), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$$

$$\mathfrak{B}_2 = \{\vec{\varepsilon}_1 = (1, 0, 0), \vec{\varepsilon}_2 = (0, 1, 0), \vec{\varepsilon}_3 = (0, 0, 1)\}$$

Αν

$$A = M_{\mathfrak{B}_1}^{\mathfrak{B}_2}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 2 & 7 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = M_{\mathfrak{B}_2}^{\mathfrak{B}_1}(g) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 8 & 7 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

να βρεθούν οι τιμές  $f(-1, 2, 4)$  και  $g(-1, 0, 3)$ .

**Άσκηση 107.** Έστω  $f : \mathbb{R}_3[t] \rightarrow \mathbb{R}^3$  μια γραμμική απεικόνιση με

$$M_{\mathfrak{B}_1}^{\mathfrak{B}_2}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

όπου  $\mathfrak{B}_1 = \{1, t, t^2, t^3\}$  και  $\mathfrak{B}_2$  η κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$ . Να βρεθεί η τιμή  $f(P(t))$  για κάθε  $P(t) \in \mathbb{R}_3[t]$ .

**Άσκηση 108.** Έστω  $\mathfrak{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$  η κανονική βάση του  $\mathbb{R}^4$  και  $\mathfrak{B}'$  η βάση

$$\mathfrak{B}' = \{\vec{\varepsilon}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_4, \vec{\varepsilon}_2 = \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2, \vec{\varepsilon}_3 = 3\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{\varepsilon}_4 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4\}$$

Έστω  $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  η μοναδική γραμμική απεικόνιση έτσι ώστε:  $f(\vec{\varepsilon}_1) = 3\vec{\varepsilon}_2$ ,  $f(\vec{\varepsilon}_2) = 7\vec{\varepsilon}_4$ ,  $f(\vec{\varepsilon}_3) = \vec{\varepsilon}_1 + \vec{\varepsilon}_3$  και  $f(\vec{\varepsilon}_4) = \vec{\varepsilon}_1 - 5\vec{\varepsilon}_3$ . Να βρεθεί ο πίνακας  $M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f)$ .

**Άσκηση 109.** Έστω  $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  δύο γραμμικές απεικονίσεις και έστω η βάση του  $\mathbb{R}^3$ :

$$\mathfrak{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 1, 1), \vec{e}_2 = (1, 1, 0), \vec{e}_3 = (1, 0, 0)\}$$

Αν

$$M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(g) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

να βρεθούν οι γραμμικές απεικονίσεις  $f + g$  και  $-3f + 2g$ .

**Άσκηση 110.** Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ,  $f(x, y, z) = (y, z, -x - y - z)$ . Είναι η  $f$  ισομορφισμός; Αν ναι υπολογίστε την  $f^{-1}$ .

**Άσκηση 111.** Έστω  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  μια γραμμική απεικόνιση της οποίας ο πίνακας στην κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$  είναι ο ακόλουθος

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (1) Να βρεθεί το διάνυσμα  $f(x, y, z)$ , για κάθε  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .
- (2) Να βρεθεί ο πίνακας  $B$  του  $f$  στη βάση  $\{\vec{\varepsilon}_1 = (1, 1, 1), \vec{\varepsilon}_2 = (0, 1, -1), \vec{\varepsilon}_3 = (-1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$ .
- (3) Να βρεθεί αντιστρέψιμος πίνακας  $P$  έτσι ώστε:  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .
- (4) Να υπολογισθεί ο πίνακας  $A^n, \forall n \geq 1$ .

**Άσκηση 112.** Έστω  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  μια γραμμική απεικόνιση της οποίας ο πίνακας στην κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$  είναι ο ακόλουθος

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- (1) Να βρεθεί το διάνυσμα  $f(x, y, z)$ , για κάθε  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .
- (2) Να βρεθεί ο πίνακας  $B$  της  $f$  στη βάση  $\{\vec{\varepsilon}_1 = (1, 0, -2), \vec{\varepsilon}_2 = (0, 1, 0), \vec{\varepsilon}_3 = (2, 0, 1)\}$ .
- (3) Να βρεθεί αντιστρέψιμος πίνακας  $P$  έτσι ώστε  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Άσκηση 113.** Έστω η απεικόνιση  $f : \mathbb{R}_3[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$ ,  $f(P(t)) = P(t)' - P(t)''$ .

- (1) Να δείξετε ότι η  $f$  είναι γραμμική.
- (2) Να βρείτε μια βάση του  $\text{Ker } f$  και μια βάση της  $\text{Im } f$ .
- (3) Να βρεθεί ο πίνακας  $M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{C}}(f)$ , όπου  $\mathfrak{B} = \{1, t, t^2, t^3\}$  είναι η κανονική βάση του  $\mathbb{R}_3[t]$  και  $\mathfrak{C} = \{1, t, t^2\}$  είναι μια βάση του  $\mathbb{R}_2[t]$ .
- (4) Να βρεθεί ο πίνακας  $M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{C}'}(f)$  όπου  $\mathfrak{B}' = \{1, 1+t, 1+t+t^2, 1+t+t^2+t^3\}$  είναι βάση του  $\mathbb{R}_3[t]$  και  $\mathfrak{C}' = \{1, 2t-1, -1-4t+3t^2\}$  είναι βάση του  $\mathbb{R}_2[t]$ .
- (5) Να προσδιοριστούν αντιστρέψιμοι πίνακες  $P, Q$  έτσι ώστε:  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Άσκηση 114.** Έστω

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Να βρεθεί η βαθμίδα  $r(A) := r$  του  $A$  και ακολούθως να βρεθούν αντιστρέψιμοι πίνακες  $P, Q$  έτσι ώστε

$$Q^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} I_r & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} \end{pmatrix}$$

όπου  $I_r$  είναι ο μοναδιαίος  $r \times r$  πίνακας.

## Μέρος 2. Προτεινόμενες Ασκήσεις Προς Λύση

### 10. Φυλλάδιο 1 - 16/11/2011

**Άσκηση 115.** Δώστε παραδείγματα: βαθμωτού, διαγώνιου, άνω τριγωνικού, κάτω τριγωνικού, συμμετρικού, και αντισυμμετρικού  $4 \times 4$  πίνακα.

**Άσκηση 116.** Για ποιές τιμές των  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K}$  είναι οι ακόλουθοι πίνακες (i) βαθμωτοί, (ii) διαγώνιοι, (iii) συμμετρικοί, (iv) αντισυμμετρικοί, (v) άνω τριγωνικοί, (vi) κάτω τριγωνικοί:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ \alpha & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha & \alpha & \gamma \\ -\gamma & -\gamma & \alpha \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} \beta & \beta & \beta \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha & \alpha & \beta \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 1 & \beta & \beta \\ \alpha & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Άσκηση 117.** Ναδειχθεί ότι για δύο  $m \times n$  πίνακες  $A$  και  $B$  ισχύει:  $-(A + B) = (-A) + (-B)$ .

**Άσκηση 118.** Έστω  $n \in \mathbb{N}$  με  $n \geq 2$ .

- (1) Ναδειχθεί ότι κάθε  $n \times n$  πίνακας  $A$  ισούται με ένα άθροισμα πινάκων  $D + D'$ , όπου ο  $D$  είναι άνω τριγωνικός και ο  $D'$  κάτω τριγωνικός. Ακολουθώντας να εξεταστεί το κατά πόσο αυτή η παράσταση του  $A$  είναι μοναδική.
- (2) Ναδειχθεί ότι κάθε  $n \times n$  πίνακας  $A$  ισούται με ένα άθροισμα πινάκων  $E + E'$ , όπου ο  $E$  είναι αυστηρά άνω τριγωνικός και ο  $E'$  είναι κάτω τριγωνικός. Ακολουθώντας να εξεταστεί το κατά πόσο αυτή η παράσταση του  $A$  είναι μοναδική.

**Άσκηση 119.** Να βρεθεί η  $n$ -οστή δύναμη του πίνακα  $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Είναι οι πίνακες  $T^n$ ,  $\forall n \geq 1$ , αντιστρέψιμοι;

**Άσκηση 120.** Να υπολογιστεί το γινόμενο πινάκων:

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

και κατόπιν να εκφραστούν ως γινόμενα πινάκων οι παρακάτω ισότητες:

- (1)  $x^2 + 9xy + y^2 + 8x + 5y + 2 = 0$ ,
- (2)  $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ ,
- (3)  $xy = \alpha^2$ ,
- (4)  $y^2 = 4\alpha x$ .

**Άσκηση 121.** Θεωρούμε τον πίνακα  $A = (a_{ij}) \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$ , όπου  $a_{ij} = \frac{1}{n}$ ,  $\forall i, j = 1, \dots, n$ . Να δείξετε ότι  $A^2 = A$ . Είναι ο  $A$  αντιστρέψιμος;

**Άσκηση 122.** Έστω ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Να υπολογισθεί ο  $A^2$ . Είναι ο  $A$  αντιστρέψιμος;

**Άσκηση 123.** Έστω  $n, m \geq 1$  και για κάθε  $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$  θεωρούμε τους  $m \times n$  πίνακες

$$E_{ij} = (\varepsilon_{\kappa\lambda}) \quad \text{όπου} \quad \varepsilon_{\kappa\lambda} = \begin{cases} 1, & \text{αν } \kappa = i, \lambda = j, \\ 0, & \text{διαφορετικά.} \end{cases}$$

Δηλαδή ο  $E_{ij}$  είναι ο  $m \times n$  πίνακας με 1 στην  $(i, j)$  θέση και παντού αλλού μηδέν. Αν  $A = (a_{ij})$  είναι ένας  $m \times n$  πίνακας να δείξετε ότι

$$A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij}$$

**Άσκηση 124.** Δίνονται οι πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 4 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Να εξετασθεί αν υπάρχουν  $3 \times 2$  πίνακες  $X, Y$  έτσι ώστε

$$-2X + 7Y = A \quad \text{και} \quad X - 3Y = B$$

**Άσκηση 125.** Ναδειχθεί ότι για τους πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

είναι  $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ , μολονότι  $(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$ .

**Άσκηση 126.** Ναδειχθεί ότι η εξίσωση (ως προς  $X$ ) των  $2 \times 2$  πινάκων  $X^2 = I_2$ , διαδέτει ως λύση κάθε τετραγωνικό πίνακα της μορφής  $\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ \lambda^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ , όπου  $\lambda$  είναι οποιοδήποτε μη μηδενικό στοιχείο του  $\mathbb{K}$ . (Συνεπώς, ο ταυτοτικός  $2 \times 2$  πίνακας  $I_2$  διαδέτει άπειρο το πλήθος “τετραγωνικές ρίζες”.)

**Άσκηση 127.** Ας είναι  $A$  ένας αυστηρά άνω τριγωνικός  $n \times n$  πίνακας με στοιχεία από το σώμα  $\mathbb{K}$ . Ναδειχθεί ότι  $A^n = \mathbb{O}$ .

## 11. Φυλλάδιο 2 - 23/11/2011

**Άσκηση 128.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του  $n \times n$  πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 1 & 2 & \cdots & 3 & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & n \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 129.** Να δείξετε ότι για τον  $n \times n$  πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

ισχύει:

$$|A| = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}.$$

**Άσκηση 130.** Να υπολογίσετε τις ορίζουσες των ακόλουθων πινάκων:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 & -4 \\ 3 & -2 & 1 & 5 \\ -2 & 0 & 1 & -3 \\ 8 & -2 & 6 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 & 8 \\ 5 & -6 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & 7 \\ 3 & 4 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & 4 & 3 \\ 2 & -2 & 8 & -4 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 131.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του  $n \times n$  πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 1-n & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1-n & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 132.** Εάν  $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = 4$ , να υπολογισθεί η ορίζουσα

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & 4a_3 - 2a_2 \\ b_1 & b_2 & 4b_3 - 2b_2 \\ \frac{1}{2}c_1 & \frac{1}{2}c_2 & 2c_3 - c_2 \end{vmatrix}.$$



**Άσκηση 133.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του  $n \times n$  πίνακα πραγματικών αριθμών:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1^2 & \cdots & \rho_1^{n-1} \\ 1 & \rho_2 & \rho_2^2 & \cdots & \rho_2^{n-1} \\ 1 & \rho_3 & \rho_3^2 & \cdots & \rho_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \rho_n & \rho_n^2 & \cdots & \rho_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

(ορίζουσα Vandermonde  $n$  τάξης).

**Άσκηση 134.** Θεωρούμε τον  $n \times n$  πίνακα  $A$  ο οποίος είναι της μορφής:

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ \mathbf{0} & D \end{pmatrix},$$

όπου  $B \in M_{r \times r}(\mathbb{K})$ ,  $C \in M_{r \times (n-r)}(\mathbb{K})$ ,  $\mathbf{0} \in M_{(n-r) \times r}(\mathbb{K})$ ,  $D \in M_{(n-r) \times (n-r)}(\mathbb{K})$ .  
Να δείξετε ότι:

$$|A| = |B| \cdot |D|$$

**Άσκηση 135.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του  $n \times n$  πίνακα πραγματικών αριθμών

$$A = \begin{pmatrix} \alpha + \beta & \beta & \beta & \cdots & \beta & \beta \\ \beta & \alpha + \beta & \beta & \cdots & \beta & \beta \\ \beta & \beta & \alpha + \beta & \cdots & \beta & \beta \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \beta & \beta & \beta & \cdots & \alpha + \beta & \beta \\ \beta & \beta & \beta & \cdots & \beta & \alpha + \beta \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 136.** Έστω  $A$  ένας  $n \times n$  πίνακας, για τον οποίο ισχύει:  ${}^t A = -A$ . Να δείξει ότι αν ο  $n$  είναι περιττός αριθμός, τότε  $|A| = 0$ .

**Άσκηση 137.** Να ευρεθούν όλες οι ελάχιστες οριζουσες δεύτερης τάξης και όλοι οι συμπαράγοντες του πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 6 & 7 & -1 \\ -3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 138.** Να ευρεθεί η ορίζουσα τού προηγούμενου πίνακα ως ανάπτυγμα

- (1) κατά τα στοιχεία της πρώτης γραμμής,
- (2) κατά τα στοιχεία της πρώτης στήλης,
- (3) κατά τα στοιχεία της δεύτερης γραμμής,
- (4) κατά τα στοιχεία της δεύτερης στήλης,
- (5) κατά τα στοιχεία της τρίτης γραμμής,
- (6) κατά τα στοιχεία της τρίτης στήλης.

**Άσκηση 139.** Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 4 & 1 & 0 & 14 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Να προσδιοριστούν οι αριθμοί  $\Delta_{13}$  και  $A_{13}$ ,  $\Delta_{23}$  και  $A_{23}$ ,  $\Delta_{22}$  και  $A_{22}$ , και  $\Delta_{21}$  και  $A_{21}$ .

**Άσκηση 140.** Να προσδιοριστεί η ορίζουσα των επόμενων πινάκων

- (1) αναπτύσσοντας την ως προς τη στήλη ή τη γραμμή της επιλογής σας.  
 (2) με χρήση κατάλληλων πράξεων επί των γραμμών ή των στηλών.

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & -4 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix}, \quad A_4 = \begin{pmatrix} a+1 & a-1 & 7 \\ 2 & a-3 & 4 \\ 5 & a+1 & a \end{pmatrix},$$

$$A_5 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -3 & 0 \\ 2 & 10 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A_6 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Άσκηση 141.** Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός των μηδενικών συνιστωσών που μπορεί να έχει ένας  $4 \times 4$  πίνακας, χωρίς όμως η ορίζουσά του να είναι ίση με μηδέν;

## 12. Φυλλάδιο 3 - 30/11/2011

**Άσκηση 142.** Να βρεθούν παραδείγματα  $2 \times 2$  πινάκων  $A$  και  $B$  έτσι ώστε

- (1)  ${}^t(AB) \neq {}^tA{}^tB$   
 (2)  $(AB)^{-1} \neq A^{-1}B^{-1}$   
 (3)  $|A+B| \neq |A|+|B|$

**Άσκηση 143.** Έστω  $A, B$  δύο  $n \times n$  πίνακες έτσι ώστε  $A^2 = I_n$ ,  $B^3 = I_n$  και ο  $A+B$  είναι αντιστρέψιμος. Να δείξετε ότι ο πίνακας  $A+B^2$  είναι αντιστρέψιμος και να βρεθεί ο αντίστροφος του.

**Άσκηση 144.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n-2 & n-1 & n \\ a & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-3 & n-2 & n-1 \\ a & a & 1 & 2 & \cdots & n-4 & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & a & \cdots & 1 & 2 & 3 \\ a & a & a & a & \cdots & a & 1 & 2 \\ a & a & a & a & \cdots & a & a & 1 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 145.** Έστω  $A$  ένας τετραγωνικός πίνακας για τον οποίο ισχύει  $A^2 = A$  και  $(A - {}^tA)^2 = 0$ . Να δείξετε ότι

$$(A \cdot {}^tA)^2 = A \cdot {}^tA$$

**Άσκηση 146.** Έστω  $A$  ένας τετραγωνικός  $n \times n$ -πίνακας. Αν  $A^k = 0$  για κάποιο  $k \geq 1$ , να δείξετε ότι ο  $I_n - A$  είναι αντιστρέψιμος και να βρεθεί ο  $(I_n - A)^{-1}$ .

**Άσκηση 147.** Αν  $A$  είναι ένας άνω τριγωνικός  $n \times n$ -πίνακας με μη-μηδενικά στοιχεία στην κύρια διαγώνιο, να δείξετε ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και ο  $A^{-1}$  είναι επίσης άνω τριγωνικός με μη-μηδενικά στοιχεία στην κύρια διαγώνιο.

**Άσκηση 148.** Αν  $x, y \in \mathbb{R}$ , θεωρούμε τον ακόλουθο  $n \times n$  πίνακα:

$$A_n = \begin{pmatrix} x & y & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x & y \\ y & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & x \end{pmatrix}$$

(1) Να υπολογισθεί η ορίζουσα  $|A_n|$ .

(2) Αν  $x = y = 1$ , να εξετασθεί αν ο πίνακας είναι αντιστρέψιμος.

**Άσκηση 149.** Έστω ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ . Να δειχθεί ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και στη συνέχεια να υπολογισθεί ο  $A^{-1}$ :

(1) με χρήση του συμπληρωματικού  $\text{adj}A$  του  $A$ ,

(2) με τη μέθοδο στοιχειωδών πράξεων επί των γραμμών του πίνακα  $(A|I_3)$ .

**Άσκηση 150.** Να βρεθεί πίνακας  $X$  έτσι ώστε  $XA = B$ , όπου

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Άσκηση 151.** Να λυθεί το σύστημα

$$\begin{cases} x + y + 2z - t = 3 \\ 2x + y + 3z + t = 8 \\ x + 4y + 7z - 2t = 9 \\ x - y - z + t = 1 \end{cases}$$

**Άσκηση 152.** Να λυθεί το σύστημα

$$\begin{cases} x + y + z = 11 \\ 2x - y + z = 5 \\ 3x + 2y + z = 24 \end{cases}$$

- (1) με τη μέθοδο απαλοιφής του Gauss, και  
 (2) με τη μέθοδο Cramer.

**Άσκηση 153.** Να λυθεί το σύστημα ( $\lambda \in \mathbb{R}$ )

$$\begin{cases} (1 + \lambda)x + y + z = \lambda^2 + 3\lambda \\ x + (1 + \lambda)y + z = \lambda^3 + 3\lambda^2 \\ x + y + (1 + \lambda)z = \lambda^4 + 3\lambda^3 \end{cases}$$

### 13. Φυλλάδιο 4 - 14/12/2011

**Άσκηση 154.** Στο σύνολο  $\mathbb{R}^2$  ορίζουμε πράξεις

$$\begin{aligned} \oplus : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, (x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ \odot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda \odot (x, y) = (\lambda x, 0) \end{aligned}$$

Να εξετασθεί αν η τριάδα  $(\mathbb{R}^2, \oplus, \odot)$  είναι διανυσματικός χώρος πάνω από το  $\mathbb{R}$ .

**Άσκηση 155.** Στο σύνολο  $\mathbb{R}^2$  ορίζουμε πράξεις

$$\begin{aligned} \oplus : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, (x_1, y_1) \oplus (x_2, y_2) = (x_1 + x_2 + 1, y_1 + y_2 + 1) \\ \odot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2, \lambda \odot (x, y) = (\lambda x, \lambda y) \end{aligned}$$

Ποια αξιώματα διανυσματικού χώρου ισχύουν για την τριάδα  $(\mathbb{R}^2, \oplus, \odot)$  και ποια όχι ;

**Άσκηση 156.** Να δείξετε ότι με τις συνηθισμένες πράξεις πρόσθεσης και βαθμωτού πολλαπλασιασμού πινάκων το σύνολο

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 2c & 2b \\ b & a & 2c \\ c & b & a \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$$

είναι διανυσματικός χώρος πάνω από το  $\mathbb{R}$ .

**Άσκηση 157.** Να εξετασθεί ποια από τα παρακάτω υποσύνολα του διανυσματικού χώρου  $\mathbb{R}^2$ , αντίστοιχα του  $\mathbb{R}^3$ , είναι υπόχωροι :

- (1)  $\mathcal{V}_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \in \mathbb{R}\}$   
 (2)  $\mathcal{V}_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}, y = 2x + 1\}$   
 (3)  $\mathcal{V}_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in \mathbb{R}, y = 2x\}$

- (4)  $\mathcal{V}_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = x, x \in \mathbb{R}\}$   
 (5)  $\mathcal{V}_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x, y \in \mathbb{R}, z = 1\}$   
 (6)  $\mathcal{V}_6 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y = z \in \mathbb{R}\}$   
 (7)  $\mathcal{V}_7 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = x + y, x, y \in \mathbb{R}\}$   
 (8)  $\mathcal{V}_8 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid xy = 0, x, y, z \in \mathbb{R}\}$   
 (9)  $\mathcal{V}_9 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 x_3 = x_2 x_4, x_i \in \mathbb{R}, 1 \leq i \leq 4\}$   
 (10)  $\mathcal{V}_{10} = \{A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) \mid a_{11} = 0\}$

**Άσκηση 158.** Θεωρούμε τον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , και τα υποσύνολά του:

$$\mathcal{V} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(x) = f(-x)\}$$

$$\mathcal{W} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(x) = -f(-x)\}$$

$$\mathcal{Z} = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid \text{υπάρχει } \kappa(f) \in \mathbb{R} : |f(x)| \leq \kappa(f)|x|, \forall x \in \mathbb{R}\}$$

Να εξετασθεί αν τα υποσύνολα  $\mathcal{V}, \mathcal{W}, \mathcal{Z}$  είναι υπόχωροι του  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ .

**Άσκηση 159.** Έστω  $\mathcal{E}$  ένας  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος και  $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$ . Αν  $\kappa, \lambda \in \mathbb{K}$ , να δείξετε ότι:

$$\kappa \vec{x} + \lambda \vec{y} = \lambda \vec{x} + \kappa \vec{y} \iff \kappa = \lambda \quad \text{ή} \quad \vec{x} = \vec{y}$$

**Άσκηση 160.** Να εξετασθεί αν το υποσύνολο

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R}) \mid a = -2c, f = 2e + d \right\}$$

είναι υπόχωρος του διανυσματικού χώρου  $M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$  πάνω από το  $\mathbb{R}$ .

**Άσκηση 161.** Έστω  $\mathcal{E}$  διανυσματικός χώρος πάνω από το  $\mathbb{K}$  και  $\mathcal{V}, \mathcal{W}$  υπόχωροι του  $\mathcal{E}$ . Να δείξετε ότι το υποσύνολο  $\mathcal{V} \cup \mathcal{W}$  του  $\mathcal{E}$  είναι υπόχωρος του  $\mathcal{E}$  αν και μόνο αν είτε  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$  ή  $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$ .

**Άσκηση 162.** Έστω  $AT_n(\mathbb{R})$  το σύνολο των άνω τριγωνικών  $n \times n$  πινάκων, και  $KT_n(\mathbb{R})$  το σύνολο των κάτω τριγωνικών  $n \times n$  πινάκων.

- (1) Είναι το υποσύνολο  $AT_n(\mathbb{R})$  υπόχωρος του διανυσματικού χώρου  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ;
- (2) Είναι το υποσύνολο  $KT_n(\mathbb{R})$  υπόχωρος του διανυσματικού χώρου  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ ;
- (3) Να βρεθεί η τομή  $AT_n(\mathbb{R}) \cap KT_n(\mathbb{R})$ .

**Άσκηση 163.** Έστω  $\mathcal{V}$  το υποσύνολο του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$  το οποίο αποτελείται από όλους τους πίνακες της ακόλουθης μορφής:

$$A(a, b) = \begin{pmatrix} a & b & b & b & \cdots & b & b & b \\ b & a & b & b & \cdots & b & b & b \\ b & b & a & b & \cdots & b & b & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ b & b & b & b & \cdots & b & b & b \\ b & b & b & b & \cdots & a & b & b \\ b & b & b & b & \cdots & b & a & b \\ b & b & b & b & \cdots & b & b & a \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Να εξετασθεί αν το υποσύνολο  $\mathcal{V}$  είναι υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

**Άσκηση 164.** Να δείξετε ότι αν  $\mathcal{V}$  και  $\mathcal{W}$  είναι δύο υπόχωροι του  $\mathbb{K}$ -διανυσματικού χώρου  $\mathcal{E}$ , τότε:

$$\mathcal{V} \neq \mathcal{E} \text{ και } \mathcal{W} \neq \mathcal{E} \implies \mathcal{E} \neq \mathcal{V} \cup \mathcal{W}$$

#### 14. Φυλλάδιο 5 - 21/11/2011

**Άσκηση 165.** Να δείξετε ότι οι συναρτήσεις

$$f_1(x) = \cos x, \quad f_2(x) = \cos 4x$$

θεωρούμενες ως διανύσματα του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , είναι γραμμικά ανεξάρτητες.

**Άσκηση 166.** Για ποιές τιμές του  $a \in \mathbb{R}$  οι συναρτήσεις

$$\cos x + (2a - 1) \cos 4x, \quad (1 - a) \cos x + \cos 4x$$

θεωρούμενες ως διανύσματα του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , είναι γραμμικά εξαρτημένες;

**Άσκηση 167.** Έστω ότι το σύνολο διανυσμάτων  $\{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  ενός διανυσματικού χώρου είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\{\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n + \vec{e}_1\}$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητο αν και μόνο αν ο αριθμός  $n$  είναι περιττός.

**Άσκηση 168.** Να βρεθούν οι τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  για τις οποίες τα διανύσματα

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 6 \end{pmatrix}$$

του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

**Άσκηση 169.** Να βρεθεί το  $\lambda \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε τα διανύσματα

$$\left(\lambda, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, \lambda, -\frac{1}{2}\right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \lambda\right)$$

να αποτελούν βάση του  $\mathbb{R}^3$ .

**Άσκηση 170.** Να προσδιοριστεί μια βάση και η διάσταση του  $\mathbb{R}$ -υπόχωρου

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ d & c+d \end{pmatrix} \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

**Άσκηση 171.** Έστω  $A$  ένας  $m \times n$  πίνακας με στοιχεία από ένα σώμα  $\mathbb{K}$ . Να δείξετε ότι το σύνολο

$$R(A) = \{Y \in \mathbb{K}_m \mid \text{υπάρχει } X \in \mathbb{K}_n \text{ έτσι ώστε } Y = AX\}$$

είναι ένας υπόχωρος του  $\mathbb{K}$ -διανυσματικού χώρου  $\mathbb{K}_m$ .

**Άσκηση 172.** Ναδειχθεί ότι το υποσύνολο  $\{(1, 1, -2), (0, -3, 3)\}$  του  $\mathbb{R}^3$  αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}$ -υπόχωρου

$$\mathcal{V} = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

**Άσκηση 173.** Να δείξετε ότι το ακόλουθο υποσύνολο

$$\mathcal{V} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y + 3z = 0\}$$

είναι υπόχωρος του  $\mathbb{R}^3$  και να βρείτε μια βάση του  $\mathcal{C}$ . Ακολουθώντας να βρείτε μια βάση  $\mathcal{B}$  του  $\mathbb{R}^3$  η οποία περιέχει την  $\mathcal{C}$ .

**Άσκηση 174.** Να εξεταστεί ποια από τα επόμενα σύνολα διανυσμάτων αποτελούν βάσεις του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ :

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 6 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right\},$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right\}.$$

**Άσκηση 175.** Να προσδιορισθούν όλοι οι υπόχωροι των  $\mathbb{R}$ -διανυσματικών χώρων: (α)  $\mathbb{R}^3$ , και (β)  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

**Άσκηση 176.** Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}$  όπου

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ -b & 0 & e \\ -c & -e & 0 \end{pmatrix} \mid b, c, e \in \mathbb{R} \right\}.$$

**Άσκηση 177.** Να δείξετε ότι ένας  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος  $\mathcal{V}$  έχει ακριβώς δυο υπόχωρους αν και μόνο αν  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{V} = 1$ .

## 15. Φυλλάδιο 6 - 11/1/2012

**Άσκηση 178.** Για τις διάφορες τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$ , να βρεθεί η διάσταση του υπόχωρου  $\langle \vec{\varepsilon}_1, \vec{\varepsilon}_2, \vec{\varepsilon}_3 \rangle$  όπου

$$\vec{\varepsilon}_1 = (1, 2, 3, 4), \quad \vec{\varepsilon}_2 = (-2, 1, \lambda, 2), \quad \vec{\varepsilon}_3 = (3, 1, 1, 2)$$

**Άσκηση 179.** Θεωρούμε τα ακόλουθα διανύσματα του  $\mathbb{R}^4$ :

$$\vec{x} = (1, -1, -1, 1), \quad \vec{y} = (1, -2, -2, 1), \quad \vec{z} = (0, 1, 1, 0),$$

$$\vec{x}_1 = (1, 0, 0, 1), \quad \vec{y}_1 = (0, -1, -1, 0)$$

Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\langle \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \rangle$  και να δείξετε ότι

$$\langle \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}_1, \vec{y}_1 \rangle$$

**Άσκηση 180.** Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}$  όπου

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b & c \\ -b & 0 & e \\ -c & -e & 0 \end{pmatrix} \mid b, c, e \in \mathbb{R} \right\}$$

**Άσκηση 181.** Θεωρούμε τους υπόχωρους του  $\mathbb{R}^4$ :

$$\mathcal{V} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_2 - 2x_3 + x_4 = 0\}$$

$$\mathcal{W} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_4, x_2 = 2x_3\}$$

$$\mathcal{Z} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$$

$$\mathcal{U} = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 = 0, x_2 = 2x_4\}$$

Να βρεθούν οι βάσεις των υπόχωρων  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ ,  $\mathcal{Z} \cap \mathcal{U}$ , και  $\mathcal{V} + \mathcal{U}$ .

**Άσκηση 182.** Να βρεθεί η βαθμίδα του πίνακα ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ):

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda + 3 & 1 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 183.** Να βρεθούν οι τιμές των  $a, b \in \mathbb{R}$  για τις οποίες η βαθμίδα του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & a+2 \\ a & 3 & b & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 8 \end{pmatrix}$$

είναι 2.



**Άσκηση 184.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\langle P(t), Q(t), R(t) \rangle$  όπου

$$P(t) = 1 + t + t^3, \quad Q(t) = 2 + 2t + 2t^2 + t^4, \quad R(t) = 1 + t + 4t^2 - 3t^3 + 2t^4$$

η οποία στη συνέχεια να συμπληρωθεί σε μια βάση του  $\mathbb{R}_4[t]$ .

**Άσκηση 185.** Να βρεθεί η τιμή του  $\lambda \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε τα πολυώνυμα

$$P_1(t) = 3t^3 - t^2 - 4t + 6, \quad P_2(t) = t^3 + t^2 + 4t + 4, \quad P_3(t) = t^3 - 4t + \lambda$$

να είναι γραμμικά ανεξάρτητα στον  $\mathbb{R}_3[t]$ .

**Άσκηση 186.** Να δείξετε ότι τα ακόλουθα υποσύνολα:

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1 = 1, \quad \vec{e}_1 = t, \quad \vec{e}_1 = t^2, \quad \vec{e}_1 = t^3\}$$

$$\mathcal{B}' = \{\vec{e}_1 = 1 + t^3, \quad \vec{e}_1 = t, \quad \vec{e}_1 = t + t^3, \quad \vec{e}_1 = t^2 + t^3\}$$

είναι βάσεις του διανυσματικού χώρου  $\mathbb{R}_3[t]$ .

Στη συνέχεια να βρεθεί ο πίνακας μετάβασης  $P$  από την βάση  $\mathcal{B}$  στην βάση  $\mathcal{B}'$  και ο πίνακας μετάβασης  $Q$  από την βάση  $\mathcal{B}'$  στην βάση  $\mathcal{B}$ . Να επαληθεύσετε ότι:  $Q = P^{-1}$ .

## 16. Φυλλάδιο 7 - 25/1/2012

**Άσκηση 187.** Ναδειχθεί ότι η γραμμική απεικόνιση

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y, z) \longmapsto f(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y)$$

είναι ισομορφισμός.

**Άσκηση 188.** Να ορίσετε ένα ισομορφισμό από τον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}_3[t]$  στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ , και έναν ισομορφισμό από τον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}_3[t]$  στον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}^4$ .

**Άσκηση 189.** Να προσδιορίσετε (χωρίς να το επιλύσετε) τη διάσταση του χώρου λύσεων του συστήματος:

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

**Άσκηση 190.** Έστω  $f: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$  μια γραμμική απεικόνιση, όπου  $\mathcal{E}$  είναι ένας διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης υπεράνω ενός σώματος  $\mathbb{K}$ . Υποθέτουμε ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f^2)$ . Να δείξετε ότι  $\mathcal{E} = \text{Ker}(f) + \text{Im}(f)$  και  $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{\vec{0}\}$ .

**Άσκηση 191.** Έστω ο  $\mathbb{R}$ -διανυσματικός χώρος  $\mathbb{R}_2[t]$  και

$$\mathcal{V} = \langle t^2 + t, t + 1 \rangle, \quad \mathcal{W} = \langle -t^2 + t + 2, t + 3 \rangle$$

δυο  $\mathbb{R}$ -διανυσματικοί υπόχωροι του. Να βρεθεί ένας ισομορφισμός  $f: \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ .

**Άσκηση 192.** Να δείξετε ότι:

(1) Η γραμμική απεικόνιση

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y, z) = (4x - 2y - z, 3x - 4y + z)$$

είναι επιμορφισμός, αλλιά όχι μονομορφισμός.

(2) Η γραμμική απεικόνιση

$$f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y) = (2x - y, x + 2y, 0)$$

είναι μονομορφισμός, αλλιά όχι επιμορφισμός.

**Άσκηση 193.** Έστω  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$  μια βάση του  $\mathbb{R}^3$  και  $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  η μοναδική γραμμική απεικόνιση έτσι ώστε:

$$f(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \quad f(\vec{e}_2) = 2\vec{e}_1, \quad f(\vec{e}_3) = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 2\vec{e}_3$$

Να δείξετε ότι η  $f$  είναι ισομορφισμός.

**Άσκηση 194.** Έστω  $f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$  η μοναδική γραμμική απεικόνιση η οποία στέλνει τα διανύσματα της κανονικής βάσης  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  του  $\mathbb{R}^n$  στα διανύσματα:

$$\{\vec{w}_1 = (0, 0, \dots, 0), \vec{w}_2 = (1, 0, \dots, 0), \vec{w}_3 = (0, 2, \dots, 0), \dots, \vec{w}_n = (0, 0, \dots, 0, n-1, 0)\}$$

αντίστοιχα, δηλαδή  $f(\vec{e}_i) = \vec{w}_i$  για  $i = 1, \dots, n$ . Να δείξετε ότι  $f^n = 0$  και να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ .

**Άσκηση 195.** Να βρεθεί η τιμή του  $\lambda \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε η γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  η οποία ορίζεται μοναδικά από τις ακόλουθες σχέσεις

$$f(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_4, \quad f(\vec{e}_2) = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \quad f(\vec{e}_3) = 2\vec{e}_2 + \vec{e}_3, \quad f(\vec{e}_4) = 2\vec{e}_3 + \vec{e}_4$$

να είναι ισομορφισμός, όπου  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$  είναι μια τυχούσα βάση του  $\mathbb{R}^4$ .

**Άσκηση 196.** Έστω  $a_0, a_1, \dots, a_n$  διακεκρυμένα στοιχεία ενός σώματος  $\mathbb{K}$ . Να δείξετε ότι η απεικόνιση

$$f : \mathbb{K}_n[t] \longrightarrow \mathbb{K}^{n+1}, \quad P(t) \longmapsto f(P(t)) := (P(a_0), P(a_1), \dots, P(a_n))$$

είναι γραμμική και ακολούθως να εξεταστεί αν η  $f$  είναι ισομορφισμός.

**Άσκηση 197.** Έστω  $f, g : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{K}$  δύο μη μηδενικές γραμμικές απεικονίσεις, όπου  $\mathcal{E}$  είναι ένας διανυσματικός χώρος υπεράνω ενός σώματος  $\mathbb{K}$ . Ορίζουμε μια νέα απεικόνιση ως εξής:

$$h : \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{K}^2, \quad \vec{x} \longmapsto h(\vec{x}) := (f(\vec{x}), g(\vec{x}))$$

Να δείξετε τα ακόλουθα:

(1) Η απεικόνιση  $h$  είναι γραμμική.

(2)  $\text{Ker}(h) = \text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)$ .

(3)  $\text{Im}(h) = \mathbb{K}^2$  (δηλαδή η  $h$  είναι επιμορφισμός) αν και μόνον αν  $\text{Ker}(f) + \text{Ker}(g) = \mathcal{E}$ .

**Άσκηση 198.** Έστω  $f, g : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$  δύο γραμμικές απεικονίσεις, όπου  $\mathcal{E}$  είναι ένας διανυσματικός χώρος υπεράνω ενός σώματος  $\mathbb{K}$ . Υποθέτουμε ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = n$ , και έστω ότι  $f + g = \text{Id}_{\mathcal{E}}$ . Να δείξετε ότι:

$$\mathbf{r}(f) + \mathbf{r}(g) \geq n$$

### 17. Φυλλάδιο 8 - 8/2/2012

**Άσκηση 199.** Έστω  $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ . Να δείξετε ότι:

- (1)  $\mathbf{r}(\kappa A) = \mathbf{r}(A)$ .
- (2)  $|\mathbf{r}(A) - \mathbf{r}(B)| \leq \mathbf{r}(A + B) \leq \mathbf{r}(A) + \mathbf{r}(B)$ .

**Άσκηση 200.** Έστω  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$  ένας  $m \times n$  πίνακας και  $B \in M_{n \times r}(\mathbb{K})$  ένας  $n \times r$  πίνακας με στοιχεία από ένα σώμα  $\mathbb{K}$ .

- (1)  $\mathbf{r}(A \cdot B) \leq \min\{\mathbf{r}(A), \mathbf{r}(B)\}$ .
- (2) Αν  $n = r$  και ο πίνακας  $B$  είναι αντιστρέψιμος, τότε:  $\mathbf{r}(A \cdot B) = \mathbf{r}(A)$ .
- (3) Αν  $m = n$  και ο πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος, τότε:  $\mathbf{r}(A \cdot B) = \mathbf{r}(B)$ .
- (4)  $\mathbf{r}(A \cdot B) \geq \mathbf{r}(A) + \mathbf{r}(B) - n$ .

**Άσκηση 201.** Να δείξετε ότι για τους πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 4 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 0 & -3 & 3 \\ 3 & 0 & -1 & -2 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 & -5 & -1 \\ 2 & 1 & 6 & -2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 & 8 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -4 & -1 \\ -2 & -1 & -7 & 3 & 2 \\ -2 & -2 & -5 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ισχύει:  $\mathbf{r}(A) = 4$  και  $\mathbf{r}(B) = 3$ .

**Άσκηση 202.** Να βρεθούν οι τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε το σύστημα :

$$\begin{cases} (1 + \lambda)x + y + z = 1 \\ x + (1 + \lambda)y + z = \lambda \\ x + y + (1 + \lambda)z = \lambda^2 \end{cases}$$

- (1) να έχει λύση.
- (2) να μην έχει λύση.

**Άσκηση 203.** Να λυθεί το σύστημα ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ):

$$\begin{cases} x + \lambda y + 2w = 0 \\ -x + 2y + \lambda w = 0 \\ \lambda x - 3y + (\lambda + 1)w = \lambda \end{cases}$$

**Άσκηση 204.** Να βρεθούν οι τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$ , για τις οποίες το σύστημα

$$\begin{cases} \lambda x + y + z + w = 1 \\ x + \lambda y + z + w = \lambda \\ x + y + \lambda z + w = \lambda^2 \\ x + y + z + \lambda w = \lambda^3 \end{cases}$$

δεν έχει λύση.

**Άσκηση 205.** Να λυθεί το σύστημα ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ):

$$\begin{cases} (\lambda + 3)x + y + 2z = \lambda \\ \lambda x + (\lambda - 1)y + z = 2\lambda \\ 3(\lambda + 1)x + \lambda y + (\lambda + 3)z = 3 \end{cases}$$

**Άσκηση 206.** Έστω το σύστημα ( $\Sigma$ ):

$$\begin{cases} x + y + \alpha z = 1 \\ x + \alpha y + z = 4 \\ \alpha x + y + z = \beta \end{cases}$$

- (1) Να βρεθούν οι τιμές των  $\alpha, \beta$  έτσι ώστε το ( $\Sigma$ ) να έχει: μοναδική λύση, περισσότερες από μια λύσεις, καμία λύση.
- (2) Να βρεθεί για ποιες τιμές του  $\alpha$ , ο χώρος λύσεων του αντίστοιχου ομογενούς συστήματος του ( $\Sigma$ ) έχει διάσταση 2.

**Άσκηση 207.** Για ποιες τιμές των  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ , το ακόλουθο σύστημα είναι συμβιβαστό:

$$\begin{cases} x + y + 2z = \alpha \\ 3x + 4y + 7z = \beta \\ x + 2y + 3z = \gamma \end{cases}$$

**Άσκηση 208.** Να βρεθεί η γενική λύση του συστήματος :

$$\begin{cases} 4x_1 + 12x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 9x_2 - 2x_3 + 11x_4 = 0 \end{cases}$$

**Άσκηση 209.** Να βρεθεί η βαθμίδα του πίνακα ( $a, b \in \mathbb{R}$ ) :

$$\begin{pmatrix} a & b & b & a \\ b & a & -a & -b \\ a+b & a+b & 2a & -2a \\ -2a & 2a & a+b & a+b \end{pmatrix}$$

## 18. Φυλλάδιο 9 - 15/2/2012

**Άσκηση 210.** Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (1) Να υπολογίσετε τον  $A^{-1}$ .
- (2) Να βρείτε τη γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  της οποίας ο πίνακας στην κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$  είναι ο  $A^{-1}$ .
- (3) Να υπολογίσετε τον πίνακα  $B$  της  $f$  στη ακόλουθη βάση του  $\mathbb{R}^3$  :  
 $\{\vec{\varepsilon}_1 = (1, 1, 1), \vec{\varepsilon}_2 = (1, -1, 0), \vec{\varepsilon}_3 = (1, 1, -2)\}$ .
- (4) Να προσδιορίσετε αντιστρέψιμο πίνακα  $P$  τέτοιο ώστε  $B = P^{-1} \cdot A^{-1} \cdot P$ .
- (5) Να υπολογίσετε τον πίνακα  $A^n$ ,  $\forall n \geq 1$ .

**Άσκηση 211.** Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  που ορίζεται ως εξής :

$$f(x, y, z) = \left( \frac{19}{4}x - \frac{1}{4}y - \frac{13}{4}z, \frac{9}{4}x + \frac{5}{4}y - \frac{11}{4}z, 3x + y - 4z \right)$$

- (1) Να βρείτε τον πίνακα  $A$  της  $f$  στην ακόλουθη (κανονική) βάση του  $\mathbb{R}^3$  :  
 $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$
- (2) Να βρείτε τον πίνακα  $B$  της  $f$  στη βάση στην ακόλουθη βάση του  $\mathbb{R}^3$  :  
 $\mathcal{C} = \{(2, 1, 1), (1, 2, 1), (1, 1, 2)\}$
- (3) Να προσδιορίσετε αντιστρέψιμο πίνακα  $P$  έτσι ώστε  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Άσκηση 212.** Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y, z, w) = (x + z, y + w)$ .

- (1) Να βρείτε τον πίνακα  $A$  της  $f$  στις βάσεις

$$\mathcal{B} = \{(1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\} \quad \text{και} \quad \mathcal{C} = \{(1, 0), (0, 1)\}$$

- (2) Να βρείτε τον πίνακα  $B$  της  $f$  στις βάσεις

$$\mathcal{B}' = \left\{ \left( \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), \left( -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right\} \quad \text{και} \quad \mathcal{C}' = \{(1, 1), (1, -1)\}$$

- (3) Να βρείτε αντιστρέψιμους πίνακες  $P$  και  $Q^{-1}$  έτσι ώστε  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Άσκηση 213.** Έστω η γραμμική απεικόνιση

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (-x + y - z, x + 2y, -y + 3z)$$

Να δείξετε ότι η  $f$  είναι ισομορφισμός και να βρεθεί ο πίνακας της  $f^{-1}$  στην βάση

$$\mathcal{C} = \{\vec{\varepsilon}_1 = (1, 1, 1), \vec{\varepsilon}_2 = (1, 1, 0), \vec{\varepsilon}_3 = (1, 0, 0)\}$$

**Άσκηση 214.** Έστω η γραμμική απεικόνιση

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + y, y + z, z + x)$$

Αν  $A$  είναι ο πίνακας της  $f$  στη κανονική βάση  $\mathcal{B}$  του  $\mathbb{R}^3$ , να βρεθεί γραμμική απεικόνιση  $g$  έτσι ώστε  $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(g) = A^{-1}$ .

**Άσκηση 215.** Έστω η γραμμική απεικόνιση

$$f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + 3y - z, 2x - y, y + 2z)$$

Αν  $\mathcal{B}$  είναι η κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$  και

$$\mathcal{C} = \{(1, -1, 0), (0, 1, 2), (1, 0, 1)\}$$

και αν  $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$  και  $B = M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(f)$ , να βρεθεί αντιστρέψιμος πίνακας  $P$  έτσι ώστε  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

**Άσκηση 216.** Έστω  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$  η κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$  και  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  η μοναδική γραμμική απεικόνιση έτσι ώστε

$$f(\vec{e}_1) = 2\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + \vec{e}_3, \quad f(\vec{e}_2) = 2\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2, \quad f(\vec{e}_3) = 3\vec{e}_1 + 7\vec{e}_2$$

Να βρεθεί ο πίνακας  $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}(f)$  της  $f$  όπου

$$\mathcal{C} = \{\vec{e}_1 = (3, 0, -1), \vec{e}_2 = (1, 2, 0), \vec{e}_3 = (-1, 3, 1)\}$$

**Άσκηση 217.** Έστω η γραμμική απεικόνιση  $f : M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ ,  $f(X) = A \cdot X$ , όπου:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

Να βρεθεί ο πίνακας της  $f$  στη κανονική βάση του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Είναι η  $f$  ισομορφισμός;

**Άσκηση 218.** Έστω η γραμμική απεικόνιση  $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $f(x, y, z) = (x, y)$ . Έστω  $\mathcal{B}$  και  $\mathcal{C}$  οι κανονικές βάσεις των  $\mathbb{R}^3$  και  $\mathbb{R}^2$ . Θεωρούμε τις βάσεις

$$\mathcal{B}' = \{(1, -1, 0), (1, 0, -1), (1, 1, 1)\} \quad \text{και} \quad \mathcal{C}' = \{(4, 3), (3, 2)\}$$

Να βρεθεί αντιστρέψιμος πίνακας  $P \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  και αντιστρέψιμος  $Q \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$  έτσι ώστε

$$P^{-1} \cdot A \cdot Q = M_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{C}'}(f)$$

**Άσκηση 219.** Θεωρούμε τις ακόλουθες βάσεις του  $\mathbb{R}^3$ :

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 1, -1), \vec{e}_2 = (0, 0, 1), \vec{e}_3 = (1, 0, 1)\}$$

$$\mathcal{C} = \{\vec{e}_1 = (2, 0, 1), \vec{e}_2 = (1, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 1, -1)\}$$

Αν  $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  είναι η μοναδική γραμμική απεικόνιση έτσι ώστε:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

να βρεθεί ο πίνακας  $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$ .

### Μέρος 3. Συμπληρωματικές Ασκήσεις

**Άσκηση 220.** Ας είναι  $S = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_k\} \subseteq V$ , όπου  $V$  είναι ένας  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος διάστασης  $n$ . Να εξεταστεί ποιο από τα επόμενα είναι αληθές και ποιο ψευδές:

- (1) Αν το  $S$  είναι βάση του  $V$ , τότε  $n = k$ .
- (2) Αν το  $S$  παράγει τον  $V$ , τότε  $k \leq n$ .
- (3) Αν το  $S$  είναι γραμμικώς ανεξάρτητο, τότε  $k \leq n$ .
- (4) Αν το  $S$  είναι γραμμικώς ανεξάρτητο και  $k = n$ , τότε το  $S$  παράγει τον  $V$ .
- (5) Το  $S$  είτε είναι μια βάση είτε περιέχει κάποιο διάνυσμα που εκφράζεται ως  $\mathbb{K}$ -γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων.

**Άσκηση 221.** Να εξεταστεί ποιο από τα επόμενα είναι αληθές και ποιο ψευδές:

- (1) Αν  $A$  είναι ένας  $5 \times 5$  πίνακας με πραγματικές συνιστώσες και  $\det A = 2$ , τότε οι τέσσερις πρώτες στήλες του  $A$  παράγουν έναν υπόχωρο διάστασης 4 του  $\mathbb{R}^5$ .
- (2) Ένα  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς ανεξάρτητο σύνολο διανυσμάτων δεν περιέχει ποτέ ένα διάνυσμα που να είναι συνδυασμός κάποιων από τα υπόλοιπα διανύσματά του.
- (3) Αν  $V = \langle \vec{v}_2, \vec{v}_3 \rangle$  και  $\dim_{\mathbb{K}} V = 2$ , τότε το  $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$  είναι γραμμικώς εξαρτημένο.
- (4) Ένα σύνολο διανυσμάτων που περιέχει το μηδενικό διάνυσμα είναι πάντοτε  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς εξαρτημένο.
- (5) Κάθε διανυσματικός χώρος έχει πεπερασμένη διάσταση.
- (6) Το σύνολο  $\{(i, 0), (0, i), (1, i)\} \subseteq \mathbb{C}^2$ , όπου  $i^2 = -1$  περιέχει τουλάχιστον ένα διάνυσμα το οποίο είναι  $\mathbb{C}$ -γραμμικός συνδυασμός των υπολοίπων.

**Άσκηση 222.** Ας είναι  $\phi : V \rightarrow W$  μια  $\mathbb{K}$ -γραμμική απεικόνιση μεταξύ δύο  $\mathbb{K}$ -διανυσματικών χώρων, όπου  $\dim_{\mathbb{K}} V < \infty$ . Αν  $U$  είναι ένας  $\mathbb{K}$ -υπόχωρος του  $V$ , να δείχθει ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \phi(U) \leq \dim_{\mathbb{K}} U$ .

**Άσκηση 223.** Αν  $A$  είναι ένας  $m \times n$  πίνακας με συνιστώσες από το σώμα  $\mathbb{K}$ , θα συμβολίζουμε με  $N(A)$  τον χώρο των λύσεων του ομογενούς συστήματος  $AX = \mathbb{O}$ , όπου  $X$  είναι ο  $n \times 1$  πίνακας των αγνώστων  $x_1, x_2, \dots, x_n$  και  $\mathbb{O}$  είναι ο μηδενικός  $m \times 1$  πίνακας. Θα ονομάζουμε μηδενόχωρο του  $A$  τον χώρο  $N(A)$ .

Ας είναι  $\mathcal{V}(A)$  ο υπόχωρος του  $M(\mathbb{K})_{m \times 1}$ , ο οποίος παράγεται από τις στήλες του  $A$ .

Να δείχθει ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{V}(A) + \dim_{\mathbb{K}} N(A) = n$ .

**Άσκηση 224.** Τα επόμενα ζεύγη πινάκων  $(A, B)$  απαρτίζονται από έναν πίνακα  $A$  και από έναν γραμοϊσοδύναμο του  $B$ . Χωρίς να εκτελέσετε πράξεις να προσδιορίσετε βάσεις του χώρου που παράγεται

- (1) από τις γραμμές του  $A$
- (2) από τις στήλες του  $A$ .

Επίσης να βρείτε μια βάση του μηδενόχωρου  $N(A)$  του  $A$  με όσο το δυνατόν λιγότερες πράξεις.

Τα ζεύγη είναι

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -1 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

και

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & -1 & 1 & 1 & 8 & 9 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 1 & 6 & 8 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 0 & 0 & -4 & -6 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 6 & 7 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 225.** Να δώσετε μια συνθήκη που να αναφέρεται στον πίνακα των συντελεστών ενός ομογενούς συστήματος από όπου να προκύπτει ότι το σύστημα έχει μοναδική λύση.

**Άσκηση 226.** Να συμπληρωθούν τα επόμενα:

- (1) Αν  $A$  είναι ένας  $3 \times 7$  πίνακας, τότε η βαθμίδα του ισούται το πολύ με \_\_\_\_\_
- (2) Ισοδύναμα συστήματα έχουν το ίδιο \_\_\_\_\_
- (3) Η βαθμίδα ενός μη μηδενικού  $3 \times 3$  πίνακα, που έχει όλες τις συνιστώσες του ίσες, είναι ίση με \_\_\_\_\_
- (4) Αν  $A$  είναι ένας  $4 \times 8$  πίνακας, τότε η διάσταση τού μηδενόχωρου  $\mathcal{N}(A)$  τού  $A$  είναι ίση ή μεγαλύτερη από \_\_\_\_\_
- (5) Η βαθμίδα ενός μη μηδενικού  $4 \times 3$  πίνακα, όπου όλες οι στήλες του αποτελούνται από την ίδια συνιστώσα ισούται με \_\_\_\_\_
- (6) Παράδειγμα πίνακα  $A$  με βαθμίδα 2 και διάσταση μηδενόχωρου  $\mathcal{N}(A)$  είναι ο \_\_\_\_\_
- (7) Το μέγεθος τού πίνακα  $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$  είναι \_\_\_\_\_

**Άσκηση 227.** Να εξεταστεί ποιο από τα επόμενα είναι αληθές και ποιο ψευδές:

- (1) Αν ένα σύστημα δεν είναι συμβιβαστό, τότε η βαθμίδα τού επαυξημένου πίνακα είναι μεγαλύτερη από το πλήθος των αγνώστων.
- (2) Ένα ομογενές σύστημα είναι πάντοτε συμβιβαστό.
- (3) Ένα σύστημα με συντελεστές από το  $\mathbb{C}$ , που αποτελείται από 3 εξισώσεις και 4 αγνώστους διαθέτει πάντοτε άπειρες το πλήθος λύσεις.
- (4) Ένα ομογενές σύστημα με περισσότερες εξισώσεις από αγνώστους έχει πάντοτε και άλλες λύσεις εκτός τής μηδενικής.

**Άσκηση 228.** Να αποδειχθεί ή να δοθεί αντιπαράδειγμα στην επόμενη πρόταση: Αν δύο γραμμικά συστήματα είναι ισοδύναμα, τότε οι επαυξημένοι πίνακές τους έχουν το ίδιο μέγεθος.

**Άσκηση 229.** Έστω ότι ένας πίνακας  $C$  μπορεί να γραφεί ως  $C = (A | B)$ , όπου οι  $A$  και  $B$  είναι πίνακες με πλήθος γραμμών ίσο με το πλήθος γραμμών τού  $C$ . Να δειχθεί ότι  $r(C) \leq r(A) + r(B)$ .

**Άσκηση 230.** Να δειχθεί ότι για δύο  $m \times n$  πίνακες  $A$  και  $B$  ισχύει:  $-(A + B) = (-A) + (-B)$ .

**Άσκηση 231.** Έστω οι πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Να προσδιοριστεί ο  $3 \times 3$  πίνακας  $X$ , ο οποίος ικανοποιεί την εξίσωση:

$$A + 3X = 2(X - B).$$



**Άσκηση 232.** Για ποιές τιμές των  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K}$  είναι οι ακόλουθοι πίνακες (i) βαθμωτοί, (ii) διαγώνιοι, (iii) συμμετρικοί, (iv) αντισυμμετρικοί, (v) άνω τριγωνικοί, (vi) κάτω τριγωνικοί:

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ \alpha & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha & \alpha & \gamma \\ -\gamma & -\gamma & \alpha \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} \beta & \beta & \beta \\ \alpha & \beta & \gamma \\ \alpha & \alpha & \beta \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & \beta & \beta \\ \alpha & 1 & 0 \\ \alpha & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**Άσκηση 233.** Έστω  $n \in \mathbb{N}$  με  $n \geq 2$ . Ας είναι  $\Delta_n$  (αντιστοίχως  $\nabla_n$ ) το σύνολο των άνω (αντιστοίχως κάτω) τριγωνικών  $n \times n$  πινάκων με συνιστώσες από το  $\mathbb{K}$ .

Ναδειχθεί ότι η τομή  $\Delta_n \cap \nabla_n$  των δύο αυτών συνόλων ισούται με το σύνολο των διαγώνιων πινάκων.

**Άσκηση 234.** Έστω  $n \in \mathbb{N}$  με  $n \geq 2$ .

- (1) Ναδειχθεί ότι κάθε  $n \times n$  πίνακας  $A$  ισούται με ένα άθροισμα πινάκων  $D + D'$ , όπου ο  $D$  είναι άνω τριγωνικός και ο  $D'$  κάτω τριγωνικός. Ακολουθώντας να εξεταστεί το κατά πόσο αυτή η παράσταση του  $A$  είναι μοναδική.
- (2) Ναδειχθεί ότι κάθε  $n \times n$  πίνακας  $A$  ισούται με ένα άθροισμα πινάκων  $E + E'$ , όπου ο  $E$  είναι άνω τριγωνικός με τη κύρια διαγώνιο του ίση με μηδέν και ο  $E'$  είναι κάτω τριγωνικός. Ακολουθώντας να εξεταστεί το κατά πόσο αυτή η παράσταση του  $A$  είναι μοναδική.

**Άσκηση 235.** Να υπολογιστεί το γινόμενο πινάκων:

$$\begin{pmatrix} x & y & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$

και κατόπιν να εκφραστούν ως γινόμενα πινάκων οι παρακάτω ισότητες:

- (1)  $x^2 + 9xy + y^2 + 8x + 5y + 2 = 0$ ,
- (2)  $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} = 1$ ,
- (3)  $xy = \alpha^2$ ,
- (4)  $y^2 = 4\alpha x$ .

**Άσκηση 236.** Ναδειχθεί ότι για τους πίνακες

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

είναι  $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$ , μολονότι  $(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$ .

**Άσκηση 237.** Ναδειχθεί ότι η εξίσωση (ως προς  $X$ ) των  $2 \times 2$  πινάκων  $X^2 = I_2$ , διαδέτει ως λύση κάθε τετραγωνικό πίνακα τής μορφής  $\begin{pmatrix} 0 & \lambda \\ \lambda^{-1} & 0 \end{pmatrix}$ , όπου  $\lambda$  είναι οποιοδήποτε μη μηδενικό στοιχείο του  $\mathbb{K}$ . (Συνεπώς, ο ταυτοτικός  $2 \times 2$  πίνακας  $I_2$  διαδέτει άπειρο το πλήθος τετραγωνικές ρίζες.)

**Άσκηση 238.** Ας είναι  $A$  ένας  $m \times n$  πίνακας με συνιστώσες από το  $\mathbb{K}$ . Ναδειχθεί ότι, αν ο  $A$  είναι συμμετρικός, τότε  $m = n$ .

**Άσκηση 239.** Για ποιές τιμές των  $m, n \in \mathbb{N}$  ισχύει:

$$A = B \Leftrightarrow \operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(B),$$

όπου  $A, B$  είναι δύο  $m \times n$  πίνακες;

**Άσκηση 240.** Ας είναι  $A$  ένας  $n \times n$  άνω τριγωνικός πίνακας, τού οποίου κάθε στοιχείο της κυρίας διαγωνίου του ισούται με  $0 \in \mathbb{K}$ . Να δειχθεί ότι  $A^n = \mathbb{O}_n$ .

**Άσκηση 241.** Να ευρεθούν όλοι οι πίνακες που μετατίθενται με τους πίνακες της μορφής:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(2) B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Λύση.** Ας είναι  $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ένας πίνακας με  $AC = CA$ , δηλαδή  $\begin{pmatrix} a & b \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b & 0 \\ c-d & 0 \end{pmatrix}$ . Τότε  $b = 0$  και  $c = a + d$ .

Ας είναι  $C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix}$  ένας πίνακας με  $BC = CB$ , δηλαδή  $\begin{pmatrix} d & e & f \\ g & h & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & d & e \\ 0 & g & h \end{pmatrix}$ . Τότε  $d = 0, g = 0, h = 0, e = a, k = a, f = b$ .

**Άσκηση 242.** Ένας πίνακας  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  ονομάζεται ταυτοδύναμος, αν  $A^2 = A$ .

Να δειχθεί ότι οι επόμενοι πίνακες είναι ταυτοδύναμοι:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 243.** Να προσδιοριστούν όλοι οι  $2 \times 2$  ταυτοδύναμοι πίνακες.

**Λύση.** Ας είναι  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ένας  $2 \times 2$  πίνακας με  $A^2 = A$ , δηλαδή

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + bc = a, (1) \\ ab + bd = b, (2) \\ ac + cd = c, (3) \\ bc + d^2 = d, (4). \end{cases}$$

Έστω ότι  $b \neq 0$ , τότε η (2) δίνει τη λύση  $d = 1 - a$ , η οποία ικανοποιεί και την (3). Από την (1) έχουμε  $c = \frac{a-a^2}{b}$ . Αυτές οι τιμές των  $c, d$  ικανοποιούν την (4).

Έστω ότι  $b = 0$ , τότε το παραπάνω σύστημα εξισώσεων γίνεται

$$\begin{cases} a^2 = a, \\ ac + cd = c, \\ d^2 = d \end{cases}$$

Παίρνοντας υπ' όψιν ότι  $a = 0$  ή  $1$  και  $d = 0$  ή  $1$  έχουμε τις λύσεις:  $(a = 0, b = 0, d = 1, c \in \mathbb{K})$ ,  $(a = 1, b = 0, d = 0, c \in \mathbb{K})$ ,  $(a = 0, b = 0, c = 0, d = 0)$ ,  $(a = 0, b = 0, c = 0, d = 1)$ ,  $(a = 1, b = 0, c = 0, d = 0)$ ,  $(a = 1, b = 0, c = 0, d = 1)$ .

**Άσκηση 244.** Ένας πίνακας  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  ονομάζεται μηδενοδύναμος, αν υπάρχει κάποιος φυσικός  $m$  με  $A^m = \mathbb{O}_m$ .

Ναδειχθεί ότι ο πίνακας  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  είναι μηδενοδύναμος.

**Άσκηση 245.** Να προσδιοριστούν όλοι οι  $2 \times 2$  πίνακες που υψούμενοι στο τετράγωνο χορηγούν τον μηδενικό  $2 \times 2$  πίνακα.

**Λύση.** Ας είναι  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ένας  $2 \times 2$  πίνακας με  $A^2 = \mathbb{O}_2$ , δηλαδή

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + bc = 0, (1) \\ ab + bd = 0, (2) \\ ac + cd = 0, (3) \\ bc + d^2 = 0, (4) \end{cases}$$

Έστω ότι  $b \neq 0$ , τότε η (1) δίνει  $c = -\frac{a^2}{b}$ , η (2) δίνει  $d = -a$ . Οι (3) και (4) ικανοποιούνται από τις προηγούμενες λύσεις.

Έστω ότι  $b = 0$ , τότε επειδή έπεται  $a = 0$  και  $d = 0$ , έχουμε τη λύση  $a = 0, b = 0, c \in \mathbb{K}, d = 0$ .

**Άσκηση 246.** Ένας πίνακας  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  ονομάζεται ενεθικτικός, αν  $A^2 = I_n$ .

Ναδειχθεί ότι για οποιαδήποτε γωνία  $\theta$ , ο πίνακας  $\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$  είναι ενεθικτικός.

**Άσκηση 247.** Ναδειχθεί ότι ένας πίνακας  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  είναι ενεθικτικός, αν και μόνο αν,  $(I_n - A)(I_n + A) = 0$ .

**Άσκηση 248.** Ναδειχθεί ότι, αν ο  $n \times n$  πίνακας  $A$  είναι ενεθικτικός, τότε ο πίνακας  $B = \frac{1}{2}(I_n + A)$  είναι ταυτοδύναμος.

**Άσκηση 249.** Ναδειχθεί ότι για οποιοδήποτε  $n \times n$  πίνακα  $A$ , οι πίνακες  $({}^t A)A$ ,  $A({}^t A)$  και  $A + {}^t A$  είναι συμμετρικοί.

**Άσκηση 250.** Ναδειχθεί ότι για οποιοδήποτε  $n \times n$  πίνακα  $A$ , ο πίνακας  $A - {}^t A$  είναι αντισυμμετρικός.

**Άσκηση 251.** Ναδειχθεί ότι οποιοδήποτε  $n \times n$  πίνακας  $A$  μπορεί να γραφεί ως  $A_1 + A_2$  με τον  $A_1$  συμμετρικό και τον  $A_2$  αντισυμμετρικό πίνακα.

**Άσκηση 252.** Να ευρεθούν όλες οι ελάχιστες οριζουσες δεύτερης τάξης και όλοι οι συμπαράγοντες του πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 6 & 7 & -1 \\ -3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

**Άσκηση 253.** Να ευρεθεί η οριζουσα τού προηγούμενου πίνακα ως ανάπτυγμα (α') τής πρώτης γραμμής, (β') τής πρώτης στήλης, (γ') τής δεύτερης γραμμής (δ') τής δεύτερης στήλης, (ε') τής τρίτης γραμμής, (στ') τής τρίτης στήλης.

**Άσκηση 254.** Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 4 & 1 & 0 & 14 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Να προσδιοριστούν τα  $\Delta_{13}$  και  $A_{13}$ , τα  $\Delta_{23}$  και  $A_{23}$ , τα  $\Delta_{22}$  και  $A_{22}$ , τα  $\Delta_{21}$  και  $A_{21}$ .

**Άσκηση 255.** Να προσδιοριστεί η οριζουσα των επόμενων πινάκων αναπτύσσοντάς την ως προς τη στήλη ή τη γραμμή τής επιλογής σας.

$$A_1 = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 7 \\ 2 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & -4 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & a & a^2 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a & a^2 \end{pmatrix}, A_4 = \begin{pmatrix} a+1 & a-1 & 7 \\ 2 & a-3 & 4 \\ 5 & a+1 & a \end{pmatrix},$$

$$A_5 = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & -3 & 0 \\ 2 & 10 & 3 & 2 \end{pmatrix}, A_6 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

**Άσκηση 256.** Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός των μηδενικών συνιστωσών που μπορεί να έχει ένας  $4 \times 4$  πίνακας, χωρίς όμως η οριζουσα του να είναι ίση με μηδέν;

**Λύση.** Ο ελάχιστος αριθμός των μη μηδενικών συνιστωσών του, ώστε η οριζουσα να μην ισούται με μηδέν, είναι τέσσερα και υλοποιείται από έναν διαγώνιο πίνακα όπου και τα τέσσερα στοιχεία τής κυρίας διαγωνίου είναι  $\neq 0$ . Μόνο τρία μη μηδενικά στοιχεία αναγκάζουν μία από τις τέσσερεις γραμμές τού πίνακα να αποτελείται πάντοτε μόνο από μηδενικά με συνέπεια η οριζουσα να είναι ίση με μηδέν.

Συνεπώς ο μέγιστος αριθμός των μηδενικών συνιστωσών του είναι  $16 - 4 = 12$ .

**Άσκηση 257.** Πόσες διαφορετικές τιμές μπορεί να έχει η οριζουσα ενός πίνακα τής μορφής

$$A = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix} \in M_{5 \times 5}(\mathbb{K}),$$

όπου τα «\*» παίρνουν τις τιμές τους από το  $\mathbb{K}$ ;

**Λύση.** Θεωρούμε το πέμπτο στοιχείο της τέταρτης γραμμής.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αν το πέμπτο στοιχείο της τέταρτης γραμμής είναι μηδέν, τότε ο πίνακας έχει την μορφή

$$A = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}.$$

Αναπτύσσοντας την ορίζουσα κατά τα στοιχεία της πρώτης γραμμής βλέπουμε ότι οφείλουμε να υπολογίσουμε δύο ορίζουσες  $4 \times 4$  πινάκων που και οι δύο τους έχουν τη μορφή

$$\begin{pmatrix} * & 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & 0 \\ * & * & * & * \end{pmatrix}.$$

Οι τελευταίοι πίνακες είναι κάτω τριγωνικοί με μηδενικό στοιχείο στην κύρια διαγώνιά τους και συνεπώς η ορίζουσά τους ισούται με μηδέν. Έτσι,  $\det(A) = 0$ .

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Αν το πέμπτο στοιχείο της τέταρτης γραμμής δεν είναι μηδέν, τότε αφαιρώντας ένα κατάλληλο πολλαπλάσιο της τέταρτης γραμμής από την πέμπτη, μπορούμε να μηδενίσουμε το πέμπτο στοιχείο της πέμπτης γραμμής.

Έτσι προκύπτει ο πίνακας

$$B = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & 0 \end{pmatrix}$$

με  $\det(B) = \det(A)$ .

Στον  $B$  εναλλάσσουμε την πέμπτη με την τέταρτη γραμμή. Έτσι προκύπτει ένας πίνακας της μορφής

$$C = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}.$$

Η  $\det(C) = 0$ , αφού η μορφή του  $C$  είναι ίδια με τη μορφή του  $A$  της Πρώτης Περίπτωσης. Επιπλέον  $\det(C) = -\det(B)$ . Άρα  $0 = \det(B) = \det(A)$ .

**Άσκηση 258.** Ας είναι  $A = (a_{ij})$  ένας  $n \times n$  πίνακας και  $A_{ij}$  το αλγεβρικό συμπλήρωμα του στοιχείου  $a_{ij}$ . Ναδειχθεί ότι, αν  $i \neq r$ , τότε

$$a_{i1}A_{r1} + a_{i2}A_{r2} + \dots + a_{in}A_{rn} = 0$$

και, αν  $j \neq s$ , τότε

$$a_{1j}A_{1s} + a_{2j}A_{2s} + \dots + a_{nj}A_{ns} = 0.$$

**Λύση.** Ας ονομάσουμε  $A'$  τον πίνακα που προκύπτει από τον  $A$  αντικαθιστώντας την  $r$ -οστή γραμμή του  $A$  από την  $i$ -οστή ( $i \neq r$ ) γραμμή του. Η  $\det A'$  ισούται με 0, αφού ο  $A'$  έχει δύο ίσες γραμμές (την  $i$ -οστή και την  $r$ -οστή). Αναπτύσσοντας την  $\det A'$  κατά τα στοιχεία της  $r$ -οστής γραμμής, τα οποία είναι τα  $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$  παίρνουμε:

$$a_{i1}A_{r1} + a_{i2}A_{r2} + \dots + a_{in}A_{rn} = \det A' = 0.$$

η απόδειξη τού άλλου τύπου είναι ανάλογη και εκτελείται με αντικαθιστώντας την  $s$ -οστή στήλη τού  $A$  με την  $j$ -οστή.

**Άσκηση 259.** Ναδειχθεί ότι η  $\det A$ , όπου  $A$  είναι ο  $n \times n$  Fibonacci πίνακας:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ισούται με τον  $n$ -οστό όρο τής ακολουθίας Fibonacci

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots = \{a_n\}_{n=1}^{\infty},$$

όπου  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$  ( $n \geq 3$ ).

**Λύση.** Ο  $1 \times 1$  πίνακας Fibonacci είναι ο  $(1)$  και η ορίζουσά του είναι η  $d_1 = 1$ .

Ο  $2 \times 2$  πίνακας Fibonacci είναι ο  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$  και η ορίζουσά του είναι η  $d_2 = 1 + 1 = 2$ .

Ας είναι  $d_n$  η ορίζουσα τού  $n \times n$  πίνακα Fibonacci. Θα δείξουμε ότι για  $n \geq 3$ , είναι  $d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$ .

Ο  $3 \times 3$  πίνακας Fibonacci είναι ο  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$  και η ορίζουσά του (αναπτύσσοντας ως προς τα στοιχεία τής πρώτης στήλης) είναι η:

$$d_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - (-1) = 3 = d_1 + d_2.$$

Θεωρούμε τώρα τον  $n \times n$  Fibonacci πίνακα  $A$  και υπολογίζουμε την ορίζουσά του αναπτύσσοντας κατά τα στοιχεία τής **πρώτης στήλης**: Προφανώς,  $\det A = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21}$ , αφού τα υπόλοιπα στοιχεία τής πρώτης στήλης είναι ίσα με μηδέν. Το  $a_{11} = 1$  και το συμπληρωμά του  $A_{11}$  ισούται με  $(-1)^{1+1}d_{n-1}$  (διαγράφοντας την πρώτη γραμμή και την πρώτη στήλη τού  $A$  προκύπτει και πάσι πίνακας Fibonacci με μέγεθος  $(n-1) \times (n-1)$ ). Το  $a_{21} = -1$  και το συμπληρωμά του  $A_{21}$  ισούται με  $(-1)^{2+1}D$ , όπου  $D$  είναι η ορίζουσα τού  $(n-1) \times (n-1)$  πίνακα  $A'$  που προκύπτει διαγράφοντας την πρώτη στήλη και δεύτερη γραμμή τού  $A$ , δηλαδή τού πίνακα

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Αλλά υπολογίζοντας την ορίζουσα  $D$  τού  $A'$  αναπτύσσοντας τώρα κατά τα στοιχεία τής **πρώτης γραμμής** βλέπουμε ότι αυτή η  $D$  συμπίπτει με την ορίζουσα τού  $(n-2) \times (n-2)$  Fibonacci πίνακα, δηλαδή με την ορίζουσα  $d_{n-2}$ . Έτσι τελικά έχουμε:

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} = (-1)^{1+1}d_{n-1} + (-1)(-1)^{2+1}d_{n-2} = d_{n-1} + d_{n-2}.$$

**Άσκηση 260.** Να εξεταστεί ποια από τα ακόλουθα υποσύνολα του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $\mathbb{R}^4$  είναι  $\mathbb{R}$ -διανυσματικοί υπόχωροι του:

- (1)  $W_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y, z = t\}$ ,
- (2)  $W_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0\}$ ,
- (3)  $W_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = 1\}$ ,
- (4)  $W_4 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid xt = yz\}$ .

**Λύση.** Υπενθυμίζουμε ότι για να αποτελεί το υποσύνολο  $W$  ενός  $\mathbb{K}$ -διανυσματικού χώρου  $V$ , έναν υπόχωρο του  $V$  πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

(i)  $W \neq \emptyset$ , (ii)  $\forall \vec{w}_1, \vec{w}_2 \in W \Rightarrow \vec{w}_1 + \vec{w}_2 \in W$ , (iii)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall \vec{w} \in W \Rightarrow \lambda \cdot \vec{w} \in W$ .

(α') Το  $W_1$  αποτελείται από τα στοιχεία του  $\mathbb{R}^4$  της μορφής  $(a, a, b, b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  και επειδή το  $(0, 0, 0, 0)$  ανήκει στο  $W_1$ , αφού είναι αυτής της μορφής, έπεται ότι  $W_1 \neq \emptyset$ .

Αν  $\vec{w}_1 \in W_1$  και  $\vec{w}_2 \in W_1$ , τότε το  $\vec{w}_1 = (a, a, b, b)$  και το  $\vec{w}_2 = (c, c, d, d)$ , όπου  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ . Έχουμε:

$$\vec{w}_1 + \vec{w}_2 = (a, a, b, b) + (c, c, d, d) = (a + c, a + c, b + d, b + d),$$

το οποίο έχει την κατάλληλη μορφή ώστε να ανήκει στο  $W_1$ .

Ανάλογα, αν  $\lambda \in \mathbb{K}$  και  $\vec{w} \in W_1$ , τότε το  $\vec{w} = (a, a, b, b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  και έχουμε:

$$\lambda \cdot \vec{w} = \lambda \cdot (a, a, b, b) = (\lambda a, \lambda a, \lambda b, \lambda b),$$

το οποίο έχει την κατάλληλη μορφή ώστε να ανήκει στο  $W_1$ .

(β') Το  $W_2$  είναι  $\neq \emptyset$ , αφού οι συνιστώσες του  $\vec{0} = (0, 0, 0, 0)$  ικανοποιούν την  $x + y + z + t = 0$ , που έχει ως συνέπεια να ανήκει το  $\vec{0}$  στο  $W_2$ .

Αν  $\vec{w}_1 = (a_1, b_1, c_1, d_1) \in W_2$  και  $\vec{w}_2 = (a_2, b_2, c_2, d_2) \in W_2$ , τότε  $a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 0$  και  $a_2 + b_2 + c_2 + d_2 = 0$ . Συνεπώς,  $(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) + (d_1 + d_2) = 0$  και γι' αυτό το  $\vec{w}_1 + \vec{w}_2 = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2, d_1 + d_2)$  ανήκει επίσης στο  $W_2$ .

Αν  $\lambda \in \mathbb{K}$  και  $\vec{w} = (a, b, c, d) \in W_2$ , τότε  $a + b + c + d = 0$ . Συνεπώς,  $\lambda a + \lambda b + \lambda c + \lambda d = \lambda 0 = 0$  και γι' αυτό το  $\lambda \vec{w} = (\lambda a, \lambda b, \lambda c, \lambda d)$  ανήκει επίσης στο  $W_2$ .

(γ') Το  $W_3$  δεν είναι διανυσματικός υπόχωρος του  $\mathbb{R}^4$ , μολονότι  $W_3 \neq \emptyset$ , αφού το  $(1, 1, 1, 1)$  είναι στοιχείο του. Πράγματι, αν ήταν διανυσματικός χώρος, τότε το μηδενικό στοιχείο του  $\mathbb{R}^4$ , δηλαδή το  $\vec{0} = (0, 0, 0, 0)$  θα ανήκε στο  $W_3$ . Το τελευταίο δεν μπορεί να συμβαίνει, αφού για να ανήκει το  $\vec{0}$  στο  $W_3$ , θα πρέπει, σύμφωνα με τον ορισμό του  $W_3$ , η πρώτη συνιστώσα του, το 0, να ισούται με 1.

(δ') Το  $W_4$  δεν είναι διανυσματικός υπόχωρος του  $\mathbb{R}^4$ , μολονότι  $W_4 \neq \emptyset$ , αφού οι συνιστώσες του  $\vec{0} = (0, 0, 0, 0)$  ικανοποιούν την  $xt = yz$  και συνεπώς  $\vec{0} \in W_4$ . Παρατηρούμε ότι το  $\vec{w}_1 = (0, 0, 2, 4)$  ανήκει στο  $W_4$ , αφού  $0 \cdot 4 = 0 \cdot 2$  και το  $\vec{w}_2 = (4, 1, 8, 2)$ , αφού  $4 \cdot 2 = 1 \cdot 8$ . Ωστόσο, το  $\vec{w}_1 + \vec{w}_2 = (4, 1, 10, 6)$  δεν ανήκει στο  $W_4$ , αφού  $4 \cdot 6 \neq 1 \cdot 10$ .

**Άσκηση 261.** Έστω  $\text{Seq}(\mathbb{R})$  το σύνολο των πραγματικών ακολουθιών. Στο  $\text{Seq}(\mathbb{R})$  ορίζουμε πρόσθεση

$$+ : \text{Seq}(\mathbb{R}) \times \text{Seq}(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Seq}(\mathbb{R}),$$

$$((a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mapsto (a_n)_{n \in \mathbb{N}} + (b_n)_{n \in \mathbb{N}} := (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

και βαθμωτό πολλαπλασιασμό

$$\cdot : \mathbb{R} \times \text{Seq}(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Seq}(\mathbb{R}), (\lambda, (a_n)_{n \in \mathbb{N}}) \mapsto \lambda \cdot (a_n)_{n \in \mathbb{N}} := (\lambda a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

- (1) Ναδειχθεί ότι η τριάδα  $(\text{Seq}(\mathbb{R}), +, \cdot)$  αποτελεί  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο.
- (2) Ας είναι  $\text{finSeq}(\mathbb{R})$  το υποσύνολο του  $\text{Seq}(\mathbb{R})$  που απαρτίζεται από τις ακολουθίες που συγκλίνουν σε κάποιον πραγματικό αριθμό. Ποιες γνωστές προτάσεις του Απειροστικού Λογισμού εξασφαλίζουν ότι το  $\text{finSeq}(\mathbb{R})$  είναι ένας διανυσματικός υπόχωρος του  $\text{Seq}(\mathbb{R})$ ;

**Λύση.** (α') Το πρώτο μέρος της άσκησης μπορεί να προκύψει αμέσως από την:

**Πρόταση.** Έστω ότι  $S$  είναι ένα μη κενό σύνολο και ότι  $(V, +, \cdot)$  είναι ένας  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος. Το σύνολο  $\text{Map}(S, V) := \{f : S \rightarrow V\}$  των απεικονίσεων από το  $S$  στο  $V$  αποτελεί έναν  $\mathbb{K}$ -διανυσματικό χώρο με πράξεις την πρόσθεση:

$$+ : \text{Map}(S, V) \times \text{Map}(S, V) \rightarrow \text{Map}(S, V), (f, g) \mapsto f + g,$$

όπου  $f + g$  είναι η απεικόνιση που ορίζεται ως

$$f + g : S \rightarrow V, s \mapsto (f + g)(s) := f(s) + g(s), \forall s \in S.$$

και βαθμωτό πολλαπλασιασμό

$$\cdot : \mathbb{K} \times \text{Map}(S, V) \rightarrow \text{Map}(S, V), (\lambda, f) \mapsto \lambda \cdot f,$$

όπου  $\lambda \cdot f$  είναι η απεικόνιση που ορίζεται ως

$$\lambda \cdot f : S \rightarrow V, s \mapsto (\lambda \cdot f)(s) := \lambda f(s), \forall s \in S.$$

Επιλέγοντας ως  $S$  το σύνολο των φυσικών αριθμών  $\mathbb{N}$  και ως  $V$  τον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}$ , παίρνουμε  $\text{Map}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) = \text{Seq}(\mathbb{R})$ .

(β') Για να δείξουμε ότι  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι  $\mathbb{R}$ -διανυσματικός υπόχωρος πρέπει να εξασφαλίσουμε:

- (1) 'Ότι το  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι μη κενό. Πράγματι το όριο κάθε σταθερής ακολουθίας πραγματικών αριθμών, δηλαδή κάθε ακολουθίας της μορφής  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}, a_i = c \in \mathbb{R}, \forall i \in \mathbb{N}$ , είναι ο αριθμός  $c$ . Συνεπώς, οι σταθερές ακολουθίες ανήκουν στο  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  και γι' αυτό δεν είναι το κενό σύνολο.
- (2) 'Ότι, αν  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$  και  $(b_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$ , τότε και η ακολουθία  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} + (b_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$ , δηλαδή ότι αν η ακολουθία  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $r_1 \in \mathbb{R}$  και η ακολουθία  $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $r_2 \in \mathbb{R}$ , τότε το άθροισμά τους  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} + (b_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $r_1 + r_2 \in \mathbb{R}$ . Συνεπώς το  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση τού  $(\text{Seq}(\mathbb{R}))$ .
- (3) 'Ότι, αν  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$ , τότε και η ακολουθία  $\lambda \cdot (a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$ , δηλαδή ότι αν η ακολουθία  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $r \in \mathbb{R}$  και  $\lambda$  είναι ένας πραγματικός αριθμός, τότε το βαθμωτό γινόμενο  $\lambda \cdot (a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (\lambda a_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $\lambda r \in \mathbb{R}$ . Συνεπώς το  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι κλειστό ως προς τον βαθμωτό πολλαπλασιασμό που ορίζεται στο  $\text{Seq}(\mathbb{R})$ .

**Άσκηση 262.** Να εξεταστεί ποιο από τα επόμενα υποσύνολα τού  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$  των  $n \times n$  πινάκων με συνιστώσες από το  $\mathbb{R}$  αποτελεί  $\mathbb{R}$ -υπόχωρο τού  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ :

- (1) Το σύνολο των συμμετρικών των  $n \times n$  πινάκων.
- (2) Το σύνολο των αντιστρέψιμων των  $n \times n$  πινάκων.
- (3) Το σύνολο των μη αντιστρέψιμων  $n \times n$  πινάκων.

**Λύση.** (α') Έστω  $S$  το σύνολο των συμμετρικών  $n \times n$  πινάκων, δηλαδή των πινάκων  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  με  $A = {}^t A$ . Για να είναι το  $S$  ένας  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος τού  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ , θα πρέπει:

Το  $S$  να μην είναι κενό. Πράγματι, ο ταυτοτικός  $n \times n$  πίνακας  $I_n$  είναι συμμετρικός και γι' αυτό ανήκει στο  $S$ . Άρα,  $S \neq \emptyset$ .

Αν  $A, B \in S$ , τότε και  $A + B \in S$ . Πράγματι,  ${}^t(A + B) = {}^t A + {}^t B = A + B$ . Συνεπώς,  $A + B \in S$ .

Αν  $\lambda \in \mathbb{R}$  και  $A \in S$ , τότε και  $\lambda \cdot A \in S$ . Πράγματι,  ${}^t(\lambda \cdot A) = \lambda \cdot {}^t A = \lambda \cdot A$ . Συνεπώς  $\lambda \cdot A \in S$ . Επομένως το  $S$  είναι ένας  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος τού  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

(β') Έστω  $T$  το σύνολο των αντιστρέψιμων  $n \times n$  πινάκων. Για να είναι το  $T$  ένας  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος τού  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ , θα πρέπει:

Το  $T$  να μην είναι κενό. Πράγματι, ο ταυτοτικός  $n \times n$  πίνακας  $I_n$  είναι αντιστρέψιμος και γι' αυτό ανήκει στο  $T$ . Άρα,  $T \neq \emptyset$ .



Αν  $A, B \in T$ , τότε και  $A + B \in T$ . Αυτό όμως οφείλει να συμβαίνει για όλους τους αντιστρέψιμους πίνακες  $A, B$ . Επιλέγοντας ως  $A$  τον  $I_n$  και ως  $B$  τον  $-I_n$ , ο οποίος προφανώς είναι αντιστρέψιμος, έχουμε:  $I_n + (-I_n) = \mathbb{O}_n$ . Αλλά ο μηδενικός  $n \times n$  πίνακας  $\mathbb{O}_n$  δεν ανήκει στο  $T$ , αφού δεν είναι αντιστρέψιμος. Συνεπώς ο  $T$  **δεν είναι**  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

(γ') Έστω  $Q$  το σύνολο των μη αντιστρέψιμων  $n \times n$  πινάκων. Για να είναι το  $Q$  ένας  $\mathbb{R}$  υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ , θα πρέπει:

Το  $Q$  να μην είναι κενό. Πράγματι, ο μηδενικός  $n \times n$  πίνακας  $\mathbb{O}_n$  δεν είναι αντιστρέψιμος και γι' αυτό ανήκει στο  $Q$ . Άρα,  $Q \neq \emptyset$ .

Τώρα θα διακρίνουμε περιπτώσεις.

Για  $n = 1$ , ο χώρος  $M_{1 \times 1}(\mathbb{R})$  ισούται με  $\mathbb{R}$  και το  $Q = \{0\}$  (κάθε μη μηδενικό στοιχείο του  $\mathbb{R}$  είναι αντιστρέψιμο). Προφανώς το  $Q = \{0\}$  **είναι**  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $\mathbb{R}$ .

Για  $n \geq 2$ , αν  $A, B \in Q$ , τότε θα πρέπει και  $A + B \in Q$ . Αυτό όμως οφείλει να συμβαίνει για όλους τους μη αντιστρέψιμους πίνακες  $A, B$ . Επιλέγοντας ως  $A = (a_{ij})$  τον πίνακα με  $a_{11} = 1$  και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ίσα με 0 έχουμε ότι  $A \in Q$ . Επιλέγοντας ως  $B = (b_{ij})$  τον πίνακα με  $b_{22} = \dots = b_{nn} = 1$  και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ίσα με 0 έχουμε ότι  $B \in Q$ . (Οι  $A, B$  δεν είναι αντιστρέψιμοι επειδή έχουν μηδενικές ορίζουσες.) Το άθροισμα  $A + B$  ισούται με τον ταυτοτικό πίνακα ο οποίος προφανώς είναι αντιστρέψιμος και συνεπώς  $A + B = I_n \notin Q$ . Συνεπώς ο  $Q$  **δεν είναι**  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

**Άσκηση 263.** Ας είναι

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1j} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2j} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{ij} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nj} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

ένας  $n \times n$  πίνακας με συνιστώσες από ένα σώμα  $\mathbb{K}$  και ας είναι

$$\vec{a}_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}, 1 \leq j \leq n$$

η  $j$ -οστή στήλη του πίνακα  $A$ .

Να δείχθει ότι το  $\mathbb{K}$ -γραμμικό ομογενές σύστημα

$$A \cdot X = \mathbb{O}_n, \text{ όπου } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ και } \mathbb{O}_n = \begin{pmatrix} 0_{\mathbb{K}} \\ 0_{\mathbb{K}} \\ \vdots \\ 0_{\mathbb{K}} \\ \vdots \\ 0_{\mathbb{K}} \end{pmatrix},$$

έχει μόνο τη μηδενική λύση, αν και μόνο αν, οι στήλες  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  του  $A$  είναι  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα του χώρου  $\mathbb{K}^n$ . Εδώ τα στοιχεία του  $\mathbb{K}^n$  τα θεωρούμε ως  $n$ -άδες, αλλά σε μορφή στηλών, δηλαδή  $n \times 1$  πινάκων.

**Λύση.** Παρατηρούμε ότι η  $n$ -άδα  $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_j, \dots, \lambda_n), \lambda_i \in \mathbb{K}$  είναι λύση του συστήματος:

$$\begin{array}{cccccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \cdots & + & a_{1j}x_j & + & \cdots & + & a_{1n}x_n & = & 0 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \cdots & + & a_{2j}x_j & + & \cdots & + & a_{2n}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}x_1 & + & a_{i2}x_2 & + & \cdots & + & a_{ij}x_j & + & \cdots & + & a_{in}x_n & = & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \cdots & + & a_{nj}x_j & + & \cdots & + & a_{nn}x_n & = & 0 \end{array}$$

αν και μόνο αν,

$$\lambda_1 \vec{a}_1 + \lambda_2 \vec{a}_2 + \cdots + \lambda_j \vec{a}_j + \cdots + \lambda_n \vec{a}_n = \mathbb{O}_n.$$

Επομένως το σύστημα έχει ως μοναδική λύση τη μηδενική λύση  $(0, 0, \dots, 0)$ , αν και μόνο αν, τα  $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$  είναι  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς ανεξάρτητα.

**Άσκηση 264.** Ας είναι  $A$  ένας  $n \times n$  πίνακας με συνιστώσες από ένα σώμα  $\mathbb{K}$ . Να δειχθεί ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

- (1) Ο πίνακας  $A$  είναι ένας αντιστρέψιμος πίνακας.
- (2) Οι στήλες του πίνακα  $A$  είναι  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα του χώρου  $\mathbb{K}^n$ . Εδώ τα στοιχεία του  $\mathbb{K}^n$  τα θεωρούμε ως  $n$ -άδες, αλλιώς σε μορφή στηλών, δηλαδή  $n \times 1$  πινάκων.
- (3) Οι γραμμές του πίνακα  $A$  είναι  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα του χώρου  $\mathbb{K}^n$ . Εδώ τα στοιχεία του  $\mathbb{K}^n$  τα θεωρούμε ως  $n$ -άδες, αλλιώς σε μορφή γραμμών, δηλαδή  $1 \times n$  πινάκων.

**Λύση.** Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι ένας  $n \times n$  πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος, αν και μόνο αν, το ομογενές σύστημα  $A \cdot X = \mathbb{O}_n$  έχει ως μοναδική λύση τη μηδενική. Λαμβάνοντας υπόψη την αμέσως προηγούμενη άσκηση, διαπιστώνουμε την ισοδυναμία των (α') και (β').

Επιπλέον είναι γνωστό αλλιώς και προφανές ότι ένας  $n \times n$  πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος, αν και μόνο αν, ο ανάστροφός του  ${}^t A$  είναι αντιστρέψιμος. Σύμφωνα με την ισοδυναμία των (α') και (β'), που μόλις αποδείξαμε, ο  ${}^t A$  είναι αντιστρέψιμος, αν και μόνο αν, οι στήλες του είναι  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα του χώρου  $\mathbb{K}^n$ . Αλλιώς οι στήλες του  ${}^t A$  είναι οι γραμμές του  $A$  και γι' αυτό οι στήλες του  ${}^t A$  είναι  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα του  $\mathbb{K}^n$ , αν και μόνο αν, οι γραμμές του  $A$  είναι  $\mathbb{K}$ -γραμμικώς ανεξάρτητα διανύσματα του  $\mathbb{K}^n$ . Αυτό αποδεικνύει την ισοδυναμία των (α') και (γ').

**Άσκηση 265.** Να εξεταστεί αν τα διανύσματα  $(3, 5, -4)$ ,  $(-3, -2, 4)$ ,  $(6, 1, -8)$  του  $\mathbb{R}^3$  είναι  $\mathbb{R}$ -γραμμικώς ανεξάρτητα ή όχι.

**Λύση.** Σύμφωνα με την προηγούμενη άσκηση είναι αρκετό να εξετάσουμε το, αν ο  $3 \times 3$  πίνακας  $A$ , που έχει ως γραμμές (ή στήλες), τα τρία αυτά διανύσματα είναι αντιστρέψιμος ή όχι. Έστω λοιπόν ότι

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & -4 \\ -3 & -2 & 4 \\ 6 & 1 & -8 \end{pmatrix}.$$

Επειδή η ορίζουσα  $\det A = 0$ , ο πίνακας  $A$  δεν είναι αντιστρέψιμος και τα  $(3, 5, -4)$ ,  $(-3, -2, 4)$ ,  $(6, 1, -8)$  είναι  $\mathbb{R}$ -γραμμικώς εξαρτημένα.

## Μέρος 4. Δοκιμασία 15 Λεπτών στην Τάξη

### 19. Δοκιμασία 1 - 16/11/2011

**Δοκιμασία 1.** Για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , θεωρούμε τον πίνακα

$$A(x) = \begin{pmatrix} 2011^x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Να αποδείξετε ότι

$$A(x) \cdot A(y) = A(x + y)$$

2. Να δείξετε ότι ο πίνακας  $A(x)$  είναι αντιστρέψιμος.

3. Να υπολογισθεί ο πίνακας  $A(x)^{-1}$ .

### 20. Δοκιμασία 2 - 23/11/2011

**Δοκιμασία 2.** Αν  $\lambda \in \mathbb{R}$ , να υπολογισθεί η ορίζουσα  $|A|$  του  $4 \times 4$  πίνακα πραγματικών αριθμών:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 - \lambda^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9 - \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

### 21. Δοκιμασία 3 - 30/11/2011

**Δοκιμασία 3.** • **Τμήμα Α:** Να βρεθεί η ισχυρά κλιμακωτή μορφή του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

και στην περίπτωση κατά την οποία ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος, να βρεθεί ο  $A^{-1}$  με χρήση πράξεων επί των γραμμών του  $A$ .

• **Τμήμα Β:** Να βρεθεί η ισχυρά κλιμακωτή μορφή του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

και στην περίπτωση κατά την οποία ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος, να βρεθεί ο  $A^{-1}$  με χρήση πράξεων επί των γραμμών του  $A$ .

### 22. Δοκιμασία 4 - 7/11/2011

**Δοκιμασία 4.** Να λυθεί το ακόλουθο γραμμικό σύστημα:

$$x + 2y - 2z - w = 0$$

$$2x + 5y - 3z - w = 1$$

$$3x + 8y - 4z - w = 2$$

$$x + 5y + z + 2w = 3$$

### 23. Δοκιμασία 5 - 14/11/2011

**Δοκιμασία 5.** Στο σύνολο  $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$  των θετικών πραγματικών αριθμών ορίζουμε πράξεις ως εξής:

**α.** Πρόσθεση:

$$\oplus : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad x \oplus y := xy$$

όπου  $((xy))$  συμβολίζει τον συνηθισμένο πολλαπλασιασμό πραγματικών αριθμών.

**β.** Βαθμωτός Πολλαπλασιασμός:

$$\odot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad \lambda \odot x := x^\lambda$$

1. Να εξετάσετε αν με τις παραπάνω πράξεις το σύνολο  $\mathbb{R}^+$  αποτελεί  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο.
2. Αν το σύνολο  $\mathbb{R}^+$  είναι  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρος, να προσδιορισθούν όλοι οι υπόχωροί του.

### 24. Δοκιμασία 6 - 21/11/2011

**Δοκιμασία 6.** Θεωρούμε τα ακόλουθα διανύσματα του  $\mathbb{R}^3$ , όπου  $\kappa \in \mathbb{R}$ :

$$\vec{x} = (\kappa, 1, -1), \quad \vec{y} = (0, \kappa, 1), \quad \vec{z} = (1, \kappa, -1)$$

1. Να βρεθούν οι τιμές του  $\kappa \in \mathbb{R}$  για τις οποίες τα διανύσματα  $\vec{x}$ ,  $\vec{y}$ ,  $\vec{z}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.
2. Για τις τιμές του  $\kappa \in \mathbb{R}$  για τις οποίες τα διανύσματα  $\vec{x}$ ,  $\vec{y}$ ,  $\vec{z}$  είναι γραμμικά εξαρτημένα, να βρεθεί μια σχέση γραμμικής εξάρτησης η οποία τα συνδέει.

### 25. Δοκιμασία 7 - 11/1/2012

**Δοκιμασία 7.** Θεωρούμε τους ακόλουθους υπόχωρους του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ :

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1 + x_4 = 0 \right\}$$

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1 + x_2 = 0 \text{ και } x_2 - 2x_4 = 0 \right\}$$

- (1) Να βρεθούν βάσεις των υπόχωρων:  $\mathcal{V}$ ,  $\mathcal{W}$ , και  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ .
- (2) Να συμπληρωθεί η βάση του  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$  που βρήκατε στο (1) σε μια βάση του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

### 26. Δοκιμασία 8 - 18/1/2012

**Δοκιμασία 8.** Έστω  $\mathcal{V}$  και  $\mathcal{W}$  δύο υπόχωροι του  $\mathbb{R}^7$ . Υποθέτουμε ότι:

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 4 \quad \text{και} \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{W} = 5$$

- (1) Ποιές είναι οι πιθανές τιμές για την διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W})$ ;
- (2) Να βρεθεί επακριβώς η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W})$ , αν γνωρίζουμε ότι:

$$\mathcal{V} \not\subseteq \mathcal{W} \quad \text{και} \quad \mathcal{V} + \mathcal{W} \neq \mathbb{R}^7$$

### 27. Δοκιμασία 9 - 28/1/2012

**Δοκιμασία 9.** Έστω

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$$

η κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$ , και έστω  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  η μοναδική γραμμική απεικόνιση έτσι ώστε:

$$f(\vec{e}_1) = (1, 1, 0), \quad f(\vec{e}_2) = (0, 1, 1), \quad f(\vec{e}_3) = (-1, 1, 2)$$

- (1) Να βρεθεί η γραμμική απεικόνιση  $f$ .
- (2) Να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker}(f)$  και την εικόνα  $\text{Im}(f)$  της  $f$ .
- (3) Πότε το διάνυσμα  $\vec{x} = (a, b, c)$  του  $\mathbb{R}^3$  ανήκει στην εικόνα  $\text{Im}(f)$  της  $f$ ;

### 28. Δοκιμασία 10 - 8/2/2012

**Δοκιμασία 10.** (1) Τμήμα Α': Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση

$$f : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_3[t], \quad f(P(t)) = t \cdot P(t)$$

και έστω οι ακόλουθες βάσεις των  $\mathbb{R}_2[t]$  και  $\mathbb{R}_3[t]$  αντίστοιχα:

$$\mathcal{B} = \{1, 1+t, 1+t+t^2\}$$

$$\mathcal{C} = \{1, t, t^2, t^3\} \quad \text{και} \quad \mathcal{C}' = \{1, 1+t, 1+t^2, 1+t+t^2+t^3\}$$

Να βρεθούν οι πίνακες  $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(f)$  και  $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}'}(f)$  της  $f$  ως προς τα ζεύγη βάσεων  $\{\mathcal{B}, \mathcal{C}\}$  και  $\{\mathcal{B}, \mathcal{C}'\}$ .

(2) Τμήμα Β': Για τις διάφορες τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  να ληθεί το ακόλουθο γραμμικό σύστημα:

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} x + \lambda y - z = 2 \\ 2x - y + \lambda z = 5 \\ x + 10y - 6z = 1 \end{cases}$$

## 29. Δοκιμασία 11 - 15/2/2012

**Δοκιμασία 11.** (1) **Τμήμα Α':** Έστω ότι ένας πίνακας  $C$  μπορεί να γραφεί ως  $C = (A|B)$ , όπου οι  $A$  και  $B$  είναι πίνακες με πλήθος γραμμών ίσο με το πλήθος γραμμών του  $C$ . Να δειχθεί ότι  $\mathbf{r}(C) \leq \mathbf{r}(A) + \mathbf{r}(B)$ .

(2) **Τμήμα Β':** Θεωρούμε την γραμμική απεικόνιση:

$$f: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}_2[t], \quad f(x, y) = x + y + (x - y)t - xt^2$$

και έστω οι βάσεις του  $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{B}_1 = \{\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (0, 1)\} \quad \text{και} \quad \mathcal{B}'_1 = \{\vec{e}'_1 = (1, 2), \vec{e}'_2 = (2, 1)\}$$

και οι βάσεις του  $\mathbb{R}_2[t]$

$$\mathcal{B}_2 = \{\vec{\varepsilon}_1 = 1, \vec{\varepsilon}_2 = t, \vec{\varepsilon}_3 = t^2\} \quad \text{και} \quad \mathcal{B}'_2 = \{\vec{\varepsilon}'_1 = 1, \vec{\varepsilon}'_2 = 1 + t, \vec{\varepsilon}'_3 = 1 + t + t^2\}$$

(α) Να βρεθεί ο πίνακας  $A = M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}(f)$ .

(β) Να βρεθεί ο πίνακας  $B = M_{\mathcal{B}'_2}^{\mathcal{B}'_1}(f)$ .

(γ) Να βρεθούν αντιστρέψιμοι πίνακες  $Q$  και  $P$ , έτσι ώστε:  $Q^{-1}AP = B$ .

## Μέρος 5. Λύσεις Δοκιμασιών 15 Λεπτών στην Τάξη

### 30. Δοκιμασία 1 - 16/11/2011

**Δοκιμασία 1.** Για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , θεωρούμε τον πίνακα

$$A(x) = \begin{pmatrix} 2011^x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Να αποδείξετε ότι

$$A(x) \cdot A(y) = A(x + y)$$

2. Να δείξετε ότι ο πίνακας  $A(x)$  είναι αντιστρέψιμος.

3. Να υπολογισθεί ο πίνακας  $A(x)^{-1}$ .

**Λύση.** Για κάθε  $x, y \in \mathbb{R}$  έχουμε

$$\begin{aligned} A(x)A(y) &= \begin{pmatrix} 2011^x & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2011^y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2011^x \cdot 2011^y & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x + y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2011^{(x+y)} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & x + y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= A(x + y) \end{aligned}$$

Παρατηρούμε ότι:

$$A(0) = \begin{pmatrix} 2011^0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$$

Επομένως, έχουμε

$$A(x)A(-x) = A(x + (-x)) = A(0) = I_3 = A(-x)A(x)$$

και άρα ο πίνακας  $A(x)$  είναι αντιστρέψιμος με  $A(x)^{-1} = A(-x)$ .  $\square$

### 31. Δοκιμασία 2 - 23/11/2011

**Δοκιμασία 2.** Αν  $\lambda \in \mathbb{R}$ , να υπολογισθεί η ορίζουσα  $|A|$  του  $4 \times 4$  πίνακα πραγματικών αριθμών:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 - \lambda^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9 - \lambda^2 \end{pmatrix}.$$

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{aligned} & \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 - \lambda^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9 - \lambda^2 \end{array} \right| \xrightarrow[\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - \Gamma_3]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_1} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 - \lambda^2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 - \lambda^2 \end{array} \right| \\ & = (4 - \lambda^2) \left| \begin{array}{ccc} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 - \lambda^2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \end{array} \right| = (4 - \lambda^2)(1 - \lambda^2) \left| \begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{array} \right| = -3(1 - \lambda^2)(4 - \lambda^2) \quad \square \end{aligned}$$

### 32. Δοκιμασία 3 - 30/11/2011

**Δοκιμασία 3.**

• **Τμήμα Α:** Να βρεθεί η ισχυρά κλιμακωτή μορφή του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

και στην περίπτωση κατά την οποία ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος, να βρεθεί ο  $A^{-1}$  με χρήση πράξεων επί των γραμμών του  $A$ .

• **Τμήμα Β:** Να βρεθεί η ισχυρά κλιμακωτή μορφή του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

και στην περίπτωση κατά την οποία ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος, να βρεθεί ο  $A^{-1}$  με χρήση πράξεων επί των γραμμών του  $A$ .

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{ccc|ccc} -1 & 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_1 \rightarrow -\Gamma_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 5 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \frac{1}{5}\Gamma_2} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \frac{3}{5} & -\frac{1}{5} & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \frac{1}{2}\Gamma_3} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & -2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1 + 2\Gamma_3} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & -3 & 0 & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1 + 3\Gamma_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{10} & \frac{7}{10} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

Άρα, η ισχυρά κλιμακωτή μορφή του πίνακα  $A$  είναι ο μοναδιαίος πίνακας  $I_3$  και

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} & \frac{7}{10} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \square$$



Όμοια εργαζόμαστε για τον πίνακα του Τμήματος Β.  $\square$

### 33. Δοκιμασία 4 - 7/11/2011

**Δοκιμασία 4.** Να λυθεί το ακόλουθο γραμμικό σύστημα:

$$x + 2y - 2z - w = 0$$

$$2x + 5y - 3z - w = 1$$

$$3x + 8y - 4z - w = 2$$

$$x + 5y + z + 2w = 3$$

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 & | & 0 \\ 2 & 5 & -3 & -1 & | & 1 \\ 3 & 8 & -4 & -1 & | & 2 \\ 1 & 5 & 1 & 2 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 3 & 8 & -4 & -1 & | & 2 \\ 1 & 5 & 1 & 2 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - 3\Gamma_1 \\ \Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - \Gamma_1 \end{matrix}}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 & | & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 2 & | & 2 \\ 0 & 3 & 3 & 3 & | & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} \Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - 2\Gamma_2 \\ \Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - 3\Gamma_2 \end{matrix}}$$

και άρα καταλήγουμε στο σύστημα:

$$\begin{cases} x + 2y - 2z - w = 0 \\ y + z + w = 1 \end{cases}$$

Τότε  $w = 1 - y - z$  και αντικαθιστώντας στην πρώτη εξίσωση έχουμε

$$x = -2y + 2z + w \Rightarrow x = -3y + z + 1$$

Θέτουμε  $y = \lambda, z = \kappa$  με  $\lambda, \kappa \in \mathbb{R}$ . Επομένως, έχουμε τη γενική λύση:

$$\begin{cases} x = -3\lambda + \kappa + 1 \\ y = \lambda \\ z = \kappa \\ w = 1 - \lambda - \kappa \end{cases} \quad \kappa, \lambda \in \mathbb{R}. \quad \square$$

### 34. Δοκιμασία 5 - 14/11/2011

**Δοκιμασία 5.** Στο σύνολο  $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$  των θετικών πραγματικών αριθμών ορίζουμε πράξεις ως εξής:

**α.** Πρόσθεση:

$$\oplus : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad x \oplus y := xy$$

όπου  $((xy))$  συμβολίζει τον συνηθισμένο πολλαπλασιασμό πραγματικών αριθμών.

**β.** Βαθμωτός Πολλαπλασιασμός:

$$\odot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}^+, \quad \lambda \odot x := x^\lambda$$

**1.** Να εξετάσετε αν με τις παραπάνω πράξεις το σύνολο  $\mathbb{R}^+$  αποτελεί  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο.

**2.** Αν το σύνολο  $\mathbb{R}^+$  είναι  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρος, να προσδιορισθούν όλοι οι υπόχωροί του.

**Λύση.** (1) Έστω  $x, y, z \in \mathbb{R}^+$  και  $r, s \in \mathbb{R}$ . Τότε:

$$(\alpha) (x \oplus y) \oplus z = (xy) \oplus z = (xy)z = x(yz) = x(y \oplus z) = x \oplus (y \oplus z).$$

$$(\beta) x \oplus y = xy = yx = y \oplus x.$$

(γ) Θέλουμε να εξετάσουμε αν υπάρχει ένα στοιχείο  $\mathbf{o} \in \mathbb{R}^+$  έτσι ώστε  $x \oplus \mathbf{o} = x = \mathbf{o} \oplus x$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}^+$ . Άρα

$$x \oplus \mathbf{o} = x \iff x\mathbf{o} = x \iff \mathbf{o} = 1$$

διότι το  $x \neq 0$ . Συνεπώς, το μηδενικό διάνυσμα είναι το στοιχείο  $\mathbf{o} = 1$ .

(δ) Θεωρούμε στοιχείο  $x \in \mathbb{R}^+$ . Θέλουμε να εξετάσουμε αν υπάρχει ένα στοιχείο  $y \in \mathbb{R}^+$  έτσι ώστε:  $x \oplus y = \mathbf{o} = y \oplus x$ . Επειδή από το προηγούμενο αξίωμα,  $\mathbf{o} = 1$ , θα έχουμε:  $x \oplus y = 1 \iff xy = 1$  και αφού  $x \in \mathbb{R}^+$  έπεται ότι  $y = \frac{1}{x} \in \mathbb{R}^+$ . Πράγματι, έχουμε

$$x \oplus \frac{1}{x} = x \frac{1}{x} = 1 = \frac{1}{x} x = \frac{1}{x} \oplus x$$

για κάθε  $x \in \mathbb{R}^+$ . Άρα, το αντίθετο του διανύσματος  $x \in \mathbb{R}^+$  ως προς την πρόσθεση  $\oplus$  είναι το διάνυσμα  $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}^+$ .

$$(\epsilon) r \odot (x \oplus y) = r \odot (xy) = (xy)^r = x^r y^r = x^r \oplus y^r = (r \odot x) \oplus (r \odot y).$$

$$(\sigma) (r + s) \odot x = x^{r+s} = x^r x^s = x^r \oplus x^s = (r \odot x) \oplus (s \odot x).$$

$$(\zeta) r \odot (s \odot x) = r \odot (x^s) = (x^s)^r = x^{sr} = (sr) \odot x.$$

$$(\eta) 1 \odot x = x^1 = x.$$

Επομένως, η τριάδα  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$  αποτελεί διανυσματικό χώρο υπεράνω του  $\mathbb{R}$ .

(2) Γνωρίζουμε ότι το σύνολο  $\{1\}$  και όλος ο χώρος  $\mathbb{R}^+$  είναι υπόχωροι του  $\mathbb{R}^+$ . Έστω  $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^+$  ένας υπόχωρος του  $\mathbb{R}^+$  έτσι ώστε  $\mathcal{V} \neq \{1\}$ , δηλαδή ο  $\mathcal{V}$  δεν είναι ο μηδενικός υπόχωρος του  $\mathbb{R}^+$ . Άρα υπάρχει ένα  $x \in \mathcal{V}$  με  $x \neq 1$ . Έστω  $k \in \mathbb{R}^+$ . Τότε έχουμε

$$k = x^{\log_x k} = \log_x k \odot x \in \mathcal{V}$$

αφού  $\log_x k \in \mathbb{R}$  και  $x \in \mathcal{V}$ . Συνεπώς έχουμε ότι  $\mathbb{R}^+ \subseteq \mathcal{V}$  και άρα  $\mathcal{V} = \mathbb{R}^+$ . Επομένως οι μόνοι υπόχωροι του διανυσματικού χώρου  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$  είναι το  $\{1\}$  και όλος ο χώρος  $\mathbb{R}^+$ .  $\square$

### 35. Δοκιμασία 6 - 21/11/2011

**Δοκιμασία 6.** Θεωρούμε τα ακόλουθα διανύσματα του  $\mathbb{R}^3$ , όπου  $\kappa \in \mathbb{R}$ :

$$\vec{x} = (\kappa, 1, -1), \quad \vec{y} = (0, \kappa, 1), \quad \vec{z} = (1, \kappa, -1)$$

1. Να βρεθούν οι τιμές του  $\kappa \in \mathbb{R}$  για τις οποίες τα διανύσματα  $\vec{x}$ ,  $\vec{y}$ ,  $\vec{z}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.
2. Για τις τιμές του  $\kappa \in \mathbb{R}$  για τις οποίες τα διανύσματα  $\vec{x}$ ,  $\vec{y}$ ,  $\vec{z}$  είναι γραμμικά εξαρτημένα, να βρεθεί μια σχέση γραμμικής εξάρτησης η οποία τα συνδέει.

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{vmatrix} \kappa & 1 & -1 \\ 0 & \kappa & 1 \\ 1 & \kappa & -1 \end{vmatrix} = \kappa \begin{vmatrix} \kappa & 1 \\ \kappa & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ \kappa & 1 \end{vmatrix} = -2\kappa^2 + \kappa + 1 = (\kappa - 1)\left(\kappa + \frac{1}{2}\right)$$

Άρα, για  $\kappa \neq 1$  και  $\kappa \neq \frac{1}{2}$  τα διανύσματα  $\vec{x}$ ,  $\vec{y}$ ,  $\vec{z}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

• Για  $\kappa = 1$  έχουμε ότι  $\vec{x} = (1, 1, -1)$ ,  $\vec{y} = (0, 1, 1)$ ,  $\vec{z} = (1, 1, -1)$  και εύκολα παρατηρούμε ότι  $1(1, 1, 1) + 0(0, 1, 1) + (-1)(1, 1, -1) = (0, 0, 0)$ .

• Για  $\kappa = \frac{1}{2}$  έχουμε ότι  $\vec{x} = (-\frac{1}{2}, 1, -1)$ ,  $\vec{y} = (0, -\frac{1}{2}, 1)$  και  $\vec{z} = (1, -\frac{1}{2}, -1)$ . Έστω

$$\begin{aligned} \lambda_1\left(-\frac{1}{2}, 1, -1\right) + \lambda_2\left(0, -\frac{1}{2}, 1\right) + \lambda_3\left(1, -\frac{1}{2}, -1\right) &= (0, 0, 0) \\ \Rightarrow \left(-\frac{1}{2}\lambda_1 + \lambda_3, \lambda_1 - \frac{1}{2}\lambda_2 - \frac{1}{2}\lambda_3, -\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3\right) &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

και άρα έχουμε το σύστημα:

$$(\Sigma) : \begin{cases} -\frac{1}{2}\lambda_1 + \lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 - \frac{1}{2}\lambda_2 - \frac{1}{2}\lambda_3 = 0 \\ -\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 = 0 \end{cases}$$

Η γενική λύση του  $(\Sigma)$  είναι  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (2k, 3k, k)$  με  $k \in \mathbb{R}$ . Συνεπώς, για  $k = 1$  έχουμε την ακόλουθη σχέση γραμμικής εξάρτησης:  $2\vec{x} + 3\vec{y} + \vec{z} = \vec{0}$ .  $\square$

### 36. Δοκιμασία 7 - 11/1/2012

**Δοκιμασία 7.** Θεωρούμε τους ακόλουθους υπόχωρους του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ :

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1 + x_4 = 0 \right\}$$

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1 + x_2 = 0 \text{ και } x_2 - 2x_4 = 0 \right\}$$

(1) Να βρεθούν βάσεις των υπόχωρων:  $\mathcal{V}$ ,  $\mathcal{W}$ , και  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ .

(2) Να συμπληρωθεί η βάση του  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$  που βρήκατε στο (1) σε μια βάση του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1 + x_4 = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & -x_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

και αν

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \lambda_3 & -\lambda_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

Επομένως, το σύνολο  $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$  αποτελεί βάση του  $\mathcal{V}$  αφού δείξαμε ότι είναι γραμμικά ανεξάρτητο και παράγει τον χώρο. Άρα  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 3$ . Για τον υπόχωρο  $\mathcal{W}$  έχουμε:

$$\begin{aligned} \mathcal{W} &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1 + x_2 = 0 \text{ και } x_2 - 2x_4 = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} -2x_4 & 2x_4 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x_4 \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

και εύκολα διαπιστώνουμε ότι το σύνολο  $\left\{ \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα αποτελεί βάση του  $\mathcal{W}$ . Άρα  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{W} = 2$ . Για τον υπόχωρο  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$  έχουμε:

$$\begin{aligned} \mathcal{V} \cap \mathcal{W} &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1 + x_4 = 0, x_1 + x_2 = 0 \text{ και } x_2 - 2x_4 = 0 \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_1 = x_2 = x_4 = 0 \text{ και } x_3 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid x_3 \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

και άρα  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} \cap \mathcal{W} = 1$  αφού το σύνολο  $\mathcal{C} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$  αποτελεί βάση του  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ . Για να συμπληρώσουμε το σύνολο  $\mathcal{C}$  σε μια βάση του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  χρειαζόμαστε άλλα τρία διανύσματα αφού  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = 4$ . Επομένως, θεωρούμε το σύνολο

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

που είναι γραμμικά ανεξάρτητο και είναι (η κανονική) βάση του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .  $\square$

### 37. Δοκιμασία 8 - 18/1/2012

**Δοκιμασία 8.** Έστω  $\mathcal{V}$  και  $\mathcal{W}$  δύο υπόχωροι του  $\mathbb{R}^7$ . Υποθέτουμε ότι:

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 4 \quad \text{και} \quad \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{W} = 5$$

- (1) Ποιές είναι οι πιθανές τιμές για την διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W})$ ;
- (2) Να βρεθεί επακριβώς η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W})$ , αν γνωρίζουμε ότι:

$$\mathcal{V} \not\subseteq \mathcal{W} \quad \text{και} \quad \mathcal{V} + \mathcal{W} \neq \mathbb{R}^7$$

**Λύση.** Από την εξίσωση των διαστάσεων έχουμε

$$\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} + \mathcal{W}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} + \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{W} - \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}) = 9 - \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W})$$

Επειδή ο  $\mathcal{V} + \mathcal{W}$  είναι υπόχωρος του  $\mathbb{R}^7$ , θα έχουμε  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} + \mathcal{W}) \leq 7$  και άρα από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι:  $9 - \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}) \leq 7$ , δηλαδή:

$$2 \leq \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}) \quad (1)$$

Όμως αφού ο  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$  είναι υπόχωρος του  $\mathcal{V}$  έπεται ότι

$$\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}) \leq 4 \quad (2)$$

Συνεπώς, από τις σχέσεις (1) και (2) συμπεραίνουμε ότι οι πιθανές τιμές για την διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W})$  είναι οι εξής:

$$2 \leq \dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}) \leq 4 \quad (*)$$

Υποθέτουμε τώρα ότι  $\mathcal{V} \not\subseteq \mathcal{W}$  και  $\mathcal{V} + \mathcal{W} \neq \mathbb{R}^7$ . Από την σχέση (\*) οι πιθανές τιμές της  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W})$  είναι 2, 3 ή 4.

- Έστω ότι  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}) = 4$ . Τότε αφού  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W} \subseteq \mathcal{V}$  και  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 4$  έπεται ότι  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W} = \mathcal{V}$  και άρα  $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{W}$ . Αυτό όμως είναι άτοπο διότι  $\mathcal{V} \not\subseteq \mathcal{W}$ .
- Έστω ότι  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}) = 2$ . Τότε από την εξίσωση των διαστάσεων έχουμε ότι  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} + \mathcal{W}) = 7$  και άρα  $\mathcal{V} + \mathcal{W} = \mathbb{R}^7$ . Πάλι όμως έχουμε καταλήξει σε άτοπο αφού  $\mathcal{V} + \mathcal{W} \neq \mathbb{R}^7$ .

Συνεπώς, από την σχέση (\*) έπεται ότι  $\dim_{\mathbb{R}}(\mathcal{V} \cap \mathcal{W}) = 3$ .  $\square$

### 38. Δοκιμασία 9 - 28/1/2012

**Δοκιμασία 9.** Έστω

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$$

η κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$ , και έστω  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  η μοναδική γραμμική απεικόνιση έτσι ώστε:

$$f(\vec{e}_1) = (1, 1, 0), \quad f(\vec{e}_2) = (0, 1, 1), \quad f(\vec{e}_3) = (-1, 1, 2)$$

- (1) Να βρεθεί η γραμμική απεικόνιση  $f$ .
- (2) Να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker}(f)$  και την εικόνα  $\text{Im}(f)$  της  $f$ .
- (3) Πότε το διάνυσμα  $\vec{x} = (a, b, c)$  του  $\mathbb{R}^3$  ανήκει στην εικόνα  $\text{Im}(f)$  της  $f$ ;

**Λύση. 1.** Έστω  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Τότε  $(x, y, z) = x(1, 0, 0) + y(0, 1, 0) + z(0, 0, 1)$  και επειδή η  $f$  είναι γραμμική έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= xf(1, 0, 0) + yf(0, 1, 0) + zf(0, 0, 1) \\ &= x(1, 1, 0) + y(0, 1, 1) + z(-1, 1, 2) \\ &= (x, x, 0) + (0, y, y) + (-z, z, 2z) \\ &= (x - z, x + y + z, y + 2z) \end{aligned}$$

Επομένως η  $f$  ορίζεται ως ακολούθως:

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad (x, y, z) \mapsto f(x, y, z) = (x - z, x + y + z, y + 2z)$$

**2.(α)** Έστω  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Τότε:  $(x, y, z) \in \text{Ker } f$  αν και μόνον αν:

$$f(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff (x - z, x + y + z, y + 2z) = (0, 0, 0) \iff x = z \text{ και } y = -2x$$

Συνεπώς ο πυρήνας της  $f$  είναι

$$\begin{aligned}\text{Ker } f &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = z \text{ και } y = -2x\} \\ &= \{(x, -2x, x) \in \mathbb{R}^3 \mid x \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x(1, -2, 1) \in \mathbb{R}^3 \mid x \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, -2, 1) \rangle\end{aligned}$$

και αφού  $(1, -2, 1) \neq (0, 0, 0)$  έπεται ότι το διάνυσμα  $(1, -2, 1)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Επομένως το σύνολο  $\{(1, -2, 1)\}$  αποτελεί βάση του  $\text{Ker } f$ .

**2.(β)** Επειδή το σύνολο  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ , ως βάση του  $\mathbb{R}^3$ , παράγει του  $\mathbb{R}^3$ , έπεται ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), f(\vec{e}_3)\}$ , παράγει την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ . Έτσι:

$$\text{Im } f = \langle f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1) \rangle = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1), (-1, 1, 2) \rangle$$

και

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 + \Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - 2\Gamma_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Συνεπώς

$$\text{Im } f = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1), (-1, 1, 2) \rangle = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

Διαφορετικά: εξετάζουμε αν τα παραπάνω διανύσματα είναι γραμμικά ανεξάρτητα: έστω  $\kappa(1, 1, 0) + \lambda(0, 1, 1) + \mu(-1, 1, 2) = (0, 0, 0)$ . Τότε θα έχουμε άμεσα:  $\kappa - \mu = 0$ ,  $\kappa + \lambda + \mu = 0$ , και  $\lambda + 2\mu = 0$ . Το σύστημα αυτό έχει ως γενική λύση:  $(\kappa, -2\kappa, \kappa)$  και επομένως, για  $\kappa = 1$ , θα έχουμε μια σχέση γραμμικής εξάρτησης:

$$(1, 1, 0) - 2(0, 1, 1) + (-1, 1, 2) = (0, 0, 0)$$

από την οποία βλέπουμε ότι  $(-1, 1, 2) \in \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$  και άρα όπως και παραπάνω:  $\text{Im } f = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1), (-1, 1, 2) \rangle = \langle (1, 1, 0), (0, 1, 1) \rangle$ .

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι τα διανύσματα  $(1, 1, 0), (0, 1, 1)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Άρα το σύνολο  $\{(1, 1, 0), (0, 1, 1)\}$  αποτελεί βάση της εικόνας  $\text{Im } f$  της  $f$ .

**3.** Ένα διάνυσμα  $\vec{x} = (a, b, c)$  του  $\mathbb{R}^3$  ανήκει στην εικόνα  $\text{Im}(f)$  της  $f$  αν και μόνο αν είναι γραμμικός συνδυασμός της βάσης της  $\text{Im}(f)$  που κατασκευάστηκε στο **2**. Άρα το διάνυσμα  $(a, b, c) \in \text{Im } f$  αν και μόνο αν υπάρχουν  $\lambda, \kappa \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε

$$\lambda(1, 1, 0) + \kappa(0, 1, 1) = (a, b, c) \Leftrightarrow \begin{cases} \lambda = a \\ \lambda + \kappa = b \\ \kappa = c \end{cases} \Leftrightarrow b = a + c$$

Επομένως, το διάνυσμα  $(a, b, c) \in \text{Im } f$  αν και μόνο αν  $b = a + c$ .  $\square$

### 39. Δοκιμασία 10 - 8/2/2012

**Δοκιμασία 10.** (1) **Τμήμα Α':** Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση

$$f: \mathbb{R}_2[t] \longrightarrow \mathbb{R}_3[t], \quad f(P(t)) = t \cdot P(t)$$

και έστω οι ακόλουθες βάσεις των  $\mathbb{R}_2[t]$  και  $\mathbb{R}_3[t]$  αντίστοιχα:

$$\mathcal{B} = \{1, 1+t, 1+t+t^2\}$$

$$\mathcal{C} = \{1, t, t^2, t^3\} \quad \text{και} \quad \mathcal{C}' = \{1, 1+t, 1+t+t^2, 1+t+t^2+t^3\}$$

Να βρεθούν οι πίνακες  $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(f)$  και  $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}'}(f)$  της  $f$  ως προς τα ζεύγη βάσεων  $\{\mathcal{B}, \mathcal{C}\}$  και  $\{\mathcal{B}, \mathcal{C}'\}$ .

(2) **Τμήμα Β'**: Για τις διάφορες τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$  να ληθεί το ακόλουθο γραμμικό σύστημα:

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} x + \lambda y - z = 2 \\ 2x - y + \lambda z = 5 \\ x + 10y - 6z = 1 \end{cases}$$

**Λύση.** (1) **Τμήμα Α'** Έχουμε:

$$\begin{aligned} f(1) &= t \cdot 1 = t = 0 \cdot 1 + 1 \cdot t + 0 \cdot t^2 + 0 \cdot t^3 \\ f(1+t) &= t \cdot (1+t) = t + t^2 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot t + 1 \cdot t^2 + 0 \cdot t^3 \\ f(1+t+t^2) &= t \cdot (1+t+t^2) = t + t^2 + t^3 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot t + 1 \cdot t^2 + 1 \cdot t^3 \end{aligned}$$

Άρα ο πίνακας της  $f$  ως προς το ζεύγος βάσεων  $\{\mathcal{B}, \mathcal{C}\}$  είναι

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned} f(1) &= t = (-1) \cdot 1 + 1 \cdot (1+t) + 0 \cdot (1+t+t^2) + 0 \cdot (1+t+t^2+t^3) \\ f(1+t) &= t + t^2 = (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (1+t) + 1 \cdot (1+t+t^2) + 0 \cdot (1+t+t^2+t^3) \\ f(1+t+t^2) &= t + t^2 + t^3 = (-1) \cdot 1 + 0 \cdot (1+t) + 0 \cdot (1+t+t^2) + 1 \cdot (1+t+t^2+t^3) \end{aligned}$$

Άρα ο πίνακας της  $f$  ως προς το ζεύγος βάσεων  $\{\mathcal{B}, \mathcal{C}'\}$  είναι

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}'}(f) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(2) **Τμήμα Β'** Ο πίνακας του συστήματος  $(\Sigma)$  είναι

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 1 & 10 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 2 & -1 & \lambda \\ 1 & 10 & -6 \end{vmatrix} \xrightarrow[\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_1]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \begin{vmatrix} 1 & \lambda & -1 \\ 0 & -1 - 2\lambda & \lambda + 2 \\ 0 & 10 - \lambda & -5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 - 2\lambda & \lambda + 2 \\ 10 - \lambda & -5 \end{vmatrix} \\ &= \lambda^2 + 2\lambda - 15 = (\lambda - 3)(\lambda + 5) \end{aligned}$$

(α) Για  $\lambda \neq 3$  και  $\lambda \neq -5$  έχουμε  $|A| \neq 0$  και άρα το  $(\Sigma)$  είναι σύστημα Cramer. Συνεπώς έχουμε μοναδική λύση:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 2 & \lambda & -1 \\ 5 & -1 & \lambda \\ 1 & 10 & -6 \end{vmatrix}}{(\lambda - 3)(\lambda + 5)} = \frac{(\lambda - 3)(\lambda + 13)}{(\lambda - 3)(\lambda + 5)} = \frac{\lambda + 13}{\lambda + 5}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & \lambda \\ 1 & 1 & -6 \end{vmatrix}}{(\lambda-3)(\lambda+5)} = \frac{(\lambda-3)}{(\lambda-3)(\lambda+5)} = \lambda+5$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \lambda & 2 \\ 2 & -1 & 5 \\ 1 & 10 & 1 \end{vmatrix}}{(\lambda-3)(\lambda+5)} = \frac{3(\lambda-3)}{(\lambda-3)(\lambda+5)} = \frac{3}{\lambda+5}$$

(β) Έστω  $\lambda = 3$ . Τότε έχουμε το σύστημα

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} x + 3y - z = 2 \\ 2x - y + 3z = 5 \\ x + 10y - 6z = 1 \end{cases}$$

όπου

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 10 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι  $r(A) = 2$  διότι υπάρχει μια οριζόνσια τάξης δύο διαφορετική του μηδενός:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

Στην συνέχεια εξετάζουμε τη βαθμίδα του επαυξημένου πίνακα  $(A|B)$ . Έχουμε:

$$(A|B) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_1]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 5 & 1 \\ 0 & 7 & -5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 + \Gamma_2} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -7 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \implies r(A|B) = 2$$

Επομένως το σύστημα  $(\Sigma)$  είναι συμβιβαστό αφού  $r(A) = r(A|B)$ .

Οι παραπάνω πράξεις επί των γραμμών του  $(A|B)$  δείχνουν ότι το  $(\Sigma)$  είναι ισοδύναμο με το σύστημα

$$A'X = B'$$

όπου:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B' = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Τότε έχουμε

$$\begin{cases} x + 3y - z = 2 \\ -7y + 5z = 1 \end{cases} \implies y = -\frac{1}{7} + \frac{5}{7}z \implies x = 2 + z - 3\left(-\frac{1}{7} + \frac{5}{7}z\right) = \frac{17}{7} - \frac{8}{7}z$$

Θέτουμε  $z = t \in \mathbb{R}$ . Τότε η γενική λύση του  $(\Sigma)$  είναι

$$\begin{cases} x = \frac{17}{7} - \frac{8}{7}t \\ y = -\frac{1}{7} + \frac{5}{7}t \\ z = t \in \mathbb{R} \end{cases}$$



Εναλλακτικά επιλέγοντας την ελάχιστη ορίζουσα

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

θα μπορούσαμε να λύσουμε το  $(\Sigma)$ , ως σύστημα Cramer με αγνώστους τα  $x$  και  $y$ , δίνοντας αυθαίρετες τιμές στο  $z$ .

(γ) Έστω  $\lambda = -5$ . Τότε έχουμε το σύστημα

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} x - 5y - z = 2 \\ 2x - y - 5z = 5 \\ x + 10y - 6z = 1 \end{cases}$$

όπου

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -5 & -1 \\ 2 & -1 & -5 \\ 1 & 10 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι  $\mathbf{r}(A) = 2$  διότι υπάρχει μια ορίζουσα τάξης δύο διαφορετική του μηδενός:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 10 \end{vmatrix} = 21 \neq 0$$

Όμως η βαθμίδα του επαυξημένου πίνακα είναι  $\mathbf{r}(A|B) = 3$  αφού

$$\begin{vmatrix} -5 & -1 & 2 \\ -1 & -5 & 5 \\ 10 & -6 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$

Επομένως  $\mathbf{r}(A) \neq \mathbf{r}(A|B)$  και άρα το σύστημα είναι αδύνατο.  $\square$

#### 40. Δοκιμασία 11 - 15/2/2012

**Δοκιμασία 11.** (1) **Τμήμα Α':** Έστω ότι ένας πίνακας  $C$  μπορεί να γραφεί ως  $C = (A|B)$ , όπου οι  $A$  και  $B$  είναι πίνακες με πλήθος γραμμών ίσο με το πλήθος γραμμών του  $C$ . Ναδειχθεί ότι  $\mathbf{r}(C) \leq \mathbf{r}(A) + \mathbf{r}(B)$ .

(2) **Τμήμα Β':** Θεωρούμε την γραμμική απεικόνιση:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_2[t], \quad f(x, y) = x + y + (x - y)t - xt^2$$

και έστω οι βάσεις του  $\mathbb{R}^2$

$$\mathcal{B}_1 = \{\vec{e}_1 = (1, 0), \vec{e}_2 = (0, 1)\} \quad \text{και} \quad \mathcal{B}'_1 = \{\vec{e}'_1 = (1, 2), \vec{e}'_2 = (2, 1)\}$$

και οι βάσεις του  $\mathbb{R}_2[t]$

$$\mathcal{B}_2 = \{\vec{e}_1 = 1, \vec{e}_2 = t, \vec{e}_3 = t^2\} \quad \text{και} \quad \mathcal{B}'_2 = \{\vec{e}'_1 = 1, \vec{e}'_2 = 1 + t, \vec{e}'_3 = 1 + t + t^2\}$$

(α) Να βρεθεί ο πίνακας  $A = M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}(f)$ .

(β) Να βρεθεί ο πίνακας  $B = M_{\mathcal{B}'_1}^{\mathcal{B}'_2}(f)$ .

(γ) Να βρεθούν αντιστρέψιμοι πίνακες  $Q$  και  $P$ , έτσι ώστε:  $Q^{-1}AP = B$ .

**Λύση.** (1) **Τμήμα Α'** Έστω  $A \in \mathbb{M}_{m \times n_1}(\mathbb{K})$  και  $B \in \mathbb{M}_{m \times n_2}(\mathbb{K})$  όπου  $\mathbb{K}$  ένα σώμα. Τότε ο πίνακας

$$C = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n_1} & a_{1n_2} & \cdots & a_{1n_2+1} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn_1} & a_{mn_2} & \cdots & a_{mn_2+1} \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{m \times (n_1+n_2)}(\mathbb{K})$$

όπου

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n_1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn_1} \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{m \times n_1}(\mathbb{K}) \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} a_{1n_2} & \cdots & a_{1n_2+1} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{mn_2} & \cdots & a_{mn_2+1} \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{m \times n_2}(\mathbb{K})$$

Έστω

$$\mathcal{V}_1 = \left\langle \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1n_1} \\ \vdots \\ a_{mn_1} \end{pmatrix} \right\rangle$$

ο υπόχωρος που παράγεται από τις στήλες του πίνακα  $A$  και

$$\mathcal{V}_2 = \left\langle \begin{pmatrix} a_{1n_2} \\ \vdots \\ a_{mn_2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_{1n_2+1} \\ \vdots \\ a_{mn_2+1} \end{pmatrix} \right\rangle$$

ο υπόχωρος που παράγεται από τις στήλες του πίνακα  $B$ . Επίσης, συμβολίζουμε με  $\mathcal{V}$  τον υπόχωρο που παράγεται από τις στήλες του πίνακα  $C$ . Τότε  $\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2$  και άρα έχουμε

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(C) = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{V} &= \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{V}_1 + \mathcal{V}_2) = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{V}_1 + \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{V}_2 - \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 \\ &= \mathbf{r}(A) + \mathbf{r}(B) - \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{V}_1 \cap \mathcal{V}_2 \end{aligned}$$

Επομένως έχουμε πράγματι ότι  $\mathbf{r}(C) \leq \mathbf{r}(A) + \mathbf{r}(B)$ .  $\square$

(2) **Τμήμα Β'** Έχουμε:

$$f(\vec{e}_1) = f(1, 0) = (1+0) + (1-0)t + (-1)t^2 = 1+t-t^2 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot t + (-1) \cdot t^2$$

$$f(\vec{e}_2) = f(0, 1) = (0+1) + (0-1)t + (-1)t^2 = 1-t-t^2 = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot t + 0 \cdot t^2$$

Άρα ο πίνακας της  $f$  ως προς το ζεύγος βάσεων  $\{\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2\}$  είναι

$$A = M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}_1}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Επίσης έχουμε:

$$f(\vec{e}'_1) = f(1, 2) = (1+2) + (1-2)t + (-1)t^2 = 3-t-t^2 = 4 \cdot 1 + 0 \cdot (1+t) + (-1) \cdot (1+t+t^2)$$

$$f(\vec{e}'_2) = f(2, 1) = (2+1) + (2-1)t + (-2)t^2 = 3+t-2t^2 = 2 \cdot 1 + 3 \cdot (1+t) - 2 \cdot (1+t+t^2)$$

Άρα ο πίνακας της  $f$  ως προς το ζεύγος βάσεων  $\{\mathcal{B}'_1, \mathcal{B}'_2\}$  είναι

$$B = M_{\mathcal{B}'_1}^{\mathcal{B}'_2}(f) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

Ο πίνακας  $P$  που ψάχνουμε είναι ο πίνακας μετάβασης από την βάση  $\mathcal{B}_1$  στην  $\mathcal{B}'_1$ . Άρα:

$$\begin{cases} \vec{e}'_1 = (1, 2) = 1\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 \\ \vec{e}'_2 = (2, 1) = 2\vec{e}_1 + 1\vec{e}_2 \end{cases} \implies P = M_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}'_1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Ο πίνακας  $Q$  είναι ο πίνακας μετάβασης από την βάση  $\mathcal{B}_2$  στην  $\mathcal{B}'_2$ . Επομένως έχουμε:

$$\begin{cases} \vec{e}'_1 = 1 = 1\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 \\ \vec{e}'_2 = 1 + t = 1\vec{e}_1 + 1\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 \\ \vec{e}'_3 = 1 + t + t^2 = 1\vec{e}_1 + 1\vec{e}_2 + 1\vec{e}_3 \end{cases} \implies Q = M_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{B}'_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Τότε ο πίνακας  $Q^{-1}$  είναι ο πίνακας μετάβασης από την βάση  $\mathcal{B}'_2$  στην  $\mathcal{B}_2$ , δηλαδή:

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = 1 = 1\vec{e}'_1 + 0\vec{e}'_2 + 0\vec{e}'_3 \\ \vec{e}_2 = t = -1\vec{e}'_1 + 1\vec{e}'_2 + 0\vec{e}'_3 \\ \vec{e}_3 = t^2 = 0\vec{e}'_1 - 1\vec{e}'_2 + 1\vec{e}'_3 \end{cases} \implies Q^{-1} = M_{\mathcal{B}'_2}^{\mathcal{B}_2} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Συνεπώς προσδιορίσαμε αντιστρέψιμους πίνακες  $P$  και  $Q$  έτσι ώστε:  $Q^{-1} \cdot A \cdot P = B$ .  $\square$

## Μέρος 6. Επίλυση Επιλεγμένων Ασκήσεων

### 41. Φυλλάδιο 1 - 22/11/2011

**Λυμένη Άσκηση 1.** Έστω  $n \in \mathbb{N}$  με  $n \geq 2$ . Ας είναι  $AT_n(\mathbb{K})$  (αντιστοίχως  $KT_n(\mathbb{K})$ ) το σύνολο των άνω (αντιστοίχως κάτω) τριγωνικών  $n \times n$  πινάκων με στοιχεία από το σώμα  $\mathbb{K}$ .

Ναδειχθεί ότι η τομή  $AT_n(\mathbb{K}) \cap KT_n(\mathbb{K})$  των δύο αυτών συνόλων ισούται με το σύνολο των διαγωνίων πινάκων.

**Λύση.** Συμβολίζουμε με  $\Delta_n(\mathbb{K})$  το σύνολο των διαγωνίων πινάκων. Ένα τυπικό στοιχείο του συνόλου αυτού είναι της μορφής:

$$\begin{pmatrix} k_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & k_n \end{pmatrix}$$

όπου  $k_i \in \mathbb{K}$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

Έστω ένας πίνακας  $A \in AT_n(\mathbb{K}) \cap KT_n(\mathbb{K})$ , δηλαδή  $A \in AT_n(\mathbb{K})$  και  $A \in KT_n(\mathbb{K})$ . Αφού ο πίνακας  $A$  είναι άνω και κάτω τριγωνικός έπεται ότι κάτω και πάνω από την κύρια διαγώνιο έχει μηδέν. Συνεπώς, ο πίνακας  $A \in \Delta_n(\mathbb{K})$  και άρα δείξαμε ότι  $AT_n(\mathbb{K}) \cap KT_n(\mathbb{K}) \subseteq \Delta_n(\mathbb{K})$ . Επίσης είναι φανερό ότι αν έχουμε έναν διαγώνιο πίνακα τότε αυτός είναι άνω και κάτω τριγωνικός, δηλαδή  $\Delta_n(\mathbb{K}) \subseteq AT_n(\mathbb{K}) \cap KT_n(\mathbb{K})$ . Επομένως  $AT_n(\mathbb{K}) \cap KT_n(\mathbb{K}) = \Delta_n(\mathbb{K})$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 2.** Για κάθε  $n \geq 1$ , να βρείτε την  $n$ -οστή δύναμη του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Λύση.** Για να καταλάβουμε τη περιγραφή του  $A^n$ , ξεκινάμε πρώτα κάνοντας τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς πινάκων:

$$\begin{aligned} A^2 &= AA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1+2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ A^3 &= A^2A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1+2+3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ A^4 &= A^2A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 10 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1+2+3+4 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Γνωρίζουμε ότι:

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς θα δείξουμε με Μαθηματική Επαγωγή ότι:

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad n \geq 1 \quad (*)$$

1. Για  $n = 1$ , και λαμβάνοντας υπ'όψιν ότι  $A^1 = A$  και τη μορφή του πίνακα  $A$ , η ζητούμενη σχέση (\*) προφανώς ισχύει.
2. Υπόθεση Επαγωγής: Έστω ότι ισχύει για  $n = k$ , δηλαδή δεχόμαστε ότι:

$$A^k = \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Θα δείξουμε ότι η ζητούμενη σχέση (\*) ισχύει για  $n = k + 1$ . Έχουμε

$$A^{k+1} = A^k A = \begin{pmatrix} 1 & k & \frac{k(k+1)}{2} \\ 0 & 1 & k \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 & \frac{(k+1)(k+2)}{2} \\ 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Επομένως, η  $n$ -οστή δύναμη του πίνακα  $A$  είναι ο πίνακας  $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ,  $\forall n \geq 1$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 3.** Έστω  $A$  και  $B$   $n \times n$  πίνακες τέτοιοι ώστε ο πίνακας  $I_n - (AB)^2$  να είναι αντιστρέψιμος. Δείξτε ότι ο πίνακας  $I_n - (BA)^2$  είναι αντιστρέψιμος και

$$(I_n - (BA)^2)^{-1} = I_n + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA$$

**Λύση.** Αρκεί να δείξουμε ότι

$$(I_n - (BA)^2) \cdot [I_n + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA] = I_n = [I_n + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA] \cdot (I_n - (BA)^2)$$

1. Θα έχουμε:

$$\begin{aligned} (I_n - (BA)^2) \cdot [I_n + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA] &= I_n + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA \\ &\quad - (BA)^2 - (BA)^2 B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA \\ &= I_n + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA \\ &\quad - (BA)^2 - BABAB(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA \\ &= I_n - (BA)^2 + \\ &\quad + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA - B(AB)^2(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA \\ &= I_n - (BA)^2 + \\ &\quad + B[(I_n - (AB)^2)^{-1} - (AB)^2(I_n - (AB)^2)^{-1}]ABA \\ &= I_n - (BA)^2 + B(I_n - (AB)^2)(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA \\ &= I_n - (BA)^2 + BI_nABA \\ &= I_n - (BA)^2 + (BA)^2 \\ &= I_n \end{aligned}$$

2. Θα έχουμε:

$$\begin{aligned}
[I_n + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA] \cdot (I_n - (BA)^2) &= I_n + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA \\
&\quad - (BA)^2 - B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA(BA)^2 \\
&= I_n - (BA)^2 + \\
&\quad + B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABA - B(I_n - (AB)^2)^{-1}ABABABA \\
&= I_n - (BA)^2 + \\
&\quad + B(I_n - (AB)^2)^{-1}[ABA - (AB)^2ABA] \\
&= I_n - (BA)^2 + \\
&\quad + B(I_n - (AB)^2)^{-1}(I_n - (AB)^2)ABA \\
&= I_n - (BA)^2 + BI_nABA \\
&= I_n - (BA)^2 + BABA \\
&= I_n - (BA)^2 + (BA)^2 \\
&= I_n
\end{aligned}$$

Από τα **1.** και **2.** έχουμε το ζητούμενο.  $\square$

**Παρατήρηση 1.** Έστω  $A, B$  δύο  $n \times n$  πίνακες με στοιχεία από το σώμα  $\mathbb{K}$ . Τότε όπως θα δούμε σύντομα με χρήση της θεωρίας οριζουσών, ισχύει ότι:

$$A \cdot B = I_n \implies B \cdot A = I_n$$

και άρα ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και  $A^{-1} = B$ . Επομένως στην Άσκηση 3 (και σε ανάλογες Ασκήσεις, βλέπε την Άσκηση 5 παρακάτω), αρκεί να δειχθεί μόνο η μία εκ των δύο απαιτούμενων ισοτήτων.

**Λυμένη Άσκηση 4.** Αν για τους  $n \times n$  πίνακες  $A$  ισχύει  $A^4 - A^3 + A^2 - A + I_n = 0$  τότε  $A^{-1} = -A^4$ .

**Λύση.** Από τη σχέση  $A^4 - A^3 + A^2 - A + I_n = 0$  έχουμε  $-A^4 + A^3 - A^2 + A = I_n$  και άρα

$$A(-A^3 + A^2 - A + I_n) = I_n \text{ και } (-A^3 + A^2 - A + I_n)A = I_n$$

Συνεπώς ο πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος και  $A^{-1} = -A^3 + A^2 - A + I_n = -A^4$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 5.** Θεωρούμε τους  $n \times n$  πίνακες  $A$  και  $B$  και υποθέτουμε ότι ο πίνακας  $B$  είναι αντιστρέψιμος και ισχύει:

$$A + B = AB \tag{\dagger}$$

Να δείξετε ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και ισχύει:  $A^{-1} + B^{-1} = I_n$ .

**Λύση.** Επειδή ο πίνακας  $B$  είναι αντιστρέψιμος, υπάρχει ο αντίστροφός του  $B^{-1}$ . Πολλαπλασιάζοντας τη σχέση  $(\dagger)$  από δεξιά με τον πίνακα  $B^{-1}$  θα έχουμε:

$$A + B = AB \implies (A + B)B^{-1} = ABB^{-1} \implies AB^{-1} + I_n = A \implies A - AB^{-1} = I_n \implies A(I_n - B^{-1}) = I_n$$

Σύμφωνα με την Παρατήρηση 1, ο πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος και  $A^{-1} = I_n - B^{-1}$ . Τέλος έχουμε ότι

$$A^{-1} + B^{-1} = I_n - B^{-1} + B^{-1} = I_n \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 6.** Να ευρεθούν όλοι οι πίνακες που μετατίθενται με τους πίνακες τής μορφής:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$(2) B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**Λύση.** Ας είναι  $C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ένας πίνακας με  $AC = CA$ , δηλαδή  $\begin{pmatrix} a & b \\ -a & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b & 0 \\ c-d & 0 \end{pmatrix}$ . Τότε  $b = 0$  και  $c = a + d$ .

Ας είναι  $C = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{pmatrix}$  ένας πίνακας με  $BC = CB$ , δηλαδή  $\begin{pmatrix} d & e & f \\ g & h & k \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & d & e \\ 0 & g & h \end{pmatrix}$ . Τότε  $d = 0, g = 0, h = 0, e = a, k = a, f = b$ .  $\square$

Ένας πίνακας  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  ονομάζεται **ταυτοδύναμος**, αν  $A^2 = A$ .

**Λυμένη Άσκηση 7.** Να προσδιοριστούν όλοι οι  $2 \times 2$  ταυτοδύναμοι πίνακες.

**Λύση.** Ας είναι  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ένας  $2 \times 2$  πίνακας με  $A^2 = A$ , δηλαδή

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \iff \begin{cases} a^2 + bc = a & (1) \\ ab + bd = b & (2) \\ ac + cd = c & (3) \\ bc + d^2 = d & (4) \end{cases}$$

Έστω ότι  $b \neq 0$ , τότε η (2) δίνει τη λύση  $d = 1 - a$ , η οποία ικανοποιεί και την (3). Από την (1) έχουμε  $c = \frac{a-a^2}{b}$ . Αυτές οι τιμές των  $c, d$  ικανοποιούν την (4).

Έστω ότι  $b = 0$ , τότε το παραπάνω σύστημα εξισώσεων γίνεται

$$\begin{cases} a^2 = a \\ ac + cd = c \\ d^2 = d \end{cases}$$

Παίρνοντας υπ' όψιν ότι  $a = 0$  ή  $1$  και  $d = 0$  ή  $1$  έχουμε τις λύσεις:  $(a = 0, b = 0, d = 1, c \in \mathbb{K})$ ,  $(a = 1, b = 0, d = 0, c \in \mathbb{K})$ ,  $(a = 0, b = 0, c = 0, d = 0)$ ,  $(a = 0, b = 0, c = 0, d = 1)$ ,  $(a = 1, b = 0, c = 0, d = 0)$ ,  $(a = 1, b = 0, c = 0, d = 1)$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 8.** Να προσδιοριστούν όλοι οι  $2 \times 2$  πίνακες που υψούμενοι στο τετράγωνο χορηγούν του μηδενικό  $2 \times 2$  πίνακα.

**Λύση.** Ας είναι  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  ένας  $2 \times 2$  πίνακας με  $A^2 = \mathbb{O}_2$ , δηλαδή

$$\begin{pmatrix} a^2 + bc & ab + bd \\ ac + cd & bc + d^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} a^2 + bc = 0 & (1) \\ ab + bd = 0 & (2) \\ ac + cd = 0 & (3) \\ bc + d^2 = 0 & (4) \end{cases}$$

Έστω ότι  $b \neq 0$ , τότε η (1) δίνει  $c = -\frac{a^2}{b}$ , η (2) δίνει  $d = -a$ . Οι (3) και (4) ικανοποιούνται από τις προηγούμενες λύσεις.

Έστω ότι  $b = 0$ , τότε επειδή έπεται  $a = 0$  και  $d = 0$ , έχουμε τη λύση  $a = 0, b = 0, c \in \mathbb{K}, d = 0$ .

#### 42. Φυλλάδιο 2 - 22/11/2011

**Λυμένη Άσκηση 9.** Να υπολογίσετε την ορίζουσα 
$$\begin{vmatrix} 1 + \alpha_1\beta_1 & 1 + \alpha_1\beta_2 & 1 + \alpha_1\beta_3 \\ 1 + \alpha_2\beta_1 & 1 + \alpha_2\beta_2 & 1 + \alpha_2\beta_3 \\ 1 + \alpha_3\beta_1 & 1 + \alpha_3\beta_2 & 1 + \alpha_3\beta_3 \end{vmatrix}.$$

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 1 + \alpha_1\beta_1 & 1 + \alpha_1\beta_2 & 1 + \alpha_1\beta_3 \\ 1 + \alpha_2\beta_1 & 1 + \alpha_2\beta_2 & 1 + \alpha_2\beta_3 \\ 1 + \alpha_3\beta_1 & 1 + \alpha_3\beta_2 & 1 + \alpha_3\beta_3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_1} \begin{vmatrix} 1 + \alpha_1\beta_1 & 1 + \alpha_1\beta_2 & 1 + \alpha_1\beta_3 \\ (\alpha_2 - \alpha_1)\beta_1 & (\alpha_2 - \alpha_1)\beta_2 & (\alpha_2 - \alpha_1)\beta_3 \\ (\alpha_3 - \alpha_1)\beta_1 & (\alpha_3 - \alpha_1)\beta_2 & (\alpha_3 - \alpha_1)\beta_3 \end{vmatrix} \\ & = (\alpha_2 - \alpha_1)(\alpha_3 - \alpha_1) \begin{vmatrix} 1 + \alpha_1\beta_1 & 1 + \alpha_1\beta_2 & 1 + \alpha_1\beta_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = 0 \quad \square \end{aligned}$$

**Λυμένη Άσκηση 10.** Να λυθεί η εξίσωση 
$$\begin{vmatrix} 2-x & 1 & i \\ 1 & 2-x & i \\ -i & -i & 2-x \end{vmatrix} = 0, \text{ όπου } i^2 = -1.$$

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 2-x & 1 & i \\ 1 & 2-x & i \\ -i & -i & 2-x \end{vmatrix} \xrightarrow{\Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1 - \Gamma_2} \begin{vmatrix} 1-x & -1+x & 0 \\ 1 & 2-x & i \\ -i & -i & 2-x \end{vmatrix} = (1-x) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2-x & i \\ -i & -i & 2-x \end{vmatrix} \\ & \xrightarrow{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 + \Sigma_1} (1-x) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3-x & i \\ -i & -2i & 2-x \end{vmatrix} = (1-x) \begin{vmatrix} 3-x & i \\ -2i & 2-x \end{vmatrix} = (1-x)(x^2 - 5x + 4) \end{aligned}$$

Άρα, έπεται ότι

$$(1-x)(x^2 - 5x + 4) = 0 \Rightarrow (1-x)(x-1)(x-4) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1, & \text{πολλαπλότητας 2.} \\ x = 4, & \text{απλή.} \end{cases} \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 11.** Να υπολογισθεί η  $n \times n$  ορίζουσα  $|A_n| =$

$$\begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha + \beta & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}$$



**Λύση.** Αν αναπτύξουμε την ορίζουσα  $|A_n|$  ως προς την πρώτη γραμμή, τότε έχουμε:

$$|A_n| = (\alpha + \beta) \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} - \alpha\beta \begin{vmatrix} 1 & \alpha\beta & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \alpha + \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix}$$

Να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω ορίζουσες είναι  $(n-1) \times (n-1)$ . Παρατηρούμε ότι η πρώτη ορίζουσα είναι η αρχική που ξεκινήσαμε αλληλά διάστασης  $(n-1) \times (n-1)$  και αν αναπτύξουμε την δεύτερη ορίζουσα ως προς την πρώτη στήλη, τότε καταλήγουμε

$$|A_n| = (\alpha + \beta)|A_{n-1}| - \alpha\beta|A_{n-2}| \quad (1)$$

Για να καταλάβουμε ποια είναι η τιμή της ορίζουσας  $|A_n|$ , ξεκινάμε πρώτα υπολογίζοντας τις παρακάτω ορίζουσες:

$$|A_1| = \alpha + \beta$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} \alpha + \beta & \alpha\beta & 0 \\ 1 & \alpha + \beta & \alpha\beta \\ 0 & 1 & \alpha + \beta \end{vmatrix} = \alpha^3 + \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \beta^3$$

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς θα δείξουμε με Μαθηματική Επαγωγή ότι:

$$|A_k| = \alpha^k + \alpha^{k-1}\beta + \alpha^{k-2}\beta^2 + \cdots + \alpha^2\beta^{k-2} + \alpha\beta^{k-1} + \beta^k, \quad k \geq 1. \quad (*)$$

1. Για  $k = 1$ , η ζητούμενη σχέση (\*) ισχύει αφού  $|A_1| = \alpha + \beta$ .
2. Υπόθεση Επαγωγής: Έστω ότι ισχύει για  $k \leq n$ , δηλαδή δεχόμαστε ότι:

$$|A_k| = \alpha^k + \alpha^{k-1}\beta + \alpha^{k-2}\beta^2 + \cdots + \alpha^2\beta^{k-2} + \alpha\beta^{k-1} + \beta^k$$

3. Θα δείξουμε ότι η ζητούμενη σχέση (\*) ισχύει για  $k = n + 1$ . Έχουμε

$$\begin{aligned} |A_{n+1}| &\stackrel{(1)}{=} (\alpha + \beta)|A_n| - \alpha\beta|A_{n-1}| = (\alpha + \beta)(\alpha^n + \alpha^{n-1}\beta + \cdots + \alpha\beta^{n-1} + \beta^n) \\ &\quad - \alpha\beta(\alpha^{n-1} + \alpha^{n-2}\beta + \cdots + \alpha\beta^{n-2} + \beta^{n-1}) \\ &= \alpha^{n+1} + \alpha^n\beta + \cdots + \alpha\beta^n + \beta^{n+1} \end{aligned}$$

Επομένως, έχουμε  $|A_n| = \alpha^n + \alpha^{n-1}\beta + \alpha^{n-2}\beta^2 + \cdots + \alpha^2\beta^{n-2} + \alpha\beta^{n-1} + \beta^n, \quad \forall n \geq 1. \quad \square$

**Λυμένη Άσκηση 12.** Να υπολογισθεί η  $2n \times 2n$  ορίζουσα  $|A_{2n}| = \begin{vmatrix} \alpha & 0 & \cdots & 0 & \beta \\ 0 & \alpha & \cdots & \beta & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \beta & \cdots & \alpha & 0 \\ \beta & 0 & \cdots & 0 & \alpha \end{vmatrix}.$

**Λύση.** Αν αναπτύξουμε την ορίζουσα  $|A_{2n}|$  ως προς την πρώτη στήλη, τότε έχουμε:

$$|A_{2n}| = \alpha \begin{vmatrix} \alpha & 0 & \cdots & \beta & 0 \\ 0 & \alpha & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \beta & 0 & \cdots & \alpha & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha \end{vmatrix} - \beta \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \beta \\ \alpha & 0 & \cdots & \beta & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \beta & \cdots & 0 & 0 \\ \beta & 0 & \cdots & \alpha & 0 \end{vmatrix}$$

Να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω ορίζουσες είναι  $(2n-1) \times (2n-1)$ . Αν αναπτύξουμε την πρώτη ορίζουσα ως προς τη τελευταία γραμμή και τη δεύτερη ορίζουσα ως προς τη πρώτη γραμμή, τότε καταλήγουμε

$$|A_{2n}| = \alpha^2 |A_{2n-2}| - \beta^2 |A_{2n-2}| = (\alpha^2 - \beta^2) |A_{2n-2}| \quad (1)$$

Για να καταλάβουμε ποια είναι η τιμή της ορίζουσας  $|A_{2n}|$ , ξεκινάμε πρώτα υπολογίζοντας τις παρακάτω ορίζουσες:

$$|A_2| = \begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \beta & \alpha \end{vmatrix} = \alpha^2 - \beta^2$$

$$|A_4| = \begin{vmatrix} \alpha & 0 & 0 & \beta \\ 0 & \alpha & \beta & 0 \\ 0 & \beta & \alpha & 0 \\ \beta & 0 & 0 & \alpha \end{vmatrix} = (\alpha^2 - \beta^2)^2$$

$$|A_6| = \begin{vmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 & 0 & \beta \\ 0 & \alpha & 0 & 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \alpha & \beta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \beta & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 & 0 & \alpha & 0 \\ \beta & 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha \end{vmatrix} = (\alpha^2 - \beta^2)^3$$

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς θα δείξουμε με Μαθηματική Επαγωγή ότι:

$$|A_{2k}| = (\alpha^2 - \beta^2)^k, \quad k \geq 1. \quad (*)$$

1. Για  $k = 1$ , η ζητούμενη σχέση (\*) ισχύει αφού  $|A_2| = \alpha^2 - \beta^2$ .
2. Υπόθεση Επαγωγής: Έστω ότι ισχύει για  $k < n$ , δηλαδή δεχόμαστε ότι:

$$|A_{2k}| = (\alpha^2 - \beta^2)^k$$

3. Θα δείξουμε ότι η ζητούμενη σχέση (\*) ισχύει για  $k = n$ . Έχουμε

$$|A_{2n}| \stackrel{(1)}{=} (\alpha^2 - \beta^2) |A_{2n-2}| = (\alpha^2 - \beta^2) (\alpha^2 - \beta^2)^{n-1} = (\alpha^2 - \beta^2)^n$$

Άρα, έχουμε  $|A_{2n}| = (\alpha^2 - \beta^2)^n, \forall n \geq 1. \quad \square$

**Λυμένη Άσκηση 13.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του ακόλουθου  $n \times n$  πίνακα  $A$ , όπου  $x \in \mathbb{R}$ :

$$|A_n| = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ x & 1+x^2 & x & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & 1+x^2 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1+x^2 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & 1+x^2 & x \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix}.$$

**Λύση.** Αν αναπτύξουμε την ορίζουσα  $|A_n|$  ως προς την πρώτη γραμμή, τότε έχουμε:

$$|A_n| = (1+x^2) \begin{vmatrix} x & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1+x^2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1+x^2 & x \\ 0 & 0 & \cdots & x & 1+x^2 \end{vmatrix} - x \begin{vmatrix} x & x & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1+x^2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1+x^2 & x \\ 0 & 0 & \cdots & x & 1+x^2 \end{vmatrix}$$

Να σημειώσουμε ότι οι παραπάνω ορίζουσες είναι  $(n-1) \times (n-1)$ . Παρατηρούμε ότι η πρώτη ορίζουσα είναι η αρχική που ξεκινήσαμε αλλιά διάστασης  $(n-1) \times (n-1)$  και αν αναπτύξουμε την δεύτερη ορίζουσα ως προς την πρώτη στήλη, τότε έχουμε

$$|A_n| = (1+x^2)|A_{n-1}| - x^2|A_{n-2}| \quad (1)$$

Για να καταλάβουμε ποια είναι η τιμή της ορίζουσας  $|A_n|$ , ξεκινάμε πρώτα υπολογίζοντας τις παρακάτω ορίζουσες:

$$|A_1| = 1+x^2$$

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x \\ x & 1+x^2 \end{vmatrix} = 1+x^2+x^4$$

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1+x^2 & x & 0 \\ x & 1+x^2 & x \\ 0 & x & 1+x^2 \end{vmatrix} = 1+x^2+x^4+x^6$$

Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς θα δείξουμε με Μαθηματική Επαγωγή ότι:

$$|A_k| = 1+x^2+x^4+\cdots+x^{2k}, \quad k \geq 1. \quad (*)$$

1. Για  $k=1$ , η ζητούμενη σχέση (\*) ισχύει αφού  $|A_1| = 1+x^2$ .
2. Υπόθεση Επαγωγής: Έστω ότι ισχύει για  $k \leq n$ , δηλαδή δεχόμαστε ότι:

$$|A_k| = 1+x^2+\cdots+x^{2k}$$

3. Θα δείξουμε ότι η ζητούμενη σχέση (\*) ισχύει για  $k=n+1$ . Έχουμε

$$\begin{aligned} |A_{n+1}| &\stackrel{(1)}{=} (1+x^2)|A_n| - x^2|A_{n-1}| = (1+x^2)(1+x^2+\cdots+x^{2n}) - x^2(1+x^2+\cdots+x^{2(n-1)}) \\ &= 1+x^2+\cdots+x^{2n+2} \end{aligned}$$

Επομένως, έχουμε  $|A_n| = 1+x^2+x^4+\cdots+x^{2n}$ ,  $\forall n \geq 1$ .  $\square$

## 43. Φυλλάδιο 3 - 6/12/2011

**Λυμένη Άσκηση 14.** Έστω ο πίνακας  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ . Ναδειχθεί ότι ο  $A$  είναι αντιστρέψιμος και στη

συνέχεια να υπολογισθεί ο  $A^{-1}$ :

- (1) με χρήση του συμπληρωματικού  $\text{adj}A$  του  $A$ ,
- (2) με τη μέθοδο στοιχειωδών μετασχηματισμών επί των γραμμών του πίνακα  $(A|I_3)$ .

**Λύση.** Καταρχήν, αφού

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

έπεται ότι ο πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος. Συνεπώς, υπάρχει πίνακας  $A^{-1}$  έτσι ώστε  $A^{-1}A = I_n = AA^{-1}$ , τον οποίο βρίσκουμε παρακάτω με δυο τρόπους.

- (1) Υπολογίζουμε όλες τις ελάσσονες ορίζουσες του πίνακα  $A$ :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{31} = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{12} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{22} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1$$

$$A_{13} = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -3, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{33} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 1$$

Άρα, έχουμε

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj} A = \frac{1}{|A|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

- (2) Έχουμε

$$\begin{aligned} & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_1]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_1} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 + 2\Gamma_2} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1 - 2\Gamma_2} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 2 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \frac{1}{2}\Gamma_3} \\ & \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & 3 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \xrightarrow[\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_3]{\Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1 + \Gamma_3} \left( \begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{array} \right) \end{aligned}$$

και άρα έπεται ότι  $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 15.** Αν ένας από τους πίνακες  $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  είναι αντιστρέψιμος, τότε ναδειχθεί ότι:

$$|A \cdot B + I_n| = |B \cdot A + I_n|$$

**Λύση.** Έστω ότι ο πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος. Τότε έχουμε

$$\begin{aligned} |AB + I_n| &= |AB + AA^{-1}| \\ &= |A(B + A^{-1})| \\ &= |A||B + A^{-1}| \\ &= |B + A^{-1}||A| \\ &= |(B + A^{-1})A| \\ &= |BA + A^{-1}A| \\ &= |BA + I_n| \end{aligned}$$

Όμοια δείχνουμε το ζητούμενο αν ο πίνακας  $B$  είναι αντιστρέψιμος.  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 16.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του ακόλουθου  $n \times n$  πίνακα πραγματικών αριθμών:

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1^2 & \cdots & \rho_1^{n-1} \\ 1 & \rho_2 & \rho_2^2 & \cdots & \rho_2^{n-1} \\ 1 & \rho_3 & \rho_3^2 & \cdots & \rho_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \rho_n & \rho_n^2 & \cdots & \rho_n^{n-1} \end{pmatrix} \quad (\text{Ορίζουσα Vandermonde } n \text{ τάξης})$$

**Λύση.** Για  $n = 2$  έχουμε την ορίζουσα

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ 1 & \rho_2 \end{vmatrix} = \rho_2 - \rho_1$$

Στην άσκηση 4 του Φυλλαδίου 2 είχαμε αποδείξει την ορίζουσα Vandermonde για  $n = 3$ , δηλαδή

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1^2 \\ 1 & \rho_2 & \rho_2^2 \\ 1 & \rho_3 & \rho_3^2 \end{vmatrix} = (\rho_2 - \rho_1)(\rho_3 - \rho_1)(\rho_3 - \rho_2)$$

Θα αποδείξουμε με Μαθηματική Επαγωγή ότι

$$|A_n| = \prod_{i>j}^{1,n} (\rho_i - \rho_j) \quad (*)$$

Υπόθεση Επαγωγής: Έστω ότι ισχύει για  $k = n - 1$ , δηλαδή δεχόμαστε ότι:

$$|A_{n-1}| = \prod_{i>j}^{1,n-1} (\rho_i - \rho_j)$$

Θα δείξουμε ότι η ζητούμενη σχέση (\*) ισχύει για  $k = n$ . Έχουμε

$$|A_n| = \begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1^2 & \cdots & \rho_1^{n-1} \\ 1 & \rho_2 & \rho_2^2 & \cdots & \rho_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \rho_n & \rho_n^2 & \cdots & \rho_n^{n-1} \end{vmatrix} \xrightarrow{\Sigma_n \rightarrow \Sigma_n - \rho_1 \Sigma_{n-1}} \begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_1^2 & \cdots & 0 \\ 1 & \rho_2 & \rho_2^2 & \cdots & \rho_2^{n-2}(\rho_2 - \rho_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \rho_n & \rho_n^2 & \cdots & \rho_n^{n-2}(\rho_n - \rho_1) \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned}
&= \dots \frac{\Sigma_3 \rightarrow \Sigma_3 - \rho_1 \Sigma_2}{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 - \rho_1 \Sigma_1} \begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \rho_2 & \rho_2(\rho_2 - \rho_1) & \dots & \rho_2^{n-2}(\rho_2 - \rho_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \rho_n & \rho_n(\rho_n - \rho_1) & \dots & \rho_n^{n-2}(\rho_n - \rho_1) \end{vmatrix} \\
&\frac{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 - \rho_1 \Sigma_1}{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 - \rho_1 \Sigma_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & \rho_2 - \rho_1 & \rho_2(\rho_2 - \rho_1) & \dots & \rho_2^{n-2}(\rho_2 - \rho_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \rho_n - \rho_1 & \rho_n(\rho_n - \rho_1) & \dots & \rho_n^{n-2}(\rho_n - \rho_1) \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} \rho_2 - \rho_1 & \rho_2(\rho_2 - \rho_1) & \dots & \rho_2^{n-2}(\rho_2 - \rho_1) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_n - \rho_1 & \rho_n(\rho_n - \rho_1) & \dots & \rho_n^{n-2}(\rho_n - \rho_1) \end{vmatrix} = (\rho_2 - \rho_1) \dots (\rho_n - \rho_1) \begin{vmatrix} 1 & \rho_2 & \rho_2^2 & \dots & \rho_2^{n-2} \\ 1 & \rho_3 & \rho_3^2 & \dots & \rho_3^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \rho_n & \rho_n^2 & \dots & \rho_n^{n-2} \end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$\frac{\text{ΥΠΟΘΕΣΗ}}{\text{ΕΠΑΓΩΓΗΣ}} (\rho_2 - \rho_1) \dots (\rho_n - \rho_1) \prod_{i>j}^{2,n-1} (\rho_i - \rho_j) = \prod_{i>j}^{1,n} (\rho_i - \rho_j)$$

Επομένως, έχουμε  $|A_n| = \prod_{i>j}^{1,n} (\rho_i - \rho_j)$ ,  $\forall n \geq 1$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 17.** Να υπολογισθεί η ορίζουσα του πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ a & 1 & 2 & 3 & \dots & n-3 & n-2 & n-1 \\ a & a & 1 & 2 & \dots & n-4 & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & a & \dots & 1 & 2 & 3 \\ a & a & a & a & \dots & a & 1 & 2 \\ a & a & a & a & \dots & a & a & 1 \end{pmatrix}$$

**Λύση.** Έχουμε

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \dots & n-2 & n-1 & n \\ a & 1 & 2 & 3 & \dots & n-3 & n-2 & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & a & \dots & a & 1 & 2 \\ a & a & a & a & \dots & a & a & a \end{vmatrix} \xrightarrow{\Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1 - \Gamma_2} \begin{vmatrix} 1-a & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 \\ a & 1 & 2 & 3 & \dots & n-3 & n-2 & n-1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & a & \dots & a & 1 & 2 \\ a & a & a & a & \dots & a & a & a \end{vmatrix}$$

$$\underline{\underline{\underline{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_3}}} \left| \begin{array}{cccccccc} 1-a & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-a & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & a & a & a & \cdots & a & 1 & 2 \\ a & a & a & a & \cdots & a & a & a \end{array} \right| = \cdots$$

$$\underline{\underline{\underline{\Gamma_{n-1} \rightarrow \Gamma_{n-1} - \Gamma_n}}} \left| \begin{array}{cccccccc} 1-a & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1-a & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-a & 1 \\ a & a & a & a & \cdots & a & a & 1 \end{array} \right|$$

$$\underline{\underline{\underline{\Sigma_n \rightarrow \Sigma_n - \Sigma_{n-1}}} \left| \begin{array}{cccccccc} 1-a & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1-a & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-a & a \\ a & a & a & a & \cdots & a & a & 1-a \end{array} \right|$$

$$\underline{\underline{\underline{\Sigma_{n-1} \rightarrow \Sigma_{n-1} - \Sigma_{n-2}}} \left| \begin{array}{cccccccc} 1-a & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-a & a \\ a & a & a & a & \cdots & a & 0 & 1-a \end{array} \right| = \cdots$$

$$\underline{\underline{\underline{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 - \Sigma_1}}} \left| \begin{array}{cccccccc} 1-a & a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-a & a & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-a & a \\ a & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1-a \end{array} \right|$$

$$= (1-a) \left| \begin{array}{cccccccc} 1-a & a & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-a & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1-a & a \end{array} \right| + (-1)^{n+1} a \left| \begin{array}{cccccccc} a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1-a & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1-a & a & a \end{array} \right|$$

$$= (1-a)(1-a)^{n-1} + (-1)^{n+1} a a^{n-1} = (1-a)^n + (-1)^{n+1} a^n. \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 18.** Να δείξετε ότι για τον  $n \times n$  πίνακα:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-2 \\ 2 & 1 & 0 & \cdots & n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

ισχύει:

$$|A| = (-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$$

**Λύση.** Έχουμε

$$|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\Gamma_n \rightarrow \Gamma_n - \Gamma_{n-1}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-2 & n-3 & n-4 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\Gamma_{n-1} \rightarrow \Gamma_{n-1} - \Gamma_{n-2}} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix} = \cdots \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_1} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\begin{matrix} \Sigma_1 \rightarrow \Sigma_1 + \Sigma_n \\ \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 + \Sigma_n \\ \vdots \\ \Sigma_{n-1} \rightarrow \Sigma_{n-1} + \Sigma_n \end{matrix}} \begin{vmatrix} n-1 & n & n+1 & \cdots & 2n-3 & n-1 \\ 0 & -2 & -2 & \cdots & -2 & -1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}2^{n-2}(n-1) \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 19.** Θεωρούμε τον  $n \times n$  πίνακα  $A$  ο οποίος είναι της μορφής:

$$A = \begin{pmatrix} B & C \\ \mathbb{O} & D \end{pmatrix}$$

όπου:  $B \in M_{r \times r}(\mathbb{K})$ ,  $C \in M_{r \times (n-r)}(\mathbb{K})$ ,  $\mathbb{O} \in M_{(n-r) \times r}(\mathbb{K})$ , και  $D \in M_{(n-r) \times (n-r)}(\mathbb{K})$ .

Να δείξετε ότι:

$$|A| = |B| \cdot |D|$$

**Λύση.** • Η βασική ιδέα της Απόδειξης είναι η ακόλουθη:

Γενικά εκτελώντας σε έναν πίνακα  $\Omega$ , ορισμένες εναλλαγές γραμμών ή/και προσθέτοντας πολλαπλασία γραμμών σε άλλες μπορούμε να σχηματίσουμε έναν άνω τριγωνικό πίνακα  $\Omega'$  με  $\det \Omega =$



$(-1)^\epsilon \det \Omega'$ , όπου το  $\epsilon = 1$ , όταν το πλήθος από τις εναλλαγές των γραμμών είναι άρτιο και  $\epsilon = -1$ , όταν το πλήθος από τις εναλλαγές είναι περιττό.

Αυτό γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως κατά τη μετατροπή ενός πίνακα σε γ-κλιμακωτή μορφή, χωρίς όμως την απαίτηση το πρώτο στοιχείο κάθε μη μηδενικής γραμμής να ισούται με 1. Έτσι δεν χρειάζεται να πολλαπλασιάσουμε κάποια γραμμή με ένα μη μηδενικό στοιχείο, αφού τότε θα δεν θα ήταν εύκολο να παρακολουθούμε τις αλλαγές στην τιμή της ορίζουσας. Σε σχέση με την παρατήρηση αυτή σκεφτείτε ότι ένας γ-κλιμακωτός  $n \times n$  πίνακας είναι ένας ειδικού τύπου άνω τριγωνικός πίνακας και αντίστροφα ένας άνω τριγωνικός πίνακας μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε έναν γ-κλιμακωτό.

Ας προχωρήσουμε τώρα στην απόδειξη της συγκεκριμένης άσκησης.

Επί των πρώτων  $r$  γραμμών του πίνακα  $A$  εκτελούμε εναλλαγές γραμμών ή/και προσθέτουμε πολλαπλασία γραμμών σε άλλες, κατά τέτοιον τρόπο ώστε στη θέση του  $B$  να προκύψει ένας άνω τριγωνικός πίνακας  $B'$ . Έτσι από τον  $A$  έχει προκύψει ο

$$A' = \begin{pmatrix} B' & C' \\ \mathbb{O} & D \end{pmatrix}.$$

Λόγω των εναλλαγών στις  $r$  γραμμές του  $A$  έχουμε:  $\det A' = (-1)^{\epsilon_1} \det A$  καθώς επίσης και  $\det B' = (-1)^{\epsilon_1} \det B$ ,  $\epsilon_1 = \pm 1$ .

Επί των τελευταίων  $n - r$  γραμμών του πίνακα  $A'$  εκτελούμε εναλλαγές γραμμών ή/και προσθέτουμε πολλαπλασία γραμμών σε άλλες, κατά τέτοιον τρόπο ώστε στη θέση του  $D$  να προκύψει ένας άνω τριγωνικός πίνακας  $D'$ . Έτσι από τον  $A'$  έχει προκύψει ο

$$A'' = \begin{pmatrix} B' & C' \\ \mathbb{O} & D' \end{pmatrix}.$$

Λόγω των εναλλαγών στις  $n - r$  γραμμές του  $A'$  έχουμε:  $\det A'' = (-1)^{\epsilon_2} \det A'$  καθώς επίσης και  $\det D' = (-1)^{\epsilon_2} \det D$ ,  $\epsilon_2 = \pm 1$ .

Έχουμε  $\det A = (-1)^{\epsilon_1} (-1)^{\epsilon_2} \det A''$ ,  $\det B = (-1)^{\epsilon_1} \det B'$ ,  $\det D = (-1)^{\epsilon_2} \det D'$ .

Αλλά ο  $A''$  είναι άνω τριγωνικός, αφού οι  $B'$  και  $D'$  είναι άνω τριγωνικοί. Επομένως,  $\det A'' = \det B' \det C'$  (ως γινόμενο των στοιχείων της κύριας διαγωνίου). Συνεπώς,

$$\det A = (-1)^{\epsilon_1} (-1)^{\epsilon_2} \det A'' = (-1)^{\epsilon_1} (-1)^{\epsilon_2} \det B' \det C' = \det B \det C. \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 20.** Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός των μηδενικών συνιστωσών που μπορεί να έχει ένας  $4 \times 4$  πίνακας, χωρίς όμως η ορίζουσά του να είναι ίση με μηδέν;

**Λύση.** Ο ελάχιστος αριθμός των μη μηδενικών συνιστωσών του, ώστε η ορίζουσα να μην ισούται με μηδέν, είναι τέσσερα και υλοποιείται από έναν διαγώνιο πίνακα όπου και τα τέσσερα στοιχεία της κύριας διαγωνίου είναι  $\neq 0$ . Μόνο τρία μη μηδενικά στοιχεία αναγκάζουν μία από τις τέσσερις γραμμές του πίνακα να αποτελείται πάντοτε μόνο από μηδενικά με συνέπεια η ορίζουσα να είναι ίση με μηδέν.

Συνεπώς ο μέγιστος αριθμός των μηδενικών συνιστωσών του είναι  $16 - 4 = 12$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 21.** Πόσες διαφορετικές τιμές μπορεί να έχει η ορίζουσα ενός πίνακα της μορφής

$$A = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix} \in M_{5 \times 5}(\mathbb{K}),$$

όπου τα «\*» παίρνουν τις τιμές τους από το  $\mathbb{K}$ ;

**Λύση.** Θεωρούμε το πέμπτο στοιχείο της τέταρτης γραμμής.

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν το πέμπτο στοιχείο της τέταρτης γραμμής είναι μηδέν, τότε ο πίνακας έχει την μορφή

$$A = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}.$$

Αναπτύσσοντας την ορίζουσα κατά τα στοιχεία της πρώτης γραμμής βλέπουμε ότι οφείλουμε να υπολογίσουμε δύο ορίζουσες  $4 \times 4$  πινάκων που και οι δύο τους έχουν τη μορφή

$$\begin{pmatrix} * & 0 & 0 & 0 \\ * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & 0 \\ * & * & * & * \end{pmatrix}.$$

Οι τελευταίοι πίνακες είναι κάτω τριγωνικοί με μηδενικό στοιχείο στην κύρια διαγώνιό τους και συνεπώς η ορίζουσά τους ισούται με μηδέν. Έτσι,  $\det(A) = 0$ .

ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Αν το πέμπτο στοιχείο της τέταρτης γραμμής δεν είναι μηδέν, τότε αφαιρώντας ένα κατάλληλο πολλαπλάσιο της τέταρτης γραμμής από την πέμπτη, μπορούμε να μηδενίσουμε το πέμπτο στοιχείο της πέμπτης γραμμής.

Έτσι προκύπτει ο πίνακας

$$B = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & * \\ * & * & * & * & 0 \end{pmatrix}$$

με  $\det(B) = \det(A)$ .

Στον  $B$  εναλλάσσουμε την πέμπτη με την τέταρτη γραμμή. Έτσι προκύπτει ένας πίνακας της μορφής

$$C = \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 & 0 \\ * & * & * & * & 0 \\ * & * & * & * & * \end{pmatrix}.$$

Η  $\det(C) = 0$ , αφού η μορφή του  $C$  είναι ίδια με τη μορφή του  $A$  της Πρώτης Περίπτωσης. Επιπλέον  $\det(C) = -\det(B)$ . Άρα  $0 = \det(B) = \det(A)$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 22.** Ας είναι  $A = (a_{ij})$  ένας  $n \times n$  πίνακας και  $A_{ij}$  το αλγεβρικό συμπλήρωμα του στοιχείου  $a_{ij}$ . Να δείχθει ότι, αν  $i \neq r$ , τότε

$$a_{i1}A_{r1} + a_{i2}A_{r2} + \cdots + a_{in}A_{rn} = 0$$

και, αν  $j \neq s$ , τότε

$$a_{1j}A_{1s} + a_{2j}A_{2s} + \cdots + a_{nj}A_{ns} = 0.$$

**Λύση.** Ας ονομάσουμε  $A'$  τον πίνακα που προκύπτει από τον  $A$  αντικαθιστώντας την  $r$ -οστή γραμμή του  $A$  από την  $i$ -οστή ( $i \neq r$ ) γραμμή του. Η  $\det A'$  ισούται με 0, αφού ο  $A'$  έχει δύο ίσες γραμμές (την  $i$ -οστή και την

$r$ -οστή). Αναπτύσσοντας την  $\det A'$  κατά τα στοιχεία της  $r$ -οστής γραμμής, τα οποία είναι τα  $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$  παίρνουμε:

$$a_{i1}A_{r1} + a_{i2}A_{r2} + \dots + a_{in}A_{rn} = \det A' = 0.$$

η απόδειξη του άθλιου τύπου είναι ανάλογη και εκτελείται με αντικαθιστώντας την  $s$ -οστή στήλη του  $A$  με την  $j$ -οστή.  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 23.** Ναδειχθεί ότι η  $\det A_n$ , όπου  $A_n$  είναι ο  $n \times n$  Fibonacci πίνακας:

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

ισούται με τον  $n$ -οστό όρο  $a_n$  της ακολουθίας Fibonacci

$$1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots = \{a_n\}_{n=1}^{\infty},$$

ο οποίος ορίζεται μέσω του αναγωγικού τύπου:  $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ,  $\forall n \geq 3$ .

**Λύση.** Ο  $1 \times 1$  πίνακας Fibonacci είναι ο  $(1)$  και η ορίζουσά του είναι η  $d_1 = 1$ .

Ο  $2 \times 2$  πίνακας Fibonacci είναι ο  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$  και η ορίζουσά του είναι η  $d_2 = 1 + 1 = 2$ .

Ας είναι  $d_n$  η ορίζουσα του  $n \times n$  πίνακα Fibonacci. Θα δείξουμε ότι για  $n \geq 3$ , είναι  $d_n = d_{n-1} + d_{n-2}$ .

Ο  $3 \times 3$  πίνακας Fibonacci είναι ο  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$  και η ορίζουσά του (αναπτύσσοντας ως προς τα στοιχεία της πρώτης στήλης) είναι η:

$$d_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - (-1) = 3 = d_1 + d_2.$$

Θεωρούμε τώρα τον  $n \times n$  Fibonacci πίνακα  $A$  και υπολογίζουμε την ορίζουσά του αναπτύσσοντας κατά τα στοιχεία της **πρώτης στήλης**: Προφανώς,  $\det A = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21}$ , αφού τα υπόλοιπα στοιχεία της πρώτης στήλης είναι ίσα με μηδέν. Το  $a_{11} = 1$  και το συμπλήρωμά του  $A_{11}$  ισούται με  $(-1)^{1+1}d_{n-1}$  (διαγράφοντας την πρώτη γραμμή και την πρώτη στήλη του  $A$  προκύπτει και πάλι πίνακας Fibonacci με μέγεθος  $(n-1) \times (n-1)$ ). Το  $a_{21} = -1$  και το συμπλήρωμά του  $A_{21}$  ισούται με  $(-1)^{2+1}D$ , όπου  $D$  είναι η ορίζουσα του  $(n-1) \times (n-1)$  πίνακα  $A'$  που προκύπτει διαγράφοντας την πρώτη στήλη και δεύτερη γραμμή του  $A$ , δηλαδή του πίνακα

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & -1 & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Αλλά υπολογίζοντας την ορίζουσα  $D$  του  $A'$  αναπτύσσοντας τώρα κατά τα στοιχεία της **πρώτης γραμμής** βλέπουμε ότι αυτή η  $D$  συμπίπτει με την ορίζουσα του  $(n-2) \times (n-2)$  Fibonacci πίνακα, δηλαδή με την ορίζουσα  $d_{n-2}$ . Έτσι τελικά έχουμε:

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} = (-1)^{1+1}d_{n-1} + (-1)(-1)^{2+1}d_{n-2} = d_{n-1} + d_{n-2}.$$

Άρα:

$$|A_n| = a_n, \quad \forall n \geq 1 \quad \square$$

#### 44. Φυλλάδιο 4 - 21/12/2011

**Λυμένη Άσκηση 24.** Θεωρούμε τον διανυσματικό χώρο  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  πάνω από το  $\mathbb{R}$  και τα παρακάτω υποσύνολά του:

$$\mathcal{V} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & b \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

και

$$\mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ d & c+d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

- (1) Να δείξετε ότι οι  $\mathcal{V}$  και  $\mathcal{W}$  είναι υπόχωροι του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .
- (2) Να βρεθεί η μορφή των στοιχείων του υποχώρου  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ .

**Λύση.** (1) Έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & b \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ a \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, b \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

δηλαδή ο  $\mathcal{V}$  παράγεται από τους πίνακες

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Παρόμοια:

$$\begin{aligned} \mathcal{W} &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ d & c+d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid c, d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} 0 & c \\ 0 & c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ d & d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid c, d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ c \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid c, d \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

δηλαδή ο  $\mathcal{W}$  παράγεται από τους πίνακες

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Συνεπώς οι  $\mathcal{V}$  και  $\mathcal{W}$  είναι υπόχωροι του  $\mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

(2) Έστω  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathcal{V} \cap \mathcal{W}$ , δηλαδή  $A \in \mathcal{V}$  και  $A \in \mathcal{W}$ . Τότε έχουμε

$$\begin{cases} A \in \mathcal{V} \Rightarrow a = 0 \text{ και } b = c \\ A \in \mathcal{W} \Rightarrow a = 0 \text{ και } d = c + b \Rightarrow d = 2b \end{cases}$$

και άρα  $A = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 2b \end{pmatrix}$ . Επομένως η περιγραφή του υποχώρου  $\mathcal{V} \cap \mathcal{W}$  είναι η ακόλουθη:

$$\mathcal{V} \cap \mathcal{W} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b \\ b & 2b \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid b \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid b \in \mathbb{R} \right\} = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \right\rangle \quad \square$$

**Παρατήρηση 2.** Η Άσκηση 1. Θα μπορούσε να ληφθεί και με χρήση του Ορισμού. Η παραπάνω λύση δείχνει επιπρόσθετα ότι τα σύνολα  $\mathcal{V}$  και  $\mathcal{W}$  είναι υπόχωροι οι οποίοι παράγονται από συγκεκριμένα διανύσματα.

**Λυμένη Άσκηση 25.** Στο σύνολο των θετικών πραγματικών αριθμών  $\mathbb{R}^+ = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$  ορίζουμε τις πράξεις:

$$\oplus : \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, (x, y) \mapsto x \oplus y = xy$$

και

$$\odot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, (r, x) \mapsto r \odot x = x^r$$

(1) Να δείξετε ότι η τριάδα  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$  αποτελεί διανυσματικό χώρο υπεράνω του  $\mathbb{R}$ .

(2) Να βρεθούν όλοι οι υπόχωροι του διανυσματικού χώρου  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$ .

**Λύση.** (1) Έστω  $x, y, z \in \mathbb{R}^+$  και  $r, s \in \mathbb{R}$ . Τότε:

$$(α) (x \oplus y) \oplus z = (xy) \oplus z = (xy)z = x(yz) = x(y \oplus z) = x \oplus (y \oplus z).$$

$$(β) x \oplus y = xy = yx = y \oplus x.$$

(γ) Θέλουμε να εξετάσουμε αν υπάρχει ένα στοιχείο  $\mathbf{o} \in \mathbb{R}^+$  έτσι ώστε  $x \oplus \mathbf{o} = x = \mathbf{o} \oplus x$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}^+$ . Άρα

$$x \oplus \mathbf{o} = x \iff x\mathbf{o} = x \iff \mathbf{o} = 1$$

διότι το  $x \neq 0$ . Συνεπώς, το μηδενικό διάνυσμα είναι το στοιχείο  $\mathbf{o} = 1$ .

(δ) Θεωρούμε στοιχείο  $x \in \mathbb{R}^+$ . Θέλουμε να εξετάσουμε αν υπάρχει ένα στοιχείο  $y \in \mathbb{R}^+$  έτσι ώστε:  $x \oplus y = \mathbf{o} = y \oplus x$ . Επειδή από το προηγούμενο αξίωμα,  $\mathbf{o} = 1$ , θα έχουμε:  $x \oplus y = 1 \iff xy = 1$  και αφού  $x \in \mathbb{R}^+$  έπεται ότι  $y = \frac{1}{x} \in \mathbb{R}^+$ . Πράγματι, έχουμε

$$x \oplus \frac{1}{x} = x \frac{1}{x} = 1 = \frac{1}{x} x = \frac{1}{x} \oplus x$$

για κάθε  $x \in \mathbb{R}^+$ . Άρα, το αντίθετο του διανύσματος  $x \in \mathbb{R}^+$  ως προς την πρόσθεση  $\oplus$  είναι το διάνυσμα  $\frac{1}{x} \in \mathbb{R}^+$ .

$$(ε) r \odot (x \oplus y) = r \odot (xy) = (xy)^r = x^r y^r = x^r \oplus y^r = (r \odot x) \oplus (r \odot y).$$

$$(ς) (r + s) \odot x = x^{r+s} = x^r x^s = x^r \oplus x^s = (r \odot x) \oplus (s \odot x).$$

$$(\zeta) r \odot (s \odot x) = r \odot (x^s) = (x^s)^r = x^{sr} = (sr) \odot x.$$

$$(\eta) 1 \odot x = x^1 = x.$$

Επομένως, η τριάδα  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$  αποτελεί διανυσματικό χώρο υπεράνω του  $\mathbb{R}$ .

(2) Γνωρίζουμε ότι το σύνολο  $\{1\}$  και όλος ο χώρος  $\mathbb{R}^+$  είναι υπόχωροι του  $\mathbb{R}^+$ . Έστω  $\mathcal{V} \subseteq \mathbb{R}^+$  ένας υπόχωρος του  $\mathbb{R}^+$  έτσι ώστε  $\mathcal{V} \neq \{1\}$ , δηλαδή ο  $\mathcal{V}$  δεν είναι ο μηδενικός υπόχωρος του  $\mathbb{R}^+$ . Άρα υπάρχει ένα  $x \in \mathcal{V}$  με  $x \neq 1$ . Έστω  $k \in \mathbb{R}^+$ . Τότε έχουμε

$$k = x^{\log_x k} = \log_x k \odot x \in \mathcal{V}$$

αφού  $\log_x k \in \mathbb{R}$  και  $x \in \mathcal{V}$ . Συνεπώς έχουμε ότι  $\mathbb{R}^+ \subseteq \mathcal{V}$  και άρα  $\mathcal{V} = \mathbb{R}^+$ . Επομένως οι μόνοι υπόχωροι του διανυσματικού χώρου  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$  είναι το  $\{1\}$  και όλος ο χώρος  $\mathbb{R}^+$ .  $\square$

**Παρατήρηση 3.** Οι διανυσματικοί χώροι  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$  και  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  έχουν την ιδιότητα ότι οι μόνοι υπόχωροι τους είναι ο μηδενικός υπόχωρος και ο εαυτός τους. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όπως θα δείξουμε αργότερα, οι  $\mathbb{R}$ -διανυσματικοί χώροι  $(\mathbb{R}^+, \oplus, \odot)$  και  $(\mathbb{R}, +, \cdot)$  είναι “ισόμορφοι” (αυτό έχει σαν συνέπεια ότι έχουν τις ίδιες δομικές ιδιότητες, και μια τέτοια δομική ιδιότητα είναι παράδειγμα η δομή των υποχώρων τους). Δηλαδή υπάρχει μια 1-1 και επί απεικόνιση  $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ , η οποία “διατηρεί τις πράξεις”, με την έννοια ότι:

$$f(x \oplus y) = f(x) + f(y), \quad \text{και} \quad f(r \odot x) = r \cdot f(x), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^+, \quad \forall r \in \mathbb{R}$$

Μπορείτε να βρείτε μια τέτοια απεικόνιση;

**Λυμένη Άσκηση 26.** Να λύσετε το σύστημα:

$$(\Sigma) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_5 = 0 \\ -x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = \lambda \\ -4x_1 + 4x_2 - 4x_3 - x_4 + x_5 = -\lambda \end{cases}$$

**Λύση.** Έχουμε

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & \lambda \\ -4 & 4 & -4 & -1 & 1 & -\lambda \end{array} \right) \xrightarrow[\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_1]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 + \Gamma_1} \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \lambda \\ -4 & 4 & -4 & -1 & 1 & -\lambda \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 + 4\Gamma_1}$$

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -3 & -\lambda \end{array} \right) \xrightarrow[\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 + \Gamma_2]{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_2} \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & -\lambda \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 + 2\Gamma_3}$$

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \frac{1}{2}\Gamma_3} \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{\lambda}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda \end{array} \right)$$

και άρα καταλήγουμε στο παρακάτω σύστημα:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 & - x_5 = 0 \\ & x_4 - x_5 = 0 \\ & x_5 = \frac{\lambda}{2} \\ & 0 = \lambda \end{cases}$$

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

(1) Αν  $\lambda \neq 0$  τότε έπεται ότι το σύστημα  $(\Sigma)$  είναι αδύνατο.

(2) Αν  $\lambda = 0$  τότε έχουμε  $x_5 = 0$  και άρα  $x_4 = 0$ . Ακόμα, από την πρώτη εξίσωση έχουμε  $x_1 = x_2 - x_3$ .

Θέτουμε  $x_2 = \kappa$  και  $x_3 = \nu$  με  $\kappa, \nu \in \mathbb{R}$ . Τότε έχουμε τη γενική λύση:

$$\begin{cases} x_1 = \kappa - \nu \\ x_2 = \kappa \\ x_3 = \nu \\ x_4 = 0 \\ x_5 = 0 \end{cases} \quad \kappa, \nu \in \mathbb{R}. \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 27.** Να λύσετε το σύστημα:

$$(\Sigma) \begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 = 1 - 2\lambda \\ x_2 + x_3 & = -2\lambda \\ & x_4 - x_5 = 1 - \lambda \\ x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 2 - 2\lambda \end{cases}$$

**Λύση.** Έχουμε

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & -2 & 1 - 2\lambda \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -2\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 - \lambda \\ 0 & 1 & 1 & 1 & -1 & 2 - 2\lambda \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - \Gamma_2} \left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & -2 & 1 - 2\lambda \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -2\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 - \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - \Gamma_3}$$

$$\left( \begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & 1 & -2 & 1 - 2\lambda \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -2\lambda \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 - \lambda \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 + \lambda \end{array} \right)$$

και άρα καταλήγουμε στο παρακάτω σύστημα:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 = 1 - 2\lambda \\ x_2 + x_3 & = -2\lambda \\ & x_4 - x_5 = 1 - \lambda \\ & 0 = 1 + \lambda \end{cases}$$

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:

(1) Αν  $\lambda \neq -1$  τότε το σύστημα  $(\Sigma)$  είναι αδύνατο.

(2) Για  $\lambda = -1$  έχουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 - 2x_5 = 3 \\ x_2 + x_3 & = 2 \\ & x_4 - x_5 = 2 \end{cases}$$

Συνεπώς έχουμε ότι  $x_2 = 2 - x_3$ ,  $x_4 = 2 + x_5$  και αντικαθιστώντας στην πρώτη εξίσωση βρίσκουμε  $x_1 = -1 - x_3 + x_5$ . Θέτουμε  $x_3 = \nu$  και  $x_5 = \kappa$  με  $\kappa, \nu \in \mathbb{R}$ . Τότε έχουμε τη γενική λύση:

$$\begin{cases} x_1 = -1 - \nu + \kappa \\ x_2 = 2 - \nu \\ x_3 = \nu \\ x_4 = 2 + \kappa \\ x_5 = \nu \end{cases} \quad \kappa, \nu \in \mathbb{R}. \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 28.** Να εξεταστεί ποια από τα ακόλουθα υποσύνολα του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $\mathbb{R}^4$  είναι  $\mathbb{R}$ -διανυσματικοί υπόχωροι του:

- (1)  $W_1 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = y, z = t\}$ ,
- (2)  $W_2 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + z + t = 0\}$ ,
- (3)  $W_3 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x = 1\}$ ,
- (4)  $W_4 = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid xt = yz\}$ .

**Λύση.** Υπενθυμίζουμε ότι για να αποτελεί το υποσύνολο  $W$  ενός  $\mathbb{K}$ -διανυσματικού χώρου  $V$ , έναν υπόχωρο του  $V$  πρέπει να πληροί τα ακόλουθα:

- (1)  $W \neq \emptyset$ ,
- (2)  $\forall \vec{w}_1, \vec{w}_2 \in W \Rightarrow \vec{w}_1 + \vec{w}_2 \in W$ ,
- (3)  $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall \vec{w} \in W \Rightarrow \lambda \cdot \vec{w} \in W$ .

(α) Το  $W_1$  αποτελείται από τα στοιχεία του  $\mathbb{R}^4$  της μορφής  $(a, a, b, b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  και επειδή το  $(0, 0, 0, 0)$  ανήκει στο  $W_1$ , αφού είναι αυτής της μορφής, έπεται ότι  $W_1 \neq \emptyset$ .

Αν  $\vec{w}_1 \in W_1$  και  $\vec{w}_2 \in W_1$ , τότε το  $\vec{w}_1 = (a, a, b, b)$  και το  $\vec{w}_2 = (c, c, d, d)$ , όπου  $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ . Έχουμε:

$$\vec{w}_1 + \vec{w}_2 = (a, a, b, b) + (c, c, d, d) = (a + c, a + c, b + d, b + d),$$

το οποίο έχει την κατάλληλη μορφή ώστε να ανήκει στο  $W_1$ .

Ανάλογα, αν  $\lambda \in \mathbb{K}$  και  $\vec{w} \in W_1$ , τότε το  $\vec{w} = (a, a, b, b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$  και έχουμε:

$$\lambda \cdot \vec{w} = \lambda \cdot (a, a, b, b) = (\lambda a, \lambda a, \lambda b, \lambda b),$$

το οποίο έχει την κατάλληλη μορφή ώστε να ανήκει στο  $W_1$ .

(β) Το  $W_2$  είναι  $\neq \emptyset$ , αφού οι συνιστώσες του  $\vec{0} = (0, 0, 0, 0)$  ικανοποιούν την  $x + y + z + t = 0$ , που έχει ως συνέπεια να ανήκει το  $\vec{0}$  στο  $W_2$ .

Αν  $\vec{w}_1 = (a_1, b_1, c_1, d_1) \in W_2$  και  $\vec{w}_2 = (a_2, b_2, c_2, d_2) \in W_2$ , τότε  $a_1 + b_1 + c_1 + d_1 = 0$  και  $a_2 + b_2 + c_2 + d_2 = 0$ . Συνεπώς,  $(a_1 + a_2) + (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) + (d_1 + d_2) = 0$  και γι' αυτό το  $\vec{w}_1 + \vec{w}_2 = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2, d_1 + d_2)$  ανήκει επίσης στο  $W_2$ .

Αν  $\lambda \in \mathbb{K}$  και  $\vec{w} = (a, b, c, d) \in W_2$ , τότε  $a + b + c + d = 0$ . Συνεπώς,  $\lambda a + \lambda b + \lambda c + \lambda d = \lambda 0 = 0$  και γι' αυτό το  $\lambda \vec{w} = (\lambda a, \lambda b, \lambda c, \lambda d)$  ανήκει επίσης στο  $W_2$ .

(γ) Το  $W_3$  **δεν είναι** διανυσματικός υπόχωρος του  $\mathbb{R}^4$ , μοιλονότι  $W_3 \neq \emptyset$ , αφού το  $(1, 1, 1, 1)$  είναι στοιχείο του. Πράγματι, αν ήταν διανυσματικός χώρος, τότε το μηδενικό στοιχείο του  $\mathbb{R}^4$ , δηλαδή το  $\vec{0} = (0, 0, 0, 0)$  θα ανήκε στο  $W_3$ . Το τελευταίο δεν μπορεί να συμβαίνει, αφού για να ανήκει το  $\vec{0}$  στο  $W_3$ , θα πρέπει, σύμφωνα με τον ορισμό του  $W_3$ , η πρώτη συνιστώσα του, το 0, να ισούται με 1.

(δ) Το  $W_4$  **δεν είναι** διανυσματικός υπόχωρος του  $\mathbb{R}^4$ , μοιλονότι  $W_4 \neq \emptyset$ , αφού οι συνιστώσες του  $\vec{0} = (0, 0, 0, 0)$  ικανοποιούν την  $xt = yz$  και συνεπώς  $\vec{0} \in W_4$ . Παρατηρούμε ότι το  $\vec{w}_1 = (0, 0, 2, 4)$  ανήκει στο  $W_4$ , αφού  $0 \cdot 4 = 0 \cdot 2$  και το  $\vec{w}_2 = (4, 1, 8, 2)$ , αφού  $4 \cdot 2 = 1 \cdot 8$ . Ωστόσο, το  $\vec{w}_1 + \vec{w}_2 = (4, 1, 10, 6)$  δεν ανήκει στο  $W_4$ , αφού  $4 \cdot 6 \neq 1 \cdot 10$ .



**Λυμένη Άσκηση 29.** Έστω  $\text{Seq}(\mathbb{R})$  το σύνολο των πραγματικών ακολουθιών. Στο  $\text{Seq}(\mathbb{R})$  ορίζουμε πρόσθεση

$$+ : \text{Seq}(\mathbb{R}) \times \text{Seq}(\mathbb{R}) \longrightarrow \text{Seq}(\mathbb{R}),$$

$$((a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}) \longmapsto (a_n)_{n \in \mathbb{N}} + (b_n)_{n \in \mathbb{N}} := (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

και βαθμωτό πολλαπλασιασμό

$$\cdot : \mathbb{R} \times \text{Seq}(\mathbb{R}) \longrightarrow \text{Seq}(\mathbb{R}), (\lambda, (a_n)_{n \in \mathbb{N}}) \longmapsto \lambda \cdot (a_n)_{n \in \mathbb{N}} := (\lambda a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

- (1) Ναδειχθεί ότι η τριάδα  $(\text{Seq}(\mathbb{R}), +, \cdot)$  αποτελεί  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο.
- (2) Ας είναι  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  το υποσύνολο του  $\text{Seq}(\mathbb{R})$  που απαρτίζεται από τις ακολουθίες που συγκλίνουν σε κάποιον πραγματικό αριθμό. Ποιες γνωστές προτάσεις του Απειροστικού Λογισμού εξασφαλίζουν ότι το  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι ένας διανυσματικός υπόχωρος του  $\text{Seq}(\mathbb{R})$ ;

**Λύση.** (α') Το πρώτο μέρος της άσκησης μπορεί να προκύψει αμέσως από την:

**Πρόταση.** Έστω ότι  $S$  είναι ένα μη κενό σύνολο και ότι  $(V, +, \cdot)$  είναι ένας  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος. Το σύνολο  $\text{Map}(S, V) := \{f : S \rightarrow V\}$  των απεικονίσεων από το  $S$  στο  $V$  αποτελεί έναν  $\mathbb{K}$ -διανυσματικό χώρο με πράξεις την πρόσθεση:

$$+ : \text{Map}(S, V) \times \text{Map}(S, V) \rightarrow \text{Map}(S, V), (f, g) \mapsto f + g,$$

όπου  $f + g$  είναι η απεικόνιση που ορίζεται ως

$$f + g : S \rightarrow V, s \mapsto (f + g)(s) := f(s) + g(s), \forall s \in S.$$

και βαθμωτό πολλαπλασιασμό

$$\cdot : \mathbb{K} \times \text{Map}(S, V) \rightarrow \text{Map}(S, V), (\lambda, f) \mapsto \lambda \cdot f,$$

όπου  $\lambda \cdot f$  είναι η απεικόνιση που ορίζεται ως

$$\lambda \cdot f : S \rightarrow V, s \mapsto (\lambda \cdot f)(s) := \lambda f(s), \forall s \in S. \quad \square$$

Επιλέγοντας ως  $S$  το σύνολο των φυσικών αριθμών  $\mathbb{N}$  και ως  $V$  τον  $\mathbb{R}$ -διανυσματικό χώρο  $\mathbb{R}$ , παίρνουμε  $\text{Map}(\mathbb{N}, \mathbb{R}) = \text{Seq}(\mathbb{R})$ .

(β') Για να δείξουμε ότι  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι  $\mathbb{R}$ -διανυσματικός υπόχωρος πρέπει να εξασφαλίσουμε:

- (1) Ότι το  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι μη κενό. Πράγματι το όριο κάθε σταθερής ακολουθίας πραγματικών αριθμών, δηλαδή κάθε ακολουθίας της μορφής  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}, a_i = c \in \mathbb{R}, \forall i \in \mathbb{N}$ , είναι ο αριθμός  $c$ . Συνεπώς, οι σταθερές ακολουθίες ανήκουν στο  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  και γι' αυτό δεν είναι το κενό σύνολο.
- (2) Ότι, αν  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$  και  $(b_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$ , τότε και η ακολουθία  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} + (b_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$ , δηλαδή ότι αν η ακολουθία  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $r_1 \in \mathbb{R}$  και η ακολουθία  $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $r_2 \in \mathbb{R}$ , τότε το άθροισμά τους  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} + (b_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $r_1 + r_2 \in \mathbb{R}$ . Συνεπώς το  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι κλειστό ως προς την πρόσθεση του  $(\text{Seq}(\mathbb{R}))$ .
- (3) Ότι, αν  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$ , τότε και η ακολουθία  $\lambda \cdot (a_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \text{FinSeq}(\mathbb{R})$ , δηλαδή ότι αν η ακολουθία  $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $r \in \mathbb{R}$  και  $\lambda$  είναι ένας πραγματικός αριθμός, τότε το βαθμωτό γινόμενο  $\lambda \cdot (a_i)_{i \in \mathbb{N}} = (\lambda a_i)_{i \in \mathbb{N}}$  συγκλίνει στον  $\lambda r \in \mathbb{R}$ . Συνεπώς το  $\text{FinSeq}(\mathbb{R})$  είναι κλειστό ως προς τον βαθμωτό πολλαπλασιασμό που ορίζεται στο  $\text{Seq}(\mathbb{R})$ .

**Λυμένη Άσκηση 30.** Να εξεταστεί ποιο από τα επόμενα υποσύνολα του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$  των  $n \times n$  πινάκων με συνιστώσες από το  $\mathbb{R}$  αποτελεί  $\mathbb{R}$ -υπόχωρο του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ :

- (1) Το σύνολο των συμμετρικών των  $n \times n$  πινάκων.
- (2) Το σύνολο των αντιστρέψιμων των  $n \times n$  πινάκων.
- (3) Το σύνολο των μη αντιστρέψιμων  $n \times n$  πινάκων.

**Λύση.** (α') Έστω  $S$  το σύνολο των συμμετρικών  $n \times n$  πινάκων, δηλαδή των πινάκων  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$  με  $A = {}^t A$ . Για να είναι το  $S$  ένας  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ , θα πρέπει:

Το  $S$  να μην είναι κενό. Πράγματι, ο ταυτοτικός  $n \times n$  πίνακας  $I_n$  είναι συμμετρικός και γι' αυτό ανήκει στο  $S$ . Άρα,  $S \neq \emptyset$ .

Αν  $A, B \in S$ , τότε και  $A + B \in S$ . Πράγματι,  ${}^t(A + B) = {}^t A + {}^t B = A + B$ . Συνεπώς,  $A + B \in S$ .

Αν  $\lambda \in \mathbb{R}$  και  $A \in S$ , τότε και  $\lambda \cdot A \in S$ . Πράγματι,  ${}^t(\lambda \cdot A) = \lambda \cdot {}^t A = \lambda \cdot A$ . Συνεπώς  $\lambda \cdot A \in S$ . Επομένως το  $S$  είναι ένας  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

(β') Έστω  $T$  το σύνολο των αντιστρέψιμων  $n \times n$  πινάκων. Για να είναι το  $T$  ένας  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ , θα πρέπει:

Το  $T$  να μην είναι κενό. Πράγματι, ο ταυτοτικός  $n \times n$  πίνακας  $I_n$  είναι αντιστρέψιμος και γι' αυτό ανήκει στο  $T$ . Άρα,  $T \neq \emptyset$ .

Αν  $A, B \in T$ , τότε και  $A + B \in T$ . Αυτό όμως οφείλει να συμβαίνει για όλους τους αντιστρέψιμους πίνακες  $A, B$ . Επιλέγοντας ως  $A$  τον  $I_n$  και ως  $B$  τον  $-I_n$ , ο οποίος προφανώς είναι αντιστρέψιμος, έχουμε:  $I_n + (-I_n) = \mathbb{O}_n$ . Αλλά ο μηδενικός  $n \times n$  πίνακας  $\mathbb{O}_n$  δεν ανήκει στο  $T$ , αφού δεν είναι αντιστρέψιμος. Συνεπώς ο  $T$  δεν είναι  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

(γ') Έστω  $Q$  το σύνολο των μη αντιστρέψιμων  $n \times n$  πινάκων. Για να είναι το  $Q$  ένας  $\mathbb{R}$  υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ , θα πρέπει:

Το  $Q$  να μην είναι κενό. Πράγματι, ο μηδενικός  $n \times n$  πίνακας  $\mathbb{O}_n$  δεν είναι αντιστρέψιμος και γι' αυτό ανήκει στο  $Q$ . Άρα,  $Q \neq \emptyset$ .

Τώρα θα διακρίνουμε περιπτώσεις.

Για  $n = 1$ , ο χώρος  $M_{1 \times 1}(\mathbb{R})$  ισούται με  $\mathbb{R}$  και το  $Q = \{0\}$  (κάθε μη μηδενικό στοιχείο του  $\mathbb{R}$  είναι αντιστρέψιμο). Προφανώς το  $Q = \{0\}$  είναι  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $\mathbb{R}$ .

Για  $n \geq 2$ , αν  $A, B \in Q$ , τότε θα πρέπει και  $A + B \in Q$ . Αυτό όμως οφείλει να συμβαίνει για όλους τους μη αντιστρέψιμους πίνακες  $A, B$ . Επιλέγοντας ως  $A = (a_{ij})$  τον πίνακα με  $a_{11} = 1$  και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ίσα με 0 έχουμε ότι  $A \in Q$ . Επιλέγοντας ως  $B = (b_{ij})$  τον πίνακα με  $b_{22} = \dots = b_{nn} = 1$  και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του ίσα με 0 έχουμε ότι  $B \in Q$ . (Οι  $A, B$  δεν είναι αντιστρέψιμοι επειδή έχουν μηδενικές ορίζουσες.) Το άθροισμα  $A + B$  ισούται με τον ταυτοτικό πίνακα ο οποίος προφανώς είναι αντιστρέψιμος και συνεπώς  $A + B = I_n \notin Q$ . Συνεπώς ο  $Q$  δεν είναι  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ .

#### 45. Φυλλάδιο 5 - 19/1/2012

**Λυμένη Άσκηση 31.** Να προσδιοριστεί μια βάση και η διάσταση του  $\mathbb{R}$ -υποχώρου

$$\mathcal{V} = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid c = a - b, d = a + b\} \subseteq \mathbb{R}^4.$$

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid c = a - b, d = a + b\} \\ &= \{(a, b, a - b, a + b) \in \mathbb{R}^4 \mid a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(a, 0, a, a) + (0, b, -b, b) \in \mathbb{R}^4 \mid a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a(1, 0, 1, 1) + b(0, 1, -1, 1) \in \mathbb{R}^4 \mid a, b \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0, 1, 1), (0, 1, -1, 1) \rangle \end{aligned}$$

και άρα τα διανύσματα  $\vec{\varepsilon}_1 = (1, 0, 1, 1)$  και  $\vec{\varepsilon}_2 = (0, 1, -1, 1)$  παράγουν τον υπόχωρο  $\mathcal{V}$ . Έστω

$$\begin{aligned} \lambda_1(1, 0, 1, 1) + \lambda_2(0, 1, -1, 1) = (0, 0, 0, 0) &\Rightarrow (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_1 - \lambda_2, \lambda_1 + \lambda_2) = (0, 0, 0, 0) \\ &\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0 \end{aligned}$$

Άρα τα διανύσματα  $\{\vec{\varepsilon}_1, \vec{\varepsilon}_2\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα και αφού δείξαμε ότι παράγουν τον χώρο  $\mathcal{V}$  έπεται ότι αποτελούν μια βάση του  $\mathcal{V}$ . Συνεπώς έχουμε  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 2$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 32.** Να προσδιοριστούν όλες οι τιμές του  $a \in \mathbb{R}$ , για τις οποίες το σύνολο των διανυσμάτων

$$\{\vec{x} = (a^2, 0, 1), \vec{y} = (0, a, 2), \vec{z} = (1, 0, 1)\}$$

αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}^3$ .

**Λύση.** Έχουμε

$$A = \begin{pmatrix} a^2 & 0 & 1 \\ 0 & a & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

και εύκολα υπολογίζουμε ότι  $\det A = a(a^2 - 1)$ . Τότε για  $a \neq 0, -1, 1$  η ορίζουσα  $\det A \neq 0$  και άρα τα διανύσματα  $\vec{x} = (a^2, 0, 1), \vec{y} = (0, a, 2)$  και  $\vec{z} = (1, 0, 1)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα.

Υπενθύμιση: Έστω  $\mathcal{E}$  ένας  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος με  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = n$ . Τότε κάθε υποσύνολο  $\mathcal{B}$  του  $\mathcal{E}$  το οποίο είναι γραμμικά ανεξάρτητο με  $|\mathcal{B}| = n$  αποτελεί βάση του  $\mathcal{E}$ .

Επόμενος για  $a \neq 0, -1, 1$  το σύνολο των διανυσμάτων  $\{\vec{x} = (a^2, 0, 1), \vec{y} = (0, a, 2), \vec{z} = (1, 0, 1)\}$  αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}^3$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 33.** Έστω  $P$  ένας σταθερός αντιστρέψιμος  $3 \times 3$  πίνακας πραγματικών αριθμών. Θεωρούμε το ακόλουθο σύνολο:

$$\mathcal{V}(P) = \{A \in M_{3 \times 3}(\mathbb{R}) \mid \text{ο πίνακας } P^{-1}AP \text{ είναι διαγώνιος}\}$$

Να δείξετε ότι το σύνολο  $\mathcal{V}(P)$  είναι ένας υπόχωρος του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$  και ακολούθως να βρείτε μια βάση του.

**Λύση.** Έστω  $A \in \mathcal{V}(P)$ , δηλαδή

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}$$

με  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ . Τότε έχουμε

$$\begin{aligned} A &= P \begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \beta & 0 \\ 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} P^{-1} \\ &= P \left( \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \right) P^{-1} \\ &= \alpha \left( P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} \right) + \beta \left( P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} \right) + \gamma \left( P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} \right) \end{aligned}$$

και άρα έπεται ότι

$$\mathcal{V}(P) = \left\langle P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}, P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}, P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} \right\rangle$$

Συνεπώς, το σύνολο  $\mathcal{V}(P)$  είναι υπόχωρος του  $\mathbb{R}$ -διανυσματικού χώρου  $M_{3 \times 3}(\mathbb{R})$ . Επίσης, τα διανύσματα

$$\vec{\Gamma} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}, \quad \vec{\Delta} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1}, \quad \vec{\Sigma} = P \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

παράγουν τον υπόχωρο  $\mathcal{V}(P)$ . Έστω  $\lambda_1 \vec{\Gamma} + \lambda_2 \vec{\Delta} + \lambda_3 \vec{\Sigma} = \vec{0}$  όπου  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ . Τότε

$$P \left( \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} \right) P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

και αν πολλαπλασιάσουμε την παραπάνω σχέση από αριστερά με  $P^{-1}$  και δεξιά με  $P$  έχουμε

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

Άρα, τα διανύσματα  $\vec{\Gamma}, \vec{\Delta}, \vec{\Sigma}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα και αφού παράγουν τον  $\mathcal{V}(P)$  συνεπάγεται ότι το σύνολο  $\{\vec{\Gamma}, \vec{\Delta}, \vec{\Sigma}\}$  αποτελεί βάση του υπόχωρου  $\mathcal{V}(P)$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 34.** Έστω  $M$  ένας σταθερός  $2 \times 2$  πίνακας πραγματικών αριθμών. Να δείξετε ότι το σύνολο

$$\mathcal{V}(M) = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}$$

όλων των  $2 \times 2$  πινάκων οι οποίοι μετατίθενται με τον  $M$  είναι ένας υπόχωρος του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Αν

$$M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

να βρείτε μια βάση του  $\mathcal{V}(M)$ .

**Λύση.** Θα δείξουμε με τον ορισμό ότι το σύνολο

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(M) &= \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid AM = MA\} \\ &= \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid AM - MA = 0\} \end{aligned}$$

είναι ένας υπόχωρος του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Έχουμε:

(1) Το σύνολο  $\mathcal{V}(M) \neq \emptyset$  αφού ο μηδενικός πίνακας  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{V}(M)$ .

(2) Έστω  $A_1, A_2 \in \mathcal{V}(M)$ . Τότε

$$\begin{aligned} (A_1 + A_2)M - M(A_1 + A_2) &= A_1M + A_2M - MA_1 - MA_2 \\ &= (A_1M - MA_1) + (A_2M - MA_2) \\ &= 0 \end{aligned}$$

και άρα  $A_1 + A_2 \in \mathcal{V}(M)$ .

(3) Έστω  $\lambda \in \mathbb{R}$  και  $A \in \mathcal{V}(M)$ . Τότε

$$\begin{aligned} (\lambda A)M - M(\lambda A) &= \lambda AM - \lambda MA \\ &= \lambda(AM - MA) \\ &= \lambda 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

και άρα  $\lambda A \in \mathcal{V}(M)$ .

Συνεπώς, το σύνολο  $\mathcal{V}(M)$  είναι  $\mathbb{R}$ -υπόχωρος του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Στην συνέχεια θα βρούμε μια βάση του  $\mathcal{V}(M)$  στην περίπτωση που  $M = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ . Έστω  $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$  έτσι ώστε

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 3b + 2c & -2a + 2d \\ 3d - 3a & -2c - 3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = d \\ b = -\frac{2}{3}c \end{cases}$$

Επομένως, έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(M) &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a = d, b = -\frac{2}{3}c \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & -\frac{2}{3}c \\ c & a \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{3} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{3} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

και άρα έχουμε ότι οι πίνακες  $\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  και  $\Delta = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2}{3} \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$  παράγουν τον υπόχωρο  $\mathcal{V}(M)$ . Εύκολα διαπιστώνουμε ότι το σύνολο  $\{\Gamma, \Delta\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα αποτελεί μια βάση του  $\mathcal{V}(M)$ .  $\square$

#### 46. Φυλλάδιο 6 - 19/1/2012

**Λυμένη Άσκηση 35.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\mathcal{V} = \langle \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \rangle$  ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$\vec{x} = (1, 1, 1, a), \quad \vec{y} = (1, 0, 1, b), \quad \vec{z} = (-2, 2, -2, c) \in \mathbb{R}^4$$

όπου  $a, b, c \in \mathbb{R}$ .

**Λύση.** Έστω  $\lambda_1 \vec{x} + \lambda_2 \vec{y} + \lambda_3 \vec{z} = \vec{0}$  με  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ . Τότε

$$\begin{aligned} \lambda_1(1, 1, 1, a) + \lambda_2(1, 0, 1, b) + \lambda_3(-2, 2, -2, c) &= (0, 0, 0, 0) \\ \Rightarrow (\lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_3, \lambda_1 + 2\lambda_3, \lambda_1 + \lambda_2 - 2\lambda_3, \lambda_1 a + \lambda_2 b + \lambda_3 c) &= (0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

και θύνοντας βρίσκουμε ότι  $\lambda_2 = -2\lambda_1$  και  $\lambda_1 = -2\lambda_3$ . Άρα, θέτοντας  $\lambda_3 = k$  με  $k \in \mathbb{R}$  έχουμε τη γενική λύση  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (-2k, 4k, k)$ . Τότε έχουμε  $-2ka + 4kb + kc = 0 \Rightarrow k(-2a + 4b + c) = 0$ . Διακρίνουμε τις παρακάτω δυο περιπτώσεις:

- (1) Έστω  $-2a + 4b + c \neq 0$ . Τότε  $k = 0$  και άρα  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ . Συνεπώς, το σύνολο  $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα αποτελεί βάση του  $\mathcal{V}$ . Επομένως  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 3$
- (2) Έστω  $-2a + 4b + c = 0$ . Τότε  $k \in \mathbb{R}$  και τα διανύσματα  $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\}$  είναι γραμμικά εξαρτημένα. Για  $k = 1$  έχουμε τη σχέση γραμμικής εξάρτησης:  $-2\vec{x} + 4\vec{y} + \vec{z} = \vec{0} \Rightarrow \vec{z} = -2\vec{x} + 4\vec{y}$ . Τότε

$$\langle \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \Rightarrow \mathcal{V} = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Εύκολα δείχνουμε ότι το σύνολο  $\{\vec{x}, \vec{y}\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα αποτελεί βάση του  $\mathcal{V}$ . Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή έχουμε  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 2$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 36.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\mathcal{V} = \langle \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \rangle$  ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$\vec{u} = (0, 1, 2), \quad \vec{v} = (0, -1, 2), \quad \vec{w} = (0, 3, 4)$$

η οποία να επεκταθεί σε μια βάση του  $\mathbb{R}^3$ .

**Λύση.** Έστω  $\lambda_1 \vec{u} + \lambda_2 \vec{v} + \lambda_3 \vec{w} = \vec{0}$  με  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ . Τότε

$$\begin{aligned} \lambda_1(0, 1, 2) + \lambda_2(0, -1, 2) + \lambda_3(0, 3, 4) &= (0, 0, 0) \\ \Rightarrow (0, \lambda_1 - \lambda_2 + 3\lambda_3, 2\lambda_1 + 2\lambda_2 + 4\lambda_3) &= (0, 0, 0) \end{aligned}$$

και άρα καταλήγουμε στο σύστημα

$$\begin{cases} \lambda_1 - \lambda_2 + 3\lambda_3 = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 + 2\lambda_3 = 0 \end{cases}$$

όπου βρίσκουμε ότι  $\lambda_1 = -\frac{5}{2}\lambda_3$  και  $\lambda_2 = \frac{1}{2}\lambda_3$ . Συνεπώς, θέτοντας  $\lambda_3 = k$  με  $k \in \mathbb{R}$  έχουμε τη γενική λύση  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = (-\frac{5}{2}k, \frac{1}{2}k, k)$  και άρα τα διανύσματα  $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}\}$  είναι γραμμικά εξαρτημένα. Για  $k = 2$  έχουμε  $\lambda_1 = -5, \lambda_2 = 1$  και  $\lambda_3 = 2$ . Άρα μια σχέση γραμμικής εξάρτησης είναι  $-5\vec{u} + \vec{v} + 2\vec{w} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = 5\vec{u} - 2\vec{w}$ . Τότε

$$\langle \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle \Rightarrow \mathcal{V} = \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

Εύκολα δείχνουμε ότι το σύνολο  $\{\vec{u}, \vec{w}\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και αφού παράγει τον  $\mathcal{V}$  έπεται ότι αποτελεί βάση του  $\mathcal{V}$ . Επομένως  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 2$ . Στην συνέχεια θέλουμε να επεκτείνουμε τη βάση του  $\mathcal{V}$  που βρήκαμε σε μια βάση του  $\mathbb{R}^3$ . Αφού  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = 2$  ψάχνουμε ένα διάνυσμα  $\vec{x} = (\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$  έτσι ώστε το σύνολο  $\{\vec{u}, \vec{w}, \vec{x}\}$  να είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Θέτουμε  $\vec{x} = (1, 0, 0)$ . Τότε

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -2 \neq 0$$

και άρα το σύνολο  $\{\vec{u}, \vec{w}, \vec{x}\}$  αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}^3$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 37.** Έστω  $\mathcal{E}$  ένας διανυσματικός χώρος υπεράνω ενός σώματος  $\mathbb{K}$ . Υποθέτουμε ότι το σύνολο

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_i, \dots, \vec{e}_n\}$$

είναι βάση του  $\mathcal{E}$ .

(1) Να δείξετε ότι τότε το σύνολο

$$\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_i + \lambda \vec{e}_j, \dots, \vec{e}_n\}$$

είναι βάση του  $\mathcal{E}$ , για κάθε  $\lambda \in \mathbb{K}$  και  $i \neq j$ .

(2) Τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

(α) Το σύνολο

$$\mathcal{D} = \{\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{e}_2 + \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_{n-1} + \vec{e}_n, \vec{e}_n + \vec{e}_1\}$$

είναι βάση του  $\mathcal{E}$ .

(β) Το  $n$  είναι περιττός.

**Λύση.** (1) Το σύνολο  $\mathcal{C}$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$  αν το  $\mathcal{C}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο διότι  $|\mathcal{B}| = |\mathcal{C}|$ . Έστω

$$\begin{aligned} \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_{i-1} \vec{e}_{i-1} + \lambda_i (\vec{e}_i + \lambda \vec{e}_j) + \lambda_{i+1} \vec{e}_{i+1} + \dots + \lambda_n \vec{e}_n &= \vec{0} \\ \Rightarrow \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_{i-1} \vec{e}_{i-1} + \lambda_i \vec{e}_i + \lambda_{i+1} \vec{e}_{i+1} + \dots + (\lambda_j + \lambda_i \lambda) \vec{e}_j + \dots + \lambda_n \vec{e}_n &= \vec{0} \end{aligned}$$

και αφού το σύνολο  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο έχουμε

$$\lambda_1 = \dots = \lambda_{i-1} = \lambda_i = \lambda_{i+1} = \dots = \lambda_j + \lambda_i \lambda = \dots = \lambda_n = 0$$

και άρα έπεται ότι  $\lambda_i = 0$  για κάθε  $i = 1, \dots, n$ . Συνεπώς, το σύνολο  $\mathcal{C}$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$ .

(2) Εξετάζουμε πότε το σύνολο  $\mathcal{D}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Έστω

$$\begin{aligned} \lambda_1(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + \lambda_2(\vec{e}_2 + \vec{e}_3) + \cdots + \lambda_{n-1}(\vec{e}_{n-1} + \vec{e}_n) + \lambda_n(\vec{e}_n + \vec{e}_1) &= \vec{0} \\ \Rightarrow (\lambda_1 + \lambda_n)\vec{e}_1 + (\lambda_1 + \lambda_2)\vec{e}_2 + \cdots + (\lambda_{n-2} + \lambda_{n-1})\vec{e}_{n-1} + (\lambda_{n-1} + \lambda_n)\vec{e}_n &= \vec{0} \end{aligned}$$

και άρα καταλήγουμε στο παρακάτω σύστημα:

$$(\Sigma) : \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_n = 0 \\ \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \vdots \\ \lambda_{n-2} + \lambda_{n-1} = 0 \\ \lambda_{n-1} + \lambda_n = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_n = -\lambda_1 = (-1)^2 \lambda_2 = \cdots = (-1)^{n-1} \lambda_{n-1} = (-1)^n \lambda_n$$

Επομένως έχουμε  $\lambda_n = (-1)^n \lambda_n$ .

(β')  $\Rightarrow$  (α'): Αν το  $n$  είναι περιττός, τότε  $\lambda_n = -\lambda_n \Rightarrow \lambda_n = 0$  και άρα  $\lambda_i = 0$  για κάθε  $i = 1, \dots, n$ . Συνεπώς, το σύνολο  $\mathcal{D}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα βάση του  $\mathcal{E}$ .

(α')  $\Rightarrow$  (β'): Υποθέτουμε ότι το  $n$  είναι άρτιος. Τότε  $\lambda_n = \lambda_n$  και άρα για  $\lambda_1 = k \in \mathbb{R}$  έχουμε τη γενική λύση του (Σ):

$$\lambda_1 = k, \lambda_2 = -k, \lambda_3 = k, \dots, \lambda_{n-1} = k, \lambda_n = -k$$

και άρα για  $k = 1$  έχουμε την ακόλουθη σχέση γραμμικής εξάρτησης:

$$1(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) + (-1)(\vec{e}_2 + \vec{e}_3) + \cdots + 1(\vec{e}_{n-1} + \vec{e}_n) + (-1)(\vec{e}_n + \vec{e}_1) = \vec{0}$$

Επομένως, αποδείξαμε ότι αν το  $n$  είναι άρτιος τότε το σύνολο  $\mathcal{D}$  είναι γραμμικά εξαρτημένο και άρα έχουμε το ζητούμενο.  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 38.** Έστω τα ακόλουθα διανύσματα του  $\mathbb{R}^n$ :

$$\vec{x}_1 = (1, 1, 0, \dots, 0), \quad \vec{x}_2 = (0, 1, 1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad \vec{x}_n = (1, 0, \dots, 0, 1)$$

Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}} \langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \rangle$  του υπόχωρου ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα  $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_n$ .

**Λύση.** Έστω

$$\begin{aligned} \lambda_1(1, 1, 0, \dots, 0) + \lambda_2(0, 1, 1, 0, \dots, 0) + \cdots + \lambda_{n-1}(0, 0, \dots, 1, 1) + \lambda_n(1, 0, \dots, 0, 1) &= (0, \dots, 0) \\ \Rightarrow (\lambda_1 + \lambda_n, \lambda_2 + \lambda_3, \dots, \lambda_{n-2} + \lambda_{n-1}, \lambda_{n-1} + \lambda_n) &= (0, \dots, 0) \end{aligned}$$

και άρα έχουμε το σύστημα:

$$(\Sigma) : \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_n = 0 \\ \lambda_2 + \lambda_3 = 0 \\ \vdots \\ \lambda_{n-2} + \lambda_{n-1} = 0 \\ \lambda_{n-1} + \lambda_n = 0 \end{cases}$$

Από την Άσκηση 3 έχουμε ότι το σύστημα (Σ) έχει μόνο τη μηδενική λύση αν και μόνο αν το  $n$  είναι περιττός. Άρα, αν το  $n$  είναι περιττός, τότε το σύνολο  $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα αποτελεί βάση του  $\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \rangle$ . Συνεπώς στην περίπτωση που το  $n$  είναι περιττός έχουμε  $\dim_{\mathbb{R}} \langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \rangle = n$  και άρα  $\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \rangle = \mathbb{R}^n$ , δηλαδή το σύνολο  $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n\}$  αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}^n$ .

Αν το  $n$  είναι άρτιος, τότε η γενική λύση του (Σ) είναι:

$$\lambda_1 = k, \lambda_2 = -k, \dots, \lambda_{n-1} = k, \lambda_n = -k$$

και άρα για  $k = 1$  έχουμε τη παρακάτω σχέση γραμμικής εξάρτησης:

$$\vec{x}_1 - \vec{x}_2 + \vec{x}_3 - \cdots + \vec{x}_{n-1} - \vec{x}_n = \vec{0} \Rightarrow \vec{x}_n = \vec{x}_1 - \vec{x}_2 + \vec{x}_3 - \cdots + \vec{x}_{n-1}$$

Συνοπώς έχουμε

$$\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{n-1}, \vec{x}_n \rangle = \langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{n-1} \rangle$$

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι τα διανύσματα  $\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{n-1}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Επομένως, το σύνολο  $\{\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_{n-1}\}$  αποτελεί βάση του  $\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \rangle$  και άρα  $\dim_{\mathbb{R}} \langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n \rangle = n - 1$ .  $\square$

#### 47. Φυλλάδιο 7 - 23/1/2012

**Λυμένη Άσκηση 39.** Έστω  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$  και

$$\mathcal{V} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n = 0\}$$

Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}$ .

**Λύση.** Διακρίνουμε δυο περιπτώσεις:

- (1) Αν τα  $\alpha_i = 0$  για κάθε  $i = 1, 2, \dots, n$  τότε προφανώς  $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$  και άρα  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = n$ .
- (2) Έστω ότι  $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \neq (0, 0, \dots, 0)$ . Χωρίς βλάβη της γενικότητας υποθέτουμε ότι  $\alpha_1 \neq 0$  και τότε  $x_1 = -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} x_2 - \cdots - \frac{\alpha_n}{\alpha_1} x_n$ . Έχουμε:

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \left\{ \left( -\frac{\alpha_2}{\alpha_1} x_2 - \cdots - \frac{\alpha_n}{\alpha_1} x_n, x_2, \dots, x_n \right) \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ x_2 \left( -\frac{\alpha_2}{\alpha_1}, 1, 0, \dots, 0 \right) + x_3 \left( -\frac{\alpha_3}{\alpha_1}, 0, 1, \dots, 0 \right) + \cdots + x_n \left( -\frac{\alpha_n}{\alpha_1}, 0, \dots, 0, 1 \right) \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \left( -\frac{\alpha_2}{\alpha_1}, 1, 0, \dots, 0 \right), \left( -\frac{\alpha_3}{\alpha_1}, 0, 1, \dots, 0 \right), \dots, \left( -\frac{\alpha_n}{\alpha_1}, 0, \dots, 0, 1 \right) \right\rangle \end{aligned}$$

Θέτουμε  $\vec{e}_1 = \left( -\frac{\alpha_2}{\alpha_1}, 1, 0, \dots, 0 \right)$ ,  $\vec{e}_2 = \left( -\frac{\alpha_3}{\alpha_1}, 0, 1, \dots, 0 \right)$ ,  $\dots$ ,  $\vec{e}_{n-1} = \left( -\frac{\alpha_n}{\alpha_1}, 0, \dots, 0, 1 \right)$ . Άρα από την παραπάνω περιγραφή του  $\mathcal{V}$  έχουμε ότι τα διανύσματα  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{n-1}$  παράγουν τον  $\mathcal{V}$ . Έστω  $\lambda_1 \vec{e}_1 + \lambda_2 \vec{e}_2 + \cdots + \lambda_{n-1} \vec{e}_{n-1} = \vec{0}$  με  $\lambda_1, \dots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}$ . Τότε έπεται εύκολα ότι  $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$  και άρα τα διανύσματα  $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{n-1}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Επομένως, το σύνολο  $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{n-1}\}$  αποτελεί βάση του  $\mathcal{V}$  και άρα  $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = n - 1$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 40.** Έστω  $\vec{x} = (2, 1, 4, 3)$ ,  $\vec{y} = (2, 1, 2, 0) \in \mathbb{R}^4$ . Ναδειχθεί ότι το σύνολο διανυσμάτων  $\{\vec{x}, \vec{y}\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και να βρεθούν δυο διανύσματα  $\vec{z}, \vec{w} \in \mathbb{R}^4$  έτσι ώστε το σύνολο  $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{w}\}$  να αποτελεί βάση του  $\mathbb{R}^4$ .

**Λύση.** Έστω  $\lambda_1 \vec{x} + \lambda_2 \vec{y} = \vec{0}$  με  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ . Τότε

$$\begin{aligned} \lambda_1 (2, 1, 4, 3) + \lambda_2 (2, 1, 2, 0) &= (0, 0, 0, 0) \\ \Rightarrow (2\lambda_1 + 2\lambda_2, \lambda_1 + \lambda_2, 4\lambda_1 + 2\lambda_2, 3\lambda_1) &= (0, 0, 0, 0) \end{aligned}$$

και άρα άμεσα θα έχουμε ότι  $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$ . Επομένως, το σύνολο διανυσμάτων  $\{\vec{x}, \vec{y}\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

Επειδή  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^4 = 4$ , ψάχνουμε δυο διανύσματα  $\vec{z}, \vec{w} \in \mathbb{R}^4$  έτσι ώστε το σύνολο  $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{w}\}$  να είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα βάση του  $\mathbb{R}^4$ . Αν  $\vec{z} = (z_1, z_2, z_3, z_4)$  και  $\vec{w} = (w_1, w_2, w_3, w_4)$  τότε θα πρέπει

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ z_1 & z_2 & z_3 & z_4 \\ w_1 & w_2 & w_3 & w_4 \end{vmatrix} \neq 0$$



Θέτουμε  $\vec{z} = (1, 0, 0, 0)$  και  $\vec{w} = (0, 1, 0, 0)$ . Τότε

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$$

Συνεπώς το σύνολο  $\{\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{w}\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα βάση του  $\mathbb{R}^4$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 41.** Να βρεθεί μια βάση του υπόχωρου  $\langle A, B, \Gamma, \Delta \rangle$  ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Delta = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ , και ακολούθως η βάση αυτή να συμπληρωθεί σε μια βάση του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .

**Λύση.** Έστω  $\lambda_1 A + \lambda_2 B + \lambda_3 \Gamma + \lambda_4 \Delta = 0$  με  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ . Τότε

$$\begin{aligned} \lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda_1 + \lambda_3 + \lambda_4 & 2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 + 3\lambda_4 \\ 3\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 + 3\lambda_4 & 4\lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

και άρα έχουμε το σύστημα:

$$(\Sigma) : \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 + 3\lambda_4 = 0 \\ 3\lambda_1 + 2\lambda_2 - \lambda_3 + 3\lambda_4 = 0 \\ 4\lambda_1 + 3\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \end{cases}$$

Έχουμε

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} &\xrightarrow[\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - 3\Gamma_1]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \\ 4 & 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - 4\Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 2 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & -3 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow[\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - 3\Gamma_2]{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - 2\Gamma_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & -6 \end{pmatrix} &\xrightarrow{\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - 3\Gamma_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \frac{1}{2}\Gamma_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

και άρα καταλήγουμε στο σύστημα:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 - 3\lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_3 - \lambda_4 = 0 \end{cases} \implies \lambda_3 = \lambda_4, \lambda_2 = 2\lambda_3, \lambda_1 = -2\lambda_3.$$

Θέτουμε  $\lambda_3 = k \in \mathbb{R}$ . Τότε η γενική λύση του  $(\Sigma)$  είναι  $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4) = (-2k, 2k, k, k)$ . Επομένως, για  $k = 1$  έχουμε τη παρακάτω σχέση γραμμικής εξάρτησης:

$$-2A + 2B + \Gamma + \Delta = 0 \implies A = B + \frac{1}{2}\Gamma + \frac{1}{2}\Delta$$

και άρα επειδή το  $A$  είναι γραμμικός συνδυασμός των  $B, \Gamma, \Delta$ , έπεται ότι τα  $B, \Gamma, \Delta$  παράγουν τον ίδιο υπόχωρο με τα  $A, B, \Gamma, \Delta$ :

$$\langle A, B, \Gamma, \Delta \rangle = \langle B, \Gamma, \Delta \rangle$$

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι τα διανύσματα  $B, \Gamma, \Delta$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα και άρα το σύνολο  $\{B, \Gamma, \Delta\}$  αποτελεί βάση του υπόχωρου  $\langle A, B, \Gamma, \Delta \rangle$ . Συνεπώς έχουμε

$$\dim_{\mathbb{R}} \langle A, B, \Gamma, \Delta \rangle = \dim_{\mathbb{R}} \langle B, \Gamma, \Delta \rangle = 3$$

Στη συνέχεια θέλουμε να συμπληρώσουμε τη παραπάνω βάση του υπόχωρου  $\langle B, \Gamma, \Delta \rangle$  σε μια βάση του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Επομένως, χρειαζόμαστε άρτην ένα πίνακα  $X$  έτσι ώστε το σύνολο  $\{X, B, \Gamma, \Delta\}$  να είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Θεωρούμε το πίνακα  $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  και έστω  $\lambda_1 X + \lambda_2 B + \lambda_3 \Gamma + \lambda_4 \Delta = 0$  με  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ . Τότε

$$\lambda_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \lambda_3 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \lambda_4 \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

και άρα

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \\ \lambda_2 - \lambda_3 + 3\lambda_4 = 0 \\ 2\lambda_2 - \lambda_3 + 3\lambda_4 = 0 \\ 3\lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0 \end{cases}$$

Από τη δεύτερη και τρίτη εξίσωση βρίσκουμε ότι  $\lambda_2 = 0$ . Αντικαθιστώντας στην τελευταία έχουμε  $\lambda_3 + \lambda_4 = 0$  και άρα από την πρώτη έπεται ότι  $\lambda_1 = 0$ . Συνεπώς έχουμε ότι  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 0$  και άρα το σύνολο  $\{X, B, \Gamma, \Delta\}$  αποτελεί βάση του  $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 42.** Έστω  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5\}$  μια βάση του διανυσματικού χώρου  $\mathcal{E}$ . Να βρεθεί η διάσταση  $\dim_{\mathbb{K}} \langle \vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3, \vec{A}_4 \rangle$  του υπόχωρου ο οποίος παράγεται από τα διανύσματα

$$\begin{aligned} \vec{A}_1 &= \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3 + 3\vec{e}_4 + \vec{e}_5, \\ \vec{A}_2 &= 2\vec{e}_1 + 5\vec{e}_2 - 3\vec{e}_3 + 4\vec{e}_4 + 8\vec{e}_5, \\ \vec{A}_3 &= 6\vec{e}_1 + 17\vec{e}_2 - 7\vec{e}_3 + 10\vec{e}_4 + 22\vec{e}_5, \\ \vec{A}_4 &= \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - 3\vec{e}_3 + 2\vec{e}_4. \end{aligned}$$

**Λύση.** Έχουμε

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 4 & 8 \\ 6 & 17 & -7 & 10 & 22 \\ 1 & 3 & -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} &\xrightarrow[\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - 6\Gamma_1]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 17 & -8 & 16 \\ 1 & 3 & -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - \Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -2 & 6 \\ 0 & 5 & 17 & -8 & 16 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - \Gamma_2]{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - 5\Gamma_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & -8 & 2 & -14 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & -7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - \frac{1}{2}\Gamma_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 5 & -2 & 6 \\ 0 & 0 & -8 & 2 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ο τελευταίος πίνακας περιγράφει τις συνιστώσες των διανυσμάτων  $\vec{A}'_1, \vec{A}'_2, \vec{A}'_3$  τα οποία προέκυψαν από τα  $\vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3, \vec{A}_4$  με χρήση πράξεων επί των συνιστωσών τους στη βάση  $\mathcal{B}$ :

(1) Οι δύο πρώτες γραμμοπράξεις μας ορίζουν τα διανύσματα:

$$\vec{A}'_2 = \vec{A}_2 - 2\vec{A}_1 = \vec{e}_2 + 5\vec{e}_3 - 2\vec{e}_4 + 6\vec{e}_5 \quad \text{και} \quad \vec{A}'_3 = \vec{A}_3 - 6\vec{A}_1 = 5\vec{e}_2 + 17\vec{e}_3 - 8\vec{e}_4 + 16\vec{e}_5$$

(2) Η τρίτη γραμμοπράξη μας ορίζει το διάνυσμα

$$\vec{A}'_4 = \vec{A}_4 - \vec{A}_1 = \vec{e}_2 + 1\vec{e}_3 - \vec{e}_4 - \vec{e}_5$$

(3) Η τέταρτη και η πέμπτη γραμμοπράξη μας ορίζουν τα διανύσματα

$$\vec{A}_3'' = \vec{A}_3' - 5\vec{A}_2' = -8\vec{e}_3 + 2\vec{e}_4 - 14\vec{e}_5 \quad \text{και} \quad \vec{A}_4'' = \vec{A}_4' - \vec{A}_2' = -4\vec{e}_3 + \vec{e}_4 - 7\vec{e}_5$$

(4) Η έκτη γραμμοπράξη μας ορίζει το διάνυσμα

$$\vec{A}_4''' = \vec{A}_4'' - \frac{1}{2}\vec{A}_3'' = \vec{0}$$

Επομένως επειδή τα διανύσματα  $\vec{A}_1, \vec{A}_2', \vec{A}_3''$  προέκυψαν ως γραμμικοί συνδυασμοί των διανυσμάτων  $\vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3, \vec{A}_4$ , έπεται άμεσα ότι θα παράγουν τον ίδιο υπόχωρο:

$$\langle \vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3, \vec{A}_4 \rangle = \langle \vec{A}_1, \vec{A}_2', \vec{A}_3'' \rangle$$

όπου:

$$\vec{A}_1 = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3 + 3\vec{e}_4 + \vec{e}_5, \quad \vec{A}_2' = \vec{e}_2 + 5\vec{e}_3 - 2\vec{e}_4 + 6\vec{e}_5, \quad \vec{A}_3'' = -8\vec{e}_3 + 2\vec{e}_4 - 14\vec{e}_5$$

Έστω  $\lambda_1\vec{A}_1 + \lambda_2\vec{A}_2' + \lambda_3\vec{A}_3'' = \vec{0}$  με  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ . Τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} \lambda_1(\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 - 4\vec{e}_3 + 3\vec{e}_4 + \vec{e}_5) + \lambda_2(\vec{e}_2 + 5\vec{e}_3 - 2\vec{e}_4 + 6\vec{e}_5) + \lambda_3(-8\vec{e}_3 + 2\vec{e}_4 - 14\vec{e}_5) &= \vec{0} \\ \Rightarrow \lambda_1\vec{e}_1 + (2\lambda_1 + \lambda_2)\vec{e}_2 + (-4\lambda_1 + 5\lambda_2 - 8\lambda_3)\vec{e}_3 + (3\lambda_1 - 2\lambda_2 + 2\lambda_3)\vec{e}_4 + (\lambda_1 + 6\lambda_2 - 14\lambda_3)\vec{e}_5 &= \vec{0} \end{aligned}$$

και αφού το σύνολο  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5\}$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$  έπεται ότι

$$\lambda_1 = 0, \quad 2\lambda_1 + \lambda_2 = 0, \quad -4\lambda_1 + 5\lambda_2 - 8\lambda_3 = 0, \quad 3\lambda_1 - 2\lambda_2 + 2\lambda_3 = 0, \quad \lambda_1 + 6\lambda_2 - 14\lambda_3 = 0.$$

Από τις παραπάνω σχέσεις έχουμε ότι  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$  και επομένως τα διανύσματα  $\vec{A}_1, \vec{A}_2', \vec{A}_3''$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Συνεπώς, το σύνολο  $\{\vec{A}_1, \vec{A}_2', \vec{A}_3''\}$  είναι βάση του υπόχωρου  $\langle \vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3, \vec{A}_4 \rangle$  και άρα

$$\dim_{\mathbb{R}} \langle \vec{A}_1, \vec{A}_2, \vec{A}_3, \vec{A}_4 \rangle = \dim_{\mathbb{R}} \langle \vec{A}_1, \vec{A}_2', \vec{A}_3'' \rangle = 3 \quad \square$$

#### 48. Φυλλάδιο 8 - 6/2/2012

**Λυμένη Άσκηση 43.** Έστω η γραμμική απεικόνιση  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  η οποία ορίζεται από τη σχέση:

$$f(x, y, z) = (x + 2y, y - z, 2x + 4y)$$

Να υπολογιστεί μια βάση του πυρήνα  $\text{Ker}(f)$  και μια βάση της εικόνας  $\text{Im}(f)$  της  $f$ .

**Λύση.** Έστω  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Τότε:  $(x, y, z) \in \text{Ker } f$  αν και μόνον αν:

$$f(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff (x + 2y, y - z, 2x + 4y) = (0, 0, 0) \iff x = -2y \quad \text{και} \quad y = z$$

Συνεπώς ο πυρήνας της  $f$  είναι

$$\begin{aligned} \text{Ker } f &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid f(x, y, z) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = -2y \quad \text{και} \quad y = z\} \\ &= \{(-2y, y, y) \in \mathbb{R}^3 \mid y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(-2, 1, 1) \in \mathbb{R}^3 \mid y \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (-2, 1, 1) \rangle \end{aligned}$$

και αφού  $(-2, 1, 1) \neq (0, 0, 0)$  έπεται ότι το διάνυσμα  $(-2, 1, 1)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Επομένως το σύνολο  $\{(-2, 1, 1)\}$  αποτελεί βάση του  $\text{Ker } f$ .

Επειδή το σύνολο  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ , ως βάση του  $\mathbb{R}^3$ , παράγει τον  $\mathbb{R}^3$ , έπεται ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), f(\vec{e}_3)\}$  παράγει την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ . Έτσι:

$$\text{Im } f = \langle f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1) \rangle = \langle (1, 0, 2), (2, 1, 4), (0, -1, 0) \rangle$$

και

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - 2\Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 + \Gamma_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Συνεπώς

$$\text{Im } f = \langle (1, 0, 2), (2, 1, 4), (0, -1, 0) \rangle = \langle (1, 0, 2), (0, 1, 0) \rangle$$

Διαφορετικά: εξετάζουμε αν τα παραπάνω διανύσματα είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Έστω

$$\kappa(1, 0, 2) + \lambda(2, 1, 4) + \mu(0, -1, 0) = (0, 0, 0) \Rightarrow \kappa + 2\lambda = 0 \text{ και } \lambda - \mu = 0$$

Το σύστημα αυτό έχει ως γενική λύση:  $(-2\lambda, \lambda, \lambda)$  και επομένως, για  $\lambda = 1$ , θα έχουμε μια σχέση γραμμικής εξάρτησης:

$$-2(1, 0, 2) + (2, 1, 4) + (0, -1, 0) = (0, 0, 0)$$

από την οποία βλέπουμε ότι  $(2, 1, 4) \in \langle (1, 0, 2), (0, 1, 0) \rangle$  και άρα όπως και παραπάνω έχουμε:  $\text{Im } f = \langle (1, 0, 2), (2, 1, 4), (0, -1, 0) \rangle = \langle (1, 0, 2), (0, 1, 0) \rangle$ .

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι τα διανύσματα  $(1, 0, 2), (0, 1, 0)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Άρα το σύνολο  $\{(1, 0, 2), (0, 1, 0)\}$  αποτελεί βάση της εικόνας  $\text{Im } f$  της  $f$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 44.** Να εξεταστεί αν η γραμμική απεικόνιση

$$f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, x_1 + x_2, \dots, x_1 + x_2 + \dots + x_n)$$

είναι ισομορφισμός.

**Λύση.** Για να είναι η γραμμική απεικόνιση  $f$  ισομορφισμός πρέπει να είναι μονομορφισμός και επιμορφισμός. Δηλαδή πρέπει  $\text{Ker } f = \{0\}$  και  $\text{Im } f = \mathbb{R}^n$ . Έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{Ker } f &= \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid f(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0)\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid (x_1, x_1 + x_2, \dots, x_1 + x_2 + \dots + x_n) = (0, 0, \dots, 0)\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = 0, x_1 + x_2 = 0, \dots, x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\} \\ &= \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0\} \\ &= \{(0, \dots, 0)\} \end{aligned}$$

και άρα η γραμμική απεικόνιση  $f$  είναι μονομορφισμός. Έστω  $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$ . Τότε υπάρχει το διάνυσμα  $(y_1, y_2 - y_1, y_3 - y_2, \dots, y_n - y_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$  έτσι ώστε

$$\begin{aligned} f(y_1, y_2 - y_1, y_3 - y_2, \dots, y_n - y_{n-1}) &= (y_1, y_1 + y_2 - y_1, \dots, y_1 + y_2 - y_1 + y_3 - y_2 + \dots + y_n - y_{n-1}) \\ &= (y_1, y_2, \dots, y_n) \end{aligned}$$

και άρα η  $f$  είναι επιμορφισμός. Συνεπώς, η γραμμική απεικόνιση  $f$  είναι ισομορφισμός.  $\square$

**Παρατήρηση 4.** Έστω  $\mathcal{E}$  και  $\mathcal{F}$  δυο  $\mathbb{K}$ -διανυσματικοί χώροι πεπερασμένης διάστασης και έστω  $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$  μια γραμμική απεικόνιση. Τότε έχουμε την Θεμελιώδη Εξίσωση των Διαστάσεων:

$$\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f + \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f$$

Ας υποθέσουμε ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$ . Τότε έχουμε τα ακόλουθα:

(1) Αν η  $f$  είναι μονομορφισμός, τότε η  $f$  είναι ισομορφισμός.

Αφού η  $f$  είναι μονομορφισμός έχουμε  $\text{Ker } f = \{\vec{0}\}$  και άρα  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f = 0$ . Επομένως από την εξίσωση των διαστάσεων έχουμε ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f$ . Άρα έχουμε

$$\begin{cases} \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f \\ \text{Im } f : \text{ υπόχωρος του } \mathcal{F} \end{cases} \implies \text{Im } f = \mathcal{F} \implies f : \text{ επιμορφισμός}$$

Συνεπώς η γραμμική απεικόνιση  $f$  είναι ισομορφισμός.

(2) Αν η  $f$  είναι επιμορφισμός, τότε η  $f$  είναι ισομορφισμός.

Αφού η  $f$  είναι επιμορφισμός έχουμε  $\text{Im } f = \mathcal{F}$  και άρα  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$ . Άρα από την εξίσωση των διαστάσεων έχουμε ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f + \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$  και  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$ . Επομένως  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f = 0$ , δηλαδή  $\text{Ker } f = \{\vec{0}\}$ . Άρα η  $f$  είναι μονομορφισμός και άρα ισομορφισμός.

Επομένως στην προηγούμενη άσκηση αρκεί να δείξουμε ότι η  $f$  είναι είτε μονομορφισμός ή επιμορφισμός. Τότε έπεται ότι η  $f$  είναι ισομορφισμός.

**Λυμένη Άσκηση 45.** Έστω  $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$  μια γραμμική απεικόνιση, όπου ο  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος  $\mathcal{E}$  έχει πεπερασμένη διάσταση.

(1) Να δείξετε ότι η  $f$  είναι μονομορφισμός αν και μόνον αν η  $f$  στέλνει γραμμικά ανεξάρτητα σύνολα διανυσμάτων σε γραμμικά ανεξάρτητα σύνολα διανυσμάτων:

$$\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k\} : \text{ γραμμικά ανεξάρτητο σύνολο } \implies$$

$$f(\mathcal{C}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_k)\} : \text{ γραμμικά ανεξάρτητο σύνολο}$$

(2) Να δείξετε ότι η  $f$  είναι ισομορφισμός αν και μόνον αν η  $f$  στέλνει τυχούσα βάση του  $\mathcal{E}$  σε βάση του  $\mathcal{E}$ :

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\} : \text{ βάση του } \mathcal{E} \implies f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n)\} : \text{ βάση του } \mathcal{E}$$

**Λύση.** (1) ( $\implies$ ) Υποθέτουμε ότι η γραμμική απεικόνιση  $f$  είναι μονομορφισμός και έστω  $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k\}$  ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων. Θα δείξουμε ότι το σύνολο  $f(\mathcal{C}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_k)\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Έστω

$$\begin{aligned} \lambda_1 f(\vec{e}_1) + \dots + \lambda_k f(\vec{e}_k) &= \vec{0} \\ \implies f(\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_k \vec{e}_k) &= \vec{0} && f : \text{ γραμμική} \\ \implies \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_k \vec{e}_k &\in \text{Ker } f = \{\vec{0}\} && f : \text{ μονομορφισμός} \\ \implies \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_k \vec{e}_k &= 0 && \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k\} : \text{ γραμμικά ανεξάρτητο} \\ \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_k &= 0 \end{aligned}$$

Άρα το σύνολο  $f(\mathcal{C}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_k)\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

( $\impliedby$ ) Υποθέτουμε ότι η  $f$  στέλνει γραμμικά ανεξάρτητα σύνολα διανυσμάτων σε γραμμικά ανεξάρτητα σύνολα διανυσμάτων, δηλαδή αν  $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_k\}$  είναι ένα σύνολο γραμμικά ανεξάρτητων διανυσμάτων τότε το σύνολο  $f(\mathcal{C}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_k)\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Θα δείξουμε ότι η  $f$  είναι μονομορφισμός. Έστω  $\vec{x} \in \text{Ker } f$ , δηλαδή  $f(\vec{x}) = \vec{0}$ . Αν το διάνυσμα  $\vec{x} \neq \vec{0}$  τότε το σύνολο  $\{\vec{x}\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα από την υπόθεση έπεται ότι το σύνολο  $\{f(\vec{x})\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα  $f(\vec{x}) \neq 0$ . Αυτό όμως είναι άτοπο διότι το διάνυσμα  $\vec{x} \in \text{Ker } f$ . Άρα δείξαμε ότι αν  $\vec{x} \in \text{Ker } f$  τότε  $\vec{x} = \vec{0}$ . Συνεπώς  $\text{Ker } f = \{\vec{0}\}$ , δηλαδή η  $f$  είναι μονομορφισμός.

(2) ( $\implies$ ) Υποθέτουμε ότι η γραμμική απεικόνιση  $f$  είναι ισομορφισμός, δηλαδή η  $f$  είναι μονομορφισμός και επιμορφισμός. Έστω  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  μια βάση του  $\mathcal{E}$ . Θα δείξουμε ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n)\}$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$ . Αφού η  $f$  είναι μονομορφισμός, έπεται από το (1) παραπάνω ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B})$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Έστω  $y \in \mathcal{E}$ . Τότε αφού η  $f$  είναι επιμορφισμός υπάρχει

ένα  $\vec{x} \in \mathcal{E}$  έτσι ώστε  $f(\vec{x}) = \vec{y}$ . Το σύνολο  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$ , άρα το  $\vec{x}$  γράφεται  $\vec{x} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n$ . Τότε

$$\begin{aligned}\vec{y} &= f(\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n) = \lambda_1 f(\vec{e}_1) + \dots + \lambda_n f(\vec{e}_n) \\ \Rightarrow \vec{y} &\in \langle f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n) \rangle \\ \Rightarrow \mathcal{E} &= \langle f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n) \rangle = \langle f(\mathcal{B}) \rangle\end{aligned}$$

και άρα δείξαμε ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B})$  παράγει τον  $\mathcal{E}$ . Επομένως το σύνολο  $f(\mathcal{B})$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$ .

*Διαφορετικά:* έχοντας δείξει ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B})$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο, θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B})$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$  ως εξής: Επειδή  $f$  είναι ισομορφισμός, έπεται ότι:  $n = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$ . Από την άλλη πλευρά  $|f(\mathcal{B})| = n$  (διότι διαφορετικά υπάρχουν  $1 \leq i \neq j \leq n$  έτσι ώστε:  $f(\vec{e}_i) = f(\vec{e}_j)$ ). Τότε όμως  $\vec{e}_i = \vec{e}_j$  επειδή η  $f$  είναι μονομορφισμός, κάτι το οποίο είναι άτοπο διότι το  $\mathcal{B}$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$ ). Από γνωστό Θεώρημα:  $f(\mathcal{B})$  γραμμικά ανεξάρτητο και  $|f(\mathcal{B})| = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F} \Rightarrow f(\mathcal{B})$  είναι βάση του  $\mathcal{F}$ .

( $\Leftarrow$ ) Υποθέτουμε ότι αν  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$  είναι μια βάση του  $\mathcal{E}$  τότε το σύνολο  $f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n)\}$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$ . Θα δείξουμε ότι η  $f$  είναι ισομορφισμός.

*f μονομορφισμός:* Έστω  $\vec{x} \in \text{Ker } f$  και  $\vec{x} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n$ . Τότε:

$$\begin{aligned}f(\vec{x}) = \vec{0} &\Rightarrow f(\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n) = \vec{0} \\ \Rightarrow \lambda_1 f(\vec{e}_1) + \dots + \lambda_n f(\vec{e}_n) &= \vec{0} && f: \text{ γραμμική} \\ \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0 &&& \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n)\}: \text{ γραμμικά ανεξάρτητο} \\ \Rightarrow \vec{x} &= \vec{0} \\ \Rightarrow \text{Ker } f &= \vec{0} \\ \Rightarrow f &: \text{ μονομορφισμός}\end{aligned}$$

*f επιμορφισμός:* Έστω  $\vec{y} \in \mathcal{E}$ . Αφού το σύνολο  $f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), \dots, f(\vec{e}_n)\}$  είναι βάση του  $\mathcal{E}$ , τότε

$$\vec{y} = \lambda_1 f(\vec{e}_1) + \dots + \lambda_n f(\vec{e}_n) = f(\lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n) = f(\vec{x})$$

όπου  $\vec{x} = \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \lambda_n \vec{e}_n \in \mathcal{E}$ . Συνεπώς η  $f$  είναι επιμορφισμός.

Επομένως έχουμε ότι η  $f$  είναι ισομορφισμός.

*Διαφορετικά:* έχοντας δείξει ότι η  $f$  είναι μονομορφισμός, θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι η  $f$  είναι επιμορφισμός ως εξής: Επειδή το σύνολο  $f(\mathcal{B})$  είναι βάση του  $\mathcal{F}$  έπεται ότι:  $n = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$ . Από την άλλη πλευρά η Θεμελιώδης Εξίσωση Διαστάσεων δίνει ότι:  $n = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f$ . Επειδή  $\text{Im } f$  είναι υπόχωρος του  $\mathcal{F}$  και  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$ , από γνωστό Θεώρημα έπεται ότι  $\text{Im } f = \mathcal{F}$ , δηλαδή η  $f$  είναι επιμορφισμός.  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 46.** Να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της γραμμικής απεικόνισης:

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (x + 2y, y - x, x + 2z)$$

**Λύση.** Έστω  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Τότε:  $(x, y, z) \in \text{Ker } f$  αν και μόνον αν:

$$f(x, y, z) = (0, 0, 0) \iff (x + 2y, y - x, x + 2z) = (0, 0, 0) \iff x = y = z = 0$$

Συνεπώς  $\text{Ker } f = \{\vec{0}\}$  και άρα η  $f$  είναι μονομορφισμός και άρα το κενό σύνολο  $\{\emptyset\}$  είναι βάση του πυρήνα  $\text{Ker } f$  της  $f$ .

Επειδή το σύνολο  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$ , ως βάση του  $\mathbb{R}^3$ , παράγει τον  $\mathbb{R}^3$ , έπεται ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), f(\vec{e}_3)\}$  παράγει την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ . Έτσι:

$$\text{Im } f = \langle f(1, 0, 0), f(0, 1, 0), f(0, 0, 1) \rangle = \langle (1, -1, 1), (2, 1, 0), (0, 0, 2) \rangle$$

και

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 6 \neq 0$$

και άρα τα διανύσματα  $(1, -1, 1), (2, 1, 0), (0, 0, 2)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Επομένως, το σύνολο των διανυσμάτων  $\{(1, -1, 1), (2, 1, 0), (0, 0, 2)\}$  αποτελεί βάση της εικόνας  $\text{Im } f$  της  $f$ . Να σημειώσουμε ότι από την Παρατήρηση 1 έπεται ότι η  $f$  είναι ισομορφισμός.  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 47.** Θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση:

$$f: \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z, w) = (x - z + 2w, -2x + y + 2z, y + 4w)$$

- (1) Να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ .
- (2) Ναδειχθεί ότι το διάνυσμα  $(1, 3, \kappa) \in \text{Im } f \Leftrightarrow \kappa = 5$ .
- (3) Ποια συνθήκη πρέπει να ικανοποιούν τα  $a, b \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε  $(1, a, 1, b) \in \text{Ker } f$ ;

**Λύση.** (1) Έστω  $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$ . Τότε:  $(x, y, z, w) \in \text{Ker } f$  αν και μόνον αν:

$$f(x, y, z, w) = (0, 0, 0) \iff (x - z + 2w, -2x + y + 2z, y + 4w) = (0, 0, 0) \iff \begin{cases} x - z + 2w = 0 \\ -2x + y + 2z = 0 \\ y + 4w = 0 \end{cases}$$

και

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 + 2\Gamma_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

και άρα καταλήγουμε στο σύστημα:

$$\begin{cases} x - z + 2w = 0 \\ y + 4w = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = z - 2w \\ y = -4w \end{cases}$$

Συνεπώς ο πυρήνας της  $f$  είναι

$$\begin{aligned} \text{Ker } f &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid f(x, y, z, w) = (0, 0, 0)\} \\ &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x = z - 2w \text{ και } y = -4w\} \\ &= \{(z - 2w, -4w, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid z, w \in \mathbb{R}\} \\ &= \{z(1, 0, 1, 0) + w(-2, -4, 0, 1) \in \mathbb{R}^4 \mid z, w \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0, 1, 0), (-2, -4, 0, 1) \rangle \end{aligned}$$

Έστω  $\lambda_1(1, 0, 1, 0) + \lambda_2(-2, -4, 0, 1) = (0, 0, 0, 0)$ . Τότε

$$(\lambda_1 - 2\lambda_2, -4\lambda_2, \lambda_1, \lambda_2) = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

και άρα τα διανύσματα  $(1, 0, 1, 0), (-2, -4, 0, 1)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Επομένως το σύνολο  $\{(1, 0, 1, 0), (-2, -4, 0, 1)\}$  αποτελεί βάση του  $\text{Ker } f$ .

Επειδή το σύνολο  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1, 0), \vec{e}_4 = (0, 0, 0, 1)\}$ , ως βάση του  $\mathbb{R}^4$ , παράγει τον  $\mathbb{R}^4$ , έπεται ότι το σύνολο  $f(\mathcal{B}) = \{f(\vec{e}_1), f(\vec{e}_2), f(\vec{e}_3), f(\vec{e}_4)\}$  παράγει την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ . Έτσι:

$$\begin{aligned}\text{Im } f &= \langle f(1, 0, 0, 0), f(0, 1, 0, 0), f(0, 0, 1, 0), f(0, 0, 0, 1) \rangle \\ &= \langle (1, -2, 0), (0, 1, 1), (-1, 2, 0), (2, 0, 4) \rangle \\ &= \langle (1, -2, 0), (0, 1, 1), (2, 0, 4) \rangle\end{aligned}$$

Έστω  $\kappa(1, -2, 0) + \lambda(0, 1, 1) + \mu(2, 0, 4) = (0, 0, 0)$ . Τότε

$$(\kappa + 2\mu, -2\kappa + \lambda, \lambda + 4\mu) = (0, 0, 0) \Rightarrow \begin{cases} \kappa + 2\mu = 0 \\ -2\kappa + \lambda = 0 \\ \lambda + 4\mu = 0 \end{cases} \Rightarrow \kappa = -2\mu \text{ και } \lambda = -4\mu$$

Το σύστημα αυτό έχει ως γενική λύση:  $(-2\mu, -4\mu, \mu)$  όπου  $\mu \in \mathbb{R}$  και επομένως, για  $\mu = 1$ , θα έχουμε μια σχέση γραμμικής εξάρτησης:

$$-2(1, -2, 0) - 4(0, 1, 1) + (2, 0, 4) = (0, 0, 0) \Rightarrow (2, 0, 4) \in \langle (1, -2, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

Συνεπώς

$$\text{Im } f = \langle (1, -2, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

και εύκολα διαπιστώνουμε ότι τα διανύσματα  $(1, -2, 0), (0, 1, 1)$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Άρα το σύνολο  $\{(1, -2, 0), (0, 1, 1)\}$  αποτελεί βάση της εικόνας  $\text{Im } f$  της  $f$ .

- (2) Από το προηγούμενο ερώτημα γνωρίζουμε ότι το σύνολο  $\{(1, -2, 0), (0, 1, 1)\}$  αποτελεί βάση της εικόνας  $\text{Im } f$  της  $f$ . Συνεπώς το διάνυσμα  $(1, 3, \kappa) \in \text{Im } f$  αν και μόνο αν υπάρχουν  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε

$$\lambda_1(1, -2, 0) + \lambda_2(0, 1, 1) = (1, 3, \kappa) \Rightarrow (\lambda_1, -2\lambda_1 + \lambda_2, \lambda_2) = (1, 3, \kappa)$$

Άρα έχουμε  $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \kappa$  και

$$-2\lambda_1 + \lambda_2 = 3 \Rightarrow \lambda_2 = 3 + 2\lambda_1 = 5 \Rightarrow \kappa = 5$$

Επομένως δείξαμε ότι  $(1, 3, \kappa) \in \text{Im } f$  αν και μόνο αν  $\kappa = 5$ .

- (3) Από το ερώτημα (1) γνωρίζουμε ότι το σύνολο  $\{(1, 0, 1, 0), (-2, -4, 0, 1)\}$  αποτελεί βάση του  $\text{Ker } f$ . Επομένως το διάνυσμα  $(1, a, 1, b) \in \text{Ker } f$  αν και μόνο αν υπάρχουν  $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$  έτσι ώστε

$$\begin{aligned}\lambda_1(1, 0, 1, 0) + \lambda_2(-2, -4, 0, 1) &= (1, a, 1, b) \Rightarrow (\lambda_1 - 2\lambda_2, -4\lambda_2, \lambda_1, \lambda_2) = (1, a, 1, b) \\ &\Rightarrow a = b = 0\end{aligned}$$

Άρα για  $a = b = 0$  το διάνυσμα  $(1, a, 1, b) \in \text{Ker } f$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 48.** Έστω  $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$  μια γραμμική απεικόνιση, όπου  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} < \infty$ . Έστω ότι  $f^n = \vec{0}$  και  $f^{n-1} \neq 0$ . Αν  $\vec{x} \in \mathcal{E}$ , να δείξετε ότι  $f^{n-1}(\vec{x}) \neq \vec{0}$  αν και μόνο αν το σύνολο

$$\{\vec{x}, f(\vec{x}), \dots, f^{n-1}(\vec{x})\}$$

είναι γραμμικά ανεξάρτητο.

**Λύση.** Αν το σύνολο  $\{\vec{x}, f(\vec{x}), \dots, f^{n-1}(\vec{x})\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο τότε έχουμε ότι  $f^{n-1}(\vec{x}) \neq \vec{0}$ .

Έστω  $\vec{x} \in \mathcal{E}$  έτσι ώστε  $f^{n-1}(\vec{x}) \neq \vec{0}$ . Θα δείξουμε ότι το σύνολο  $\{\vec{x}, f(\vec{x}), \dots, f^{n-1}(\vec{x})\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο. Έστω  $\lambda_0\vec{x} + \lambda_1f(\vec{x}) + \dots + \lambda_{n-1}f^{n-1}(\vec{x}) = \vec{0}$ . Εφαρμόζοντας διαδοχικά την  $f$  στην παραπάνω σχέση και λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι  $f^n = 0$  και  $f^{n-1}(\vec{x}) \neq \vec{0}$ , θα έχουμε:



$$\begin{aligned}
& \lambda_0 \vec{x} + \lambda_1 f(\vec{x}) + \cdots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(\vec{x}) = \vec{0} & (*) \\
\Rightarrow & \lambda_0 f(\vec{x}) + \lambda_1 f^2(\vec{x}) + \cdots + \lambda_{n-2} f^{n-1}(\vec{x}) + \lambda_{n-1} f^n(\vec{x}) = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f(\vec{x}) + \lambda_1 f^2(\vec{x}) + \cdots + \lambda_{n-2} f^{n-1}(\vec{x}) + \vec{0} = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^2(\vec{x}) + \lambda_1 f^3(\vec{x}) + \cdots + \lambda_{n-3} f^{n-1}(\vec{x}) + \lambda_{n-2} f^n(\vec{x}) = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^2(\vec{x}) + \lambda_1 f^3(\vec{x}) + \cdots + \lambda_{n-3} f^{n-1}(\vec{x}) + \vec{0} = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^3(\vec{x}) + \lambda_1 f^4(\vec{x}) + \cdots + \lambda_{n-4} f^{n-1}(\vec{x}) + \lambda_{n-3} f^n(\vec{x}) = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^3(\vec{x}) + \lambda_1 f^4(\vec{x}) + \cdots + \lambda_{n-4} f^{n-1}(\vec{x}) + \vec{0} = \vec{0} \\
& \vdots \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^{n-2}(\vec{x}) + \lambda_1 f^{n-1}(\vec{x}) + \lambda_2 f^n(\vec{x}) = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^{n-2}(\vec{x}) + \lambda_1 f^{n-1}(\vec{x}) + \vec{0} = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^{n-1}(\vec{x}) + \lambda_1 f^n(\vec{x}) = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^{n-1}(\vec{x}) + \vec{0} = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 f^{n-1}(\vec{x}) = \vec{0} \\
\Rightarrow & \lambda_0 = 0 \text{ αφού } f^{n-1}(\vec{x}) \neq \vec{0}
\end{aligned}$$

Άρα από τη σχέση (\*) έχουμε

$$\lambda_1 f(\vec{x}) + \cdots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(\vec{x}) = \vec{0}$$

και αν επαναλάβουμε ξανά την παραπάνω διαδικασία τότε

$$\begin{cases} \lambda_1 f^{n-1}(\vec{x}) = \vec{0} \\ f^{n-1}(\vec{x}) \neq \vec{0} \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = 0$$

Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο έπεται ότι  $\lambda_1 = \cdots = \lambda_{n-1} = 0$  και άρα το σύνολο  $\{\vec{x}, f(\vec{x}), \dots, f^{n-1}(\vec{x})\}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο.  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 49.** Θεωρούμε τον  $2 \times 2$  πίνακα πραγματικών αριθμών

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

και έστω η γραμμική απεικόνιση

$$f: M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R}), \quad f(M) = AM - MA$$

Να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ .

**Λύση.** Έστω  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ . Τότε

$$\begin{aligned}
f(M) = AM - MA \Rightarrow f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} a & b \\ -a+c & -b+d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a-b & b \\ c-d & d \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} b & 0 \\ -a+d & -b \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Τότε:  $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \text{Ker } f$  αν και μόνον αν:

$$f(M) = 0 \iff \begin{pmatrix} b & 0 \\ -a+d & -b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} b = 0 \\ a = d \end{cases}$$

και άρα ο πυρήνας της  $f$  είναι

$$\begin{aligned} \text{Ker } f &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid b = 0 \text{ και } a = d \right\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ c & a \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a, c \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle \end{aligned}$$

Θέτουμε  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  και  $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Εύκολα διαπιστώνουμε ότι τα διανύσματα  $A, B$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα και άρα το σύνολο  $\{A, B\}$  είναι βάση του πυρήνα  $\text{Ker } f$  της  $f$ . Για την εικόνα της  $f$  έχουμε:

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

και άρα

$$\text{Im } f = \left\langle \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

Θέτουμε  $\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  και  $\Delta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ . Τότε αφού τα διανύσματα  $\Gamma, \Delta$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα, έπεται ότι το σύνολο  $\{\Gamma, \Delta\}$  είναι βάση της εικόνας  $\text{Im } f$  της  $f$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 50.** Θεωρούμε τη βάση

$$\mathcal{B} := \{\vec{e}_1 = 1, \vec{e}_2 = t, \vec{e}_3 = t^2\}$$

του  $\mathbb{R}_2[t]$  και τα διανύσματα

$$\vec{w}_1 = 1 + t, \quad \vec{w}_2 = 3 - t^2, \quad \vec{w}_3 = 4 + 2t - 3t^2$$

του  $\mathbb{R}_2[t]$ . Να προσδιοριστεί η μοναδική γραμμική απεικόνιση  $f: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t]$  έτσι ώστε:  $f(\vec{e}_i) = \vec{w}_i$ ,  $1 \leq i \leq 3$ . Ακολουθώντας να εξετασθεί αν η  $f$  είναι ισομορφισμός. Αν η  $f$  δεν είναι ισομορφισμός να βρεθούν βάσεις για τον πυρήνα  $\text{Ker } f$  και την εικόνα  $\text{Im } f$  της  $f$ .

**Λύση.** Έστω  $P(t) = a + bt + ct^2 \in \mathbb{R}_2[t]$ . Τότε έχουμε

$$\begin{aligned} f(a + bt + ct^2) &= af(1) + bf(t) + cf(t^2) \\ &= a(1 + t) + b(3 - t^2) + c(4 + 2t - 3t^2) \\ &= a + at + 3b - bt^2 + 4c + 2ct - 3ct^2 \\ &= (a + 3b + 4c) + (a + 2c)t + (-b - 3c)t^2 \end{aligned}$$

Επομένως η  $f$  ορίζεται ως ακολούθως:

$$f: \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}_2[t], \quad a + bt + ct^2 \mapsto f(a + bt + ct^2) = (a + 3b + 4c) + (a + 2c)t + (-b - 3c)t^2$$

Έστω  $P(t) = a + bt + ct^2 \in \mathbb{R}_2[t]$ . Τότε:  $P(t) \in \text{Ker } f$  αν και μόνον αν:

$$f(P(t)) = 0 \iff (a + 3b + 4c) + (a + 2c)t + (-b - 3c)t^2 = 0 + 0t + 0t^2 \iff \begin{cases} a + 3b + 4c = 0 \\ a + 2c = 0 \\ -b - 3c = 0 \end{cases}$$

Τότε  $b = -3c$ ,  $a = -2c$  και άρα  $-2c + 3(-3c) + 4c = 0 \Rightarrow c = 0$ . Επομένως έχουμε  $a = b = c = 0$ . Συνεπώς ο πυρήνας της  $f$  είναι  $\text{Ker } f = \{\vec{0}\}$  και άρα η γραμμική απεικόνιση  $f$  είναι μονομορφισμός. Από την εξίσωση των διαστάσεων έχουμε:

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_2[t] = \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker } f + \dim_{\mathbb{R}} \text{Im } f &\Rightarrow 3 = 0 + \dim_{\mathbb{R}} \text{Im } f \Rightarrow \begin{cases} \dim_{\mathbb{R}} \text{Im } f = 3 \\ \text{Im } f : \text{ υπόχωρος του } \mathbb{R}_2[t] \end{cases} \\ &\Rightarrow \text{Im } f = \mathbb{R}_2[t] \\ &\Rightarrow f : \text{ επιμορφισμός} \end{aligned}$$

Επομένως η γραμμική απεικόνιση  $f$  είναι ισομορφισμός.  $\square$

#### 49. Φυλλάδιο 9 - 15/2/2012

**Λυμένη Άσκηση 51.** Έστω  $A \in M_{n \times n}(\mathbb{K})$  ένας  $n \times n$  πίνακας και  $\text{adj}(A)$  ο συμπληρωματικός του  $A$ .

- (1)  $\text{adj}(A) = \mathbb{O} \iff \text{r}(A) < n - 1$ .
- (2)  $\text{r}(A) = n \implies \text{r}(\text{adj}(A)) = n$ .
- (3)  $\text{r}(A) < n - 1 \implies \text{r}(\text{adj}(A)) = 0$ .
- (4)  $\text{r}(A) = n - 1 \implies \text{r}(\text{adj}(A)) = 1$ .

**Λύση.** (1) Από τον ορισμό του συμπληρωματικού πίνακα  $\text{adj}(A)$  του  $A$  έχουμε ότι  $\text{adj}(A) = \mathbb{O}$  αν και μόνο αν όλες οι ελάσσονες ορίζουσες τάξης  $n - 1$  είναι ίσες με 0. Επομένως έχουμε ισοδύναμα ότι  $\text{r}(A) < n - 1$  αφού από βασικό Θεώρημα γνωρίζουμε ότι  $\text{r}(A) < k$  αν και μόνο αν υπάρχει ελάσσονα ορίζουσα τάξης  $k \neq 0$  και όλες οι ελάσσονες ορίζουσες τάξης μεγαλύτερης του  $k$  είναι ίσες με 0.

- (2) Έστω  $\text{r}(A) = n$ . Τότε  $|A| \neq 0$ , δηλαδή ο πίνακας  $A$  είναι αντιστρέψιμος. Όμως από την ακόλουθη σχέση:

$$A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I_n = \text{adj}(A) \cdot A$$

έπεται ότι  $|\text{adj}(A)| \neq 0$  και άρα ο  $\text{adj}(A)$  έχει μέγιστη βαθμίδα, δηλαδή:  $\text{r}(\text{adj}(A)) = n$ .

- (3) Αν  $\text{r}(A) < n - 1$  τότε από το (1) έχουμε ότι  $\text{adj}(A) = \mathbb{O}$  και άρα  $\text{r}(\text{adj}(A)) = 0$ .
- (4) Έστω  $\text{r}(A) = n - 1$ . Τότε  $|A| = 0$  αφού  $\text{r}(A) < n$ . Συνεπώς από τη σχέση  $A \cdot \text{adj}(A) = |A| \cdot I_n = \text{adj}(A) \cdot A$  έχουμε

$$A \cdot \text{adj}(A) = 0 = \text{adj}(A) \cdot A \quad (*)$$

Θέτουμε  $B = \text{adj}(A)$  και ορίζουμε τις παρακάτω απεικονίσεις:

$$\mathbb{K}_n \xrightarrow{f_A} \mathbb{K}_n \xrightarrow{f_B} \mathbb{K}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X \quad \text{και} \quad f_B(X) = B \cdot X$$

Τότε

$$\begin{aligned} f_{B \cdot A}(X) &= B \cdot A \cdot X = B \cdot (A \cdot X) = B \cdot (f_A(X)) = f_B(f_A(X)) = (f_B \circ f_A)(X) \\ &\implies f_{B \cdot A} = f_B \circ f_A \end{aligned}$$

και άρα από τη σχέση (\*) έχουμε

$$f_B \circ f_A = 0$$

Έστω  $Y \in \text{Im } f_A$ . Τότε  $Y = f_A(X)$  και από την παραπάνω σχέση έχουμε  $f_B(f_A(X)) = 0$ . Άρα  $Y = f_A(X) \in \text{Ker } f_B$  και επομένως

$$\text{Im } f_A \subseteq \text{Ker } f_B$$

Τότε από την παραπάνω σχέση έχουμε

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f_A &\leq \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f_B = \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}_n - \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f_B \\ \implies \mathbf{r}(A) &\leq n - \mathbf{r}(B) \\ \implies \mathbf{r}(A) + \mathbf{r}(B) &\leq n \\ \implies n - 1 + \mathbf{r}(B) &\leq n \\ \implies \mathbf{r}(B) &\leq 1 \end{aligned}$$

Έστω ότι  $\mathbf{r}(B) = 0$ . Τότε  $B = \text{adj}(A) = \mathbb{O}$  και άρα από το (1) έχουμε  $\mathbf{r}(A) < n - 1$ , που είναι άτοπο. Επομένως  $\mathbf{r}(B) = \mathbf{r}(\text{adj}(A)) = 1$ .  $\square$

Η ιδέα στην απόδειξη του (4) στην Άσκηση 1 είναι η χρήση του εξής γενικότερου αποτελέσματος που αναλύεται στην επόμενη Άσκηση:

**Λυμένη Άσκηση 52.** Έστω οι γραμμικές απεικονίσεις

$$\mathcal{E} \xrightarrow{g} \mathcal{F} \xrightarrow{f} \mathcal{G},$$

μεταξύ  $\mathbb{K}$ -διανυσματικών χώρων πεπερασμένης διάστασης. Αν  $f \circ g = 0$ , τότε:

- (1)  $\text{Im } g \subseteq \text{Ker } f$ .
- (2)  $\mathbf{r}(f) + \mathbf{r}(g) \leq \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$ .
- (3)  $\mathbf{r}(f) + \mathbf{r}(g) = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F}$  αν και μόνον αν  $\text{Im } g = \text{Ker } f$ .

**Λύση.** (1) Έστω  $\vec{y} \in \text{Im } g$ . Τότε  $\vec{y} = g(\vec{x})$  και άρα χρησιμοποιώντας ότι  $f \circ g = 0$ , θα έχουμε  $f(\vec{y}) = f(g(\vec{x})) = \vec{0}$ . Άρα  $\vec{y} \in \text{Ker } f$  και επομένως

$$\text{Im } g \subseteq \text{Ker } f$$

(2) Χρησιμοποιώντας την παραπάνω σχέση έχουμε

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } g &\leq \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F} - \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f \\ \implies \mathbf{r}(g) &\leq \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F} - \mathbf{r}(f) \\ \implies \mathbf{r}(f) + \mathbf{r}(g) &\leq \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{F} \end{aligned}$$

(3) Παρατηρούμε ότι η ανισότητα στο (2) είναι ισότητα αν και μόνον αν  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im } g = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f$ . Επειδή από το (1) ισχύει  $\text{Im } g \subseteq \text{Ker } f$ , αυτό είναι ισοδύναμο με το ότι:  $\text{Im } g = \text{Ker } f$ .

**Λυμένη Άσκηση 53.** Έστω  $f, g : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$  και  $h : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$  γραμμικές απεικονίσεις μεταξύ  $\mathbb{K}$ -διανυσματικών χώρων πεπερασμένης διάστασης, και  $0 \neq k \in \mathbb{K}$ . Να δείξετε ότι:

- (1)  $\mathbf{r}(kf) = \mathbf{r}(f)$ .
- (2)  $|\mathbf{r}(f) - \mathbf{r}(g)| \leq \mathbf{r}(f + g) \leq \mathbf{r}(f) + \mathbf{r}(g)$ .
- (3)  $\mathbf{r}(h \circ f) \leq \min \{ \mathbf{r}(f), \mathbf{r}(h) \}$ .

**Λύση.** (1) Έστω  $\vec{y} \in \text{Im } f$ . Τότε  $\vec{y} = f(\vec{x})$  για κάποιο  $\vec{x} \in \mathcal{E}$ . Αφού  $k \neq 0$  και  $f$  γραμμική έχουμε:

$$\vec{y} = f(\vec{x}) = f(1\vec{x}) = f\left(k \frac{1}{k} \vec{x}\right) = kf\left(\frac{1}{k} \vec{x}\right) \implies \vec{y} \in \text{Im}(kf)$$

Άρα  $\text{Im } f \subseteq \text{Im } (kf)$ . Αντίστροφα, αν  $\vec{y} \in \text{Im } kf$  τότε

$$\vec{y} = (kf)(\vec{x}) = kf(\vec{x}) = f(k\vec{x}) \implies \vec{y} \in \text{Im } f$$

Επομένως έχουμε  $\text{Im } (kf) \subseteq \text{Im } f$  και άρα  $\text{Im } (kf) = \text{Im } f$ . Τότε συνεπάγεται ότι

$$\mathbf{r}(kf) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } (kf) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f = \mathbf{r}(f)$$

και άρα έχουμε το ζητούμενο.

- (2) Έστω  $\vec{y} \in \text{Im } (f + g)$ . Τότε  $\vec{y} = (f + g)(\vec{x}) = f(\vec{x}) + g(\vec{x})$  για κάποιο  $\vec{x} \in \mathcal{E}$  και άρα  $\vec{y} \in \text{Im } f + \text{Im } g$ . Άρα  $\text{Im } (f + g) \subseteq \text{Im } f + \text{Im } g$ . Τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(f + g) &\leq \dim_{\mathbb{K}}(\text{Im } f + \text{Im } g) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } f + \dim_{\mathbb{K}} \text{Im } g - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Im } f \cap \text{Im } g) \\ \implies \mathbf{r}(f + g) &\leq \mathbf{r}(f) + \mathbf{r}(g) - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Im } f \cap \text{Im } g) \\ \implies \mathbf{r}(f + g) &\leq \mathbf{r}(f) + \mathbf{r}(g) \end{aligned} \quad (*)$$

Από τη σχέση (\*) έχουμε

$$\begin{cases} \mathbf{r}(f) = \mathbf{r}((f + g) + (-g)) \leq \mathbf{r}(f + g) + \mathbf{r}(-g) = \mathbf{r}(f + g) + \mathbf{r}(g) \implies \mathbf{r}(f) - \mathbf{r}(g) \leq \mathbf{r}(f + g) \\ \mathbf{r}(g) = \mathbf{r}((f + g) + (-f)) \leq \mathbf{r}(f + g) + \mathbf{r}(-f) = \mathbf{r}(f + g) + \mathbf{r}(f) \implies \mathbf{r}(g) - \mathbf{r}(f) \leq \mathbf{r}(f + g) \end{cases}$$

και άρα

$$|\mathbf{r}(f) - \mathbf{r}(g)| \leq \mathbf{r}(f + g) \quad (**)$$

Από τις σχέσεις (\*) και (\*\*) έπεται ότι  $|\mathbf{r}(f) - \mathbf{r}(g)| \leq \mathbf{r}(f + g) \leq \mathbf{r}(f) + \mathbf{r}(g)$ .

- (3) Αρχικά έχουμε  $\text{Im } (h \circ f) \subseteq \text{Im } h$  και άρα

$$\mathbf{r}(h \circ f) \leq \mathbf{r}(h) \quad (1)$$

Επίσης επειδή, όπως μπορούμε να δούμε εύκολα, ισχύει  $\text{Ker } f \subseteq \text{Ker } (h \circ f)$ , έπεται ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f \leq \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } (h \circ f)$ . Τότε από τις εξισώσεις των διαστάσεων για την  $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$  και την σύνθεση  $h \circ f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G}$  έχουμε:

$$\begin{cases} \dim_{\mathbb{K}} E = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f + \mathbf{r}(f) \\ \dim_{\mathbb{K}} E = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } (h \circ f) + \mathbf{r}(h \circ f) \end{cases} \implies \mathbf{r}(f) - \mathbf{r}(h \circ f) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } (h \circ f) - \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker } f \geq 0$$

$$\implies \mathbf{r}(f) \geq \mathbf{r}(h \circ f) \quad (2)$$

Επομένως από τις σχέσεις (1) και (2) έχουμε:  $\mathbf{r}(h \circ f) \leq \min \{ \mathbf{r}(f), \mathbf{r}(h) \}$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 54.** Να βρεθούν οι τιμές του  $\lambda \in \mathbb{R}$ , για τις οποίες το γραμμικό σύστημα

$$\begin{cases} \lambda x + (3\lambda + 4)y + 2(\lambda + 1)z = 0 \\ \lambda x + (4\lambda + 2)y + (\lambda + 4)z = 0 \\ 2x + (3\lambda + 4)y + 3\lambda z = 0 \end{cases}$$

είναι συμβιβάσιμο, και ακολούθως να ληθεί.

**Λύση.** Ο πίνακας του συστήματος είναι

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 3\lambda + 4 & 2(\lambda + 1) \\ \lambda & 4\lambda + 2 & \lambda + 4 \\ 2 & 3\lambda + 4 & 3\lambda \end{pmatrix}$$

Έχουμε:

$$|A| = \begin{vmatrix} \lambda & 3\lambda + 4 & 2(\lambda + 1) \\ \lambda & 4\lambda + 2 & \lambda + 4 \\ 2 & 3\lambda + 4 & 3\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\Sigma_1 \rightarrow \Sigma_1 + \Sigma_2 + \Sigma_3} \begin{vmatrix} 6\lambda + 6 & 3\lambda + 4 & 2(\lambda + 1) \\ 6\lambda + 6 & 4\lambda + 2 & \lambda + 4 \\ 6\lambda + 6 & 3\lambda + 4 & 3\lambda \end{vmatrix}$$

$$= 6(\lambda + 1) \begin{vmatrix} 1 & 3\lambda + 4 & 2(\lambda + 1) \\ 1 & 4\lambda + 2 & \lambda + 4 \\ 1 & 3\lambda + 4 & 3\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow[\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_1]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_1} 6(\lambda + 1) \begin{vmatrix} 1 & 3\lambda + 4 & 2(\lambda + 1) \\ 0 & \lambda - 2 & -\lambda + 2 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = 6(\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$$

- (1) Για  $\lambda \neq 1$ ,  $\lambda \neq 2$  έχουμε  $|A| \neq 0$  και άρα το σύστημα είναι Cramer. Συνεπώς έχει μοναδική λύση τη μηδενική αφού είναι ομογενές.  
 (2) Έστω  $\lambda = -1$ . Τότε έχουμε το σύστημα:

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} -x + y = 0 \\ -x - 2y + 3z = 0 \\ 2x + y - 3z = 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι  $r(A) = 2$  αφού

$$\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -2 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$$

Συνεπώς το  $(\Sigma)$  είναι ισοδύναμο με το ακόλουθο σύστημα:

$$\begin{cases} -x + y = 0 \\ -x - 2y = -3z \end{cases} \implies x = y = z$$

Θέτουμε  $z = t \in \mathbb{R}$ . Τότε έχουμε τη γενική λύση:

$$\begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}$$

- (3) Έστω  $\lambda = 2$ . Τότε έχουμε το σύστημα:

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} 2x + 10y + 6z = 0 \\ 2x + 10y + 6z = 0 \\ 2x + 10y + 6z = 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 10 & 6 \\ 2 & 10 & 6 \\ 2 & 10 & 6 \end{pmatrix}$$

Προφανώς η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι  $r(A) = 1$  και λύνοντας έχουμε  $x = -5y - 3z$ . Θέτουμε  $y = \kappa$  και  $z = \lambda$ . Τότε έχουμε τη γενική λύση:  $\{(-5\kappa - 3\lambda, \kappa, \lambda) \mid \kappa, \lambda \in \mathbb{R}\}$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 55.** Αν  $\lambda \in \mathbb{R}$ , να λυθεί το ακόλουθο σύστημα:

$$(\Sigma): \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - x_6 = 0 \\ x_2 + x_5 - x_6 = 1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 - 2x_6 + x_7 = 1 \\ x_1 + x_3 + x_4 = -\lambda \end{cases}$$

**Λύση.** Ο πίνακας του συστήματος  $(\Sigma)$  είναι

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -\lambda \end{pmatrix}$$

Από την πρώτη, δεύτερη και έβδομη στήλη του πίνακα  $A$  έχουμε

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

και

$$\left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cccc} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| = 0$$

Συνεπώς βρήκαμε μια οριζουσα τάξης 3 διάφορη του 0 έτσι ώστε όλες οι ελάχιστες οριζουσες τάξης 4 που την περιβάλλουν είναι 0. Άρα η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι  $r(A) = 3$ . Στην συνέχεια θα βρούμε την βαθμίδα του επαυξημένου πίνακα  $(A|B)$ . Έχουμε:

$$(A|B) = \left( \begin{array}{ccccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 & 2 & -2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -\lambda \end{array} \right) \xrightarrow[\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 - \Gamma_1]{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_1} \left( \begin{array}{ccccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -\lambda \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[\Gamma_4 \rightarrow \Gamma_4 + \Gamma_2]{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_2} \left( \begin{array}{ccccccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 - \lambda \end{array} \right)$$

Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

(1) Αν  $\lambda \neq 1$  τότε η βαθμίδα του επαυξημένου πίνακα  $(A|B)$  είναι  $r(A|B) = 4$  διότι

$$\left| \begin{array}{cccc} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 - \lambda \end{array} \right| = -(1 - \lambda) \neq 0$$

Άρα στην περίπτωση αυτή έχουμε

$$r(A) = 3 \neq 4 = r(A|B)$$

και επομένως το σύστημα  $(\Sigma)$  δεν είναι συμβιβαστό.

(2) Έστω  $\lambda = 1$ . Τότε  $r(A|B) = 3$  αφού

$$\left| \begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right| = -1 \neq 0$$

και όλες οι ελάχιστες οριζουσες τάξης 4 που την περιβάλλουν είναι 0. Συνεπώς έχουμε  $r(A) = 3 = r(A|B)$  και άρα το  $(\Sigma)$  είναι συμβιβαστό. Έστω  $\Lambda(\Sigma_0)$  ο υπόχωρος των λύσεων του αντίστοιχου ομογενούς  $(\Sigma_0)$ . Τότε θα έχουμε  $\dim_{\mathbb{R}} \Lambda(\Sigma_0) = 7 - r(A) = 7 - 3 = 4$  παραμέτρους στις λύσεις. Θέτουμε  $x_3 = p$ ,  $x_4 = q$ ,  $x_5 = r$  και  $x_6 = s$  όπου  $p, q, r, s \in \mathbb{R}$ . Τότε το  $(\Sigma)$  είναι ισοδύναμο με το ακόλουθο σύστημα:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 & = & -p - q - r + s \\ x_2 & = & 1 - r + s \\ x_1 + 2x_2 + x_7 & = & 1 - p - q - 2r + 2s \end{cases}$$

Τότε αντικαθιστώντας την  $x_2 = 1 - r + s$  στη πρώτη εξίσωση βρίσκουμε ότι  $x_1 = -1 - p - q$  και από την τελευταία εξίσωση έπεται ότι  $x_7 = 0$ . Επομένως η γενική λύση του συστήματος  $(\Sigma)$  είναι

$$\begin{cases} x_1 = -1 - p - q \\ x_2 = 1 - r + s \\ x_3 = p \\ x_4 = q \\ x_5 = r \\ x_6 = s \\ x_7 = 0 \end{cases} \quad p, q, r, s \in \mathbb{R} \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 56.** Αν  $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ , να λυθεί το σύστημα:

$$(\Sigma) : \begin{cases} \alpha x + y + z = \alpha \\ x + \beta y + z = \beta \\ x + y + \gamma z = \gamma \end{cases}$$

**Λύση.** Ο πίνακας του συστήματος  $(\Sigma)$  είναι

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \beta & 1 \\ 1 & 1 & \gamma \end{pmatrix}$$

και εύκολα υπολογίζουμε ότι η ορίζουσα τού πίνακα  $A$  είναι  $|A| = \alpha\beta\gamma - \alpha - \beta - \gamma + 2$ . Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις αναφορικά με τις τιμές που μπορεί να λάβει η βαθμίδα του πίνακα  $A$ .

(1)  $\underline{r(A) = 3}$ : Αν η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι ίση με 3 τότε ισοδύναμα έχουμε  $|A| \neq 0$ . Συνεπώς το σύστημα είναι Cramer και άρα έχουμε μοναδική λύση:

$$x = \frac{\alpha\beta\gamma - 2\beta\gamma + \beta + \gamma - \alpha}{|A|}, \quad y = \frac{\alpha\beta\gamma - 2\alpha\gamma + \alpha + \gamma - \beta}{|A|}, \quad z = \frac{\alpha\beta\gamma - 2\alpha\beta + \alpha + \beta - \gamma}{|A|}$$

(2)  $\underline{r(A) = 1}$ : Ο πίνακας  $A$  έχει βαθμίδα ίση με 1 αν και μόνο αν

$$\begin{vmatrix} 1 & \beta \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \gamma \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \iff \alpha = \beta = \gamma = 1$$

Εύκολα διαπιστώνουμε ότι αρκεί να ελέγξουμε μόνο τις παραπάνω ορίζουσες ώστε  $r(A) = 1$ . Τότε το σύστημα είναι ισοδύναμο με την εξίσωση  $x + y + z = 1$  της οποίας η γενική λύση είναι:

$$x = 1 - \kappa - \lambda, \quad y = \kappa, \quad z = \lambda, \quad \kappa, \lambda \in \mathbb{R}$$

(3)  $\underline{r(A) = 2}$ :

(α) Αν  $\alpha = \beta = \gamma = 1$  τότε από το (2) η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι  $r(A) = 1$ , το οποίο είναι άτοπο.

(β) Έστω  $\alpha \neq 1, \beta \neq 1, \gamma \neq 1$  και ας υποθέσουμε ότι το  $(\Sigma)$  είναι συμβιβαστό. Τότε  $r(A|B) = 2 = r(A)$  όπου ο επαυξημένος πίνακας του  $A$  είναι

$$(A|B) = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 1 & \alpha \\ 1 & \beta & 1 & \beta \\ 1 & 1 & \gamma & \gamma \end{pmatrix}$$

Τότε η ορίζουσα

$$\begin{vmatrix} 1 & \beta \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$$



αφού το  $\beta \neq 1$ , και άρα όλες οι ελάχιστες ορίζουσες που την περιβάλλουν θα πρέπει να είναι ίσες με 0, δηλαδή:

$$\begin{vmatrix} \alpha & 1 & 1 \\ 1 & \beta & 1 \\ 1 & 1 & \gamma \end{vmatrix} = 0 = \begin{vmatrix} \alpha & 1 & \alpha \\ 1 & \beta & \beta \\ 1 & 1 & \gamma \end{vmatrix}$$

Υπολογίζοντας τις παραπάνω ορίζουσες έχουμε:

$$\begin{cases} \alpha\beta\gamma - \alpha - \beta - \gamma + 2 = 0 \\ \alpha\beta\gamma + \alpha + \beta - \gamma - 2\alpha\beta \end{cases}$$

Από την πρώτη εξίσωση έχουμε  $\alpha\beta\gamma = \alpha + \beta + \gamma - 2$  και αντικαθιστώντας στην δεύτερη καταλήγουμε στην εξίσωση:

$$\alpha + \beta - \alpha\beta = 1 \implies (\alpha - 1)(1 - \beta) = 0 \implies \alpha = 1 \text{ ή } \beta = 1$$

που είναι άτοπο από την υπόθεση μας. Άρα δεν γίνεται τα  $\alpha$ ,  $\beta$  και  $\gamma$  να είναι διάφορα του 1 όταν η βαθμίδα είναι  $r(A) = 2$ .

(γ) Έστω  $\alpha = 1$ ,  $\beta \neq 1$ ,  $\gamma \neq 1$ . Τότε

$$|A| = \alpha\beta\gamma - \alpha - \beta - \gamma + 2 \xrightarrow{\alpha=1} (\beta - 1)(\gamma - 1) = 0$$

και άρα  $\beta = 1$  ή  $\gamma = 1$ , που είναι άτοπο από την υπόθεση που ξεκινήσαμε. Επομένως υποθέτουμε ότι μόνο ένα από τα  $\alpha$ ,  $\beta$  και  $\gamma$  είναι μηδέν τότε καταλήξαμε σε άτοπο. Παρόμοια καταλήγουμε σε άτοπο αν  $\alpha \neq 1$ ,  $\beta = 1$ ,  $\gamma \neq 1$  ή  $\alpha \neq 1$ ,  $\beta \neq 1$ ,  $\gamma = 1$ .

(δ) Υποθέτουμε ότι μόνο δύο από τα  $\alpha$ ,  $\beta$  και  $\gamma$  είναι ίσα με 1. Έστω  $\alpha \neq 1$ ,  $\beta = 1$ ,  $\gamma = 1$ . Τότε έχουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} \alpha x + y + z = \alpha \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

και παρατηρούμε ότι

$$\begin{vmatrix} \alpha & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = \alpha - 1 \neq 0$$

Άρα το παραπάνω σύστημα είναι ισοδύναμο με το εξής:

$$\begin{cases} \alpha x + y = \alpha - z \\ x + y = 1 - z \end{cases}$$

που είναι σύστημα Cramer ως προς τα  $x$  και  $y$ . Τότε εύκολα βρίσκουμε ότι η γενική λύση του συστήματος είναι:  $x = 1$ ,  $y = -\kappa$ ,  $z = \kappa$ ,  $\kappa \in \mathbb{R}$ . Παρόμοια εργαζόμαστε αν  $\alpha = 1$ ,  $\beta \neq 1$ ,  $\gamma = 1$  ή  $\alpha = 1$ ,  $\beta = 1$ ,  $\gamma \neq 1$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 57.** Να λυθεί το σύστημα ( $\lambda \in \mathbb{R}$ ):

$$\begin{cases} x - y + z = 3 \\ x + y + \lambda z = 1 \\ x + \lambda y + z = \lambda \end{cases}$$

**Λύση.** Ο πίνακας του συστήματος ( $\Sigma$ ) είναι

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix} \text{ και } B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ \lambda \end{pmatrix}$$

Έχουμε

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 - \Gamma_1]{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 - \Gamma_1} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & \lambda - 1 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \end{vmatrix} = -(\lambda + 1)(\lambda - 1)$$

(1) Για  $\lambda \neq 1$  και  $\lambda \neq -1$  έχουμε  $|A| \neq 0$  και άρα το σύστημα είναι Cramer. Συνεπώς έχουμε μοναδική λύση:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ \lambda & \lambda & 1 \end{vmatrix}}{-(\lambda + 1)(\lambda - 1)} = \dots = 4$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \\ 1 & \lambda & 1 \end{vmatrix}}{-(\lambda + 1)(\lambda - 1)} = \dots = \frac{\lambda - 3}{\lambda + 1}$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \end{vmatrix}}{-(\lambda + 1)(\lambda - 1)} = \dots = -\frac{4}{(\lambda + 1)}$$

(2) Έστω  $\lambda = 1$ . Τότε έχουμε το σύστημα

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} x - y + z = 3 \\ x + y + z = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

όπου

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad B = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι  $r(A) = 2$  διότι υπάρχει μια οριζουσα τάξης δύο διαφορετική του μηδενός:

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

Επίσης, η βαθμίδα του επαυξημένου πίνακα  $(A|B)$  είναι  $r(A|B) = 2$  διότι

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \quad \text{και} \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Επομένως το σύστημα  $(\Sigma)$  είναι συμβιβαστό αφού  $r(A) = r(A|B)$  και άρα το  $(\Sigma)$  είναι ισοδύναμο με το ακόλουθο σύστημα:

$$\begin{cases} x - y = 3 - z \\ x + y = 1 - z \end{cases} \implies 2x = 4 - 2z \implies x = 2 - z \implies y = -1$$

Θέτουμε  $z = t \in \mathbb{R}$ . Τότε η γενική λύση του  $(\Sigma)$  είναι

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 \\ z = t \end{cases}$$

(3) Έστω  $\lambda = -1$ . Τότε έχουμε το σύστημα

$$(\Sigma) \quad \begin{cases} x - y + z = 3 \\ x + y - z = 1 \\ x - y + z = -1 \end{cases}$$

όπου παρατηρούμε από την πρώτη και τρίτη εξίσωση ότι το σύστημα είναι αδύνατο.  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 58.** Πότε το σύστημα

$$\begin{cases} x + 5y - 2z + 6w = \kappa \\ 4x - 3y + 7z + 12w = \lambda \\ 5x - 44y + 35z - 6w = \mu \end{cases}$$

είναι συμβιβάσιμο;

**Λύση.** Ο πίνακας και ο επαυξημένος πίνακας του συστήματος είναι

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 & 6 \\ 4 & -3 & 7 & 12 \\ 5 & -44 & 35 & -6 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad (A|B) = \begin{pmatrix} 1 & 5 & -2 & 6 & \kappa \\ 4 & -3 & 7 & 12 & \lambda \\ 5 & -44 & 35 & -6 & \mu \end{pmatrix}$$

Το σύστημα είναι συμβιβάσιμο αν και μόνο αν  $r(A) = r(A|B)$ . Η βαθμίδα του πίνακα  $A$  είναι  $r(A) = 2$  διότι υπάρχει μια οριζούσα τάξης δύο διαφορετική του μηδενός:

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & -3 \end{vmatrix} = -23 \neq 0$$

και οι οριζούσες τρίτης τάξης που την περιβάλλουν είναι μηδέν, δηλαδή

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & -2 \\ 4 & -3 & 7 \\ 5 & -44 & 35 \end{vmatrix} = 0 = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 6 \\ 4 & -3 & 12 \\ 5 & -44 & -6 \end{vmatrix}$$

Συνεπώς για να ισχύει  $r(A) = r(A|B)$  θα πρέπει

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & \kappa \\ 4 & -3 & \lambda \\ 5 & -44 & \mu \end{vmatrix} = 0 \iff -\mu + 3\lambda - 7\kappa = 0$$

Άρα το σύστημα είναι συμβιβάσιμο αν και μόνο αν  $-\mu + 3\lambda - 7\kappa = 0$ .  $\square$

## 50. Φυλλάδιο 10 - 20/2/2012

**Λυμένη Άσκηση 59.** Έστω  $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$  η κανονική βάση του  $\mathbb{R}^4$  και  $\mathcal{B}'$  η βάση

$$\mathcal{B}' = \{\vec{\varepsilon}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_4, \vec{\varepsilon}_2 = \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2, \vec{\varepsilon}_3 = 3\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{\varepsilon}_4 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4\}$$

Έστω  $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$  η μοναδική γραμμική απεικόνιση έτσι ώστε:  $f(\vec{\varepsilon}_1) = 3\vec{\varepsilon}_2$ ,  $f(\vec{\varepsilon}_2) = 7\vec{\varepsilon}_4$ ,  $f(\vec{\varepsilon}_3) = \vec{\varepsilon}_1 + \vec{\varepsilon}_3$  και  $f(\vec{\varepsilon}_4) = \vec{\varepsilon}_1 - 5\vec{\varepsilon}_3$ . Να βρεθεί ο πίνακας  $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}(f)$ .

**Λύση.** Έχουμε την κανονική βάση  $\mathfrak{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1, 0), \vec{e}_4 = (0, 0, 0, 1)\}$  του  $\mathbb{R}^4$ . Τότε από την περιγραφή της βάσης  $\mathfrak{B}'$  έχουμε:

$$\begin{cases} \vec{\varepsilon}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_4 \\ \vec{\varepsilon}_2 = \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 \\ \vec{\varepsilon}_3 = 3\vec{e}_1 + \vec{e}_2 \\ \vec{\varepsilon}_4 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4 \end{cases} \implies \begin{cases} \vec{\varepsilon}_1 = (1, 0, 0, 1) \\ \vec{\varepsilon}_2 = (1, 3, 0, 0) \\ \vec{\varepsilon}_3 = (3, 1, 0, 0) \\ \vec{\varepsilon}_4 = (1, 1, 1, 1) \end{cases}$$

και άρα

$$\begin{cases} f(\vec{\varepsilon}_1) = 3\vec{\varepsilon}_2 \\ f(\vec{\varepsilon}_2) = 7\vec{\varepsilon}_4 \\ f(\vec{\varepsilon}_3) = \vec{\varepsilon}_1 + \vec{\varepsilon}_3 \\ f(\vec{\varepsilon}_4) = \vec{\varepsilon}_1 - 5\vec{\varepsilon}_3 \end{cases} \implies \begin{cases} f(1, 0, 0, 1) = (3, 9, 0, 0) \\ f(1, 3, 0, 0) = (7, 7, 7, 7) \\ f(3, 1, 0, 0) = (4, 1, 0, 1) \\ f(1, 1, 1, 1) = (-14, -5, 0, 1) \end{cases}$$

Έστω  $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$ . Τότε

$$(x, y, z, w) = a(1, 0, 0, 1) + b(1, 3, 0, 0) + c(3, 1, 0, 0) + d(1, 1, 1, 1) = (a + b + 3c + d, 3b + c + d, d, a + d)$$

και άρα έχουμε το σύστημα:

$$\begin{cases} a + b + 3c + d = x \\ \phantom{a} + 3b + c + d = y \\ \phantom{a} + \phantom{b} + \phantom{c} + d = z \\ a + \phantom{b} + \phantom{c} + d = w \end{cases}$$

Λύνοντας το παραπάνω σύστημα με τις γνωστές διαδικασίες τότε βρίσκουμε

$$\begin{cases} a = w - z \\ b = -\frac{1}{8}x + \frac{3}{8}y - \frac{3}{8}z + \frac{1}{8}w \\ c = \frac{3}{8}x - \frac{1}{8}y + \frac{1}{8}z - \frac{3}{8}w \\ d = z \end{cases}$$

Επομένως το τυχαίο διάνυσμα  $(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4$  γράφεται ως εξής:

$$(x, y, z, w) = (w - z)(1, 0, 0, 1) + \left(-\frac{1}{8}x + \frac{3}{8}y - \frac{3}{8}z + \frac{1}{8}w\right)(1, 3, 0, 0) + \left(\frac{3}{8}x - \frac{1}{8}y + \frac{1}{8}z - \frac{3}{8}w\right)(3, 1, 0, 0) + z(1, 1, 1, 1)$$

Άρα αν εφαρμόσουμε τη γραμμική απεικόνιση  $f$  στη παραπάνω σχέση τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x, y, z, w) &= (w - z)f(1, 0, 0, 1) + \left(-\frac{1}{8}x + \frac{3}{8}y - \frac{3}{8}z + \frac{1}{8}w\right)f(1, 3, 0, 0) \\ &+ \left(\frac{3}{8}x - \frac{1}{8}y + \frac{1}{8}z - \frac{3}{8}w\right)f(3, 1, 0, 0) + zf(1, 1, 1, 1) \\ &= (w - z)(3, 9, 0, 0) + \left(-\frac{1}{8}x + \frac{3}{8}y - \frac{3}{8}z + \frac{1}{8}w\right)(7, 7, 7, 7) \\ &+ \left(\frac{3}{8}x - \frac{1}{8}y + \frac{1}{8}z - \frac{3}{8}w\right)(4, 1, 0, 1) + z(-14, -5, 0, 1) \\ &\vdots \\ &= \left(\frac{5}{8}x + \frac{17}{8}y - \frac{153}{8}z + \frac{19}{8}w, -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}y - \frac{33}{2}z + \frac{19}{2}w, \right. \\ &\quad \left. -\frac{7}{8}x + \frac{21}{8}y - \frac{21}{8}z + \frac{7}{8}w, -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}y - \frac{3}{2}z + \frac{1}{2}w\right) \end{aligned}$$

Τότε υπολογίζοντας την  $f$  στην κανονική βάση του  $\mathbb{R}^4$  έχουμε:

$$\begin{cases} f(1, 0, 0, 0) = \left(\frac{5}{8}, -\frac{1}{2}, -\frac{7}{8}, -\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{8}\vec{e}_1 - \frac{1}{2}\vec{e}_2 - \frac{7}{8}\vec{e}_3 - \frac{1}{2}\vec{e}_4 \\ f(0, 1, 0, 0) = \left(\frac{17}{8}, \frac{5}{2}, \frac{21}{8}, \frac{5}{2}\right) = \frac{17}{8}\vec{e}_1 + \frac{5}{2}\vec{e}_2 + \frac{21}{8}\vec{e}_3 + \frac{5}{2}\vec{e}_4 \\ f(0, 0, 1, 0) = \left(-\frac{153}{8}, -\frac{33}{2}, -\frac{21}{8}, -\frac{3}{2}\right) = -\frac{153}{8}\vec{e}_1 - \frac{33}{2}\vec{e}_2 - \frac{21}{8}\vec{e}_3 - \frac{3}{2}\vec{e}_4 \\ f(0, 0, 0, 1) = \left(\frac{19}{8}, \frac{19}{2}, \frac{7}{8}, \frac{1}{2}\right) = \frac{19}{8}\vec{e}_1 + \frac{19}{2}\vec{e}_2 + \frac{7}{8}\vec{e}_3 + \frac{1}{2}\vec{e}_4 \end{cases}$$

Συνεπώς ο πίνακας  $M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f)$  της  $f$  είναι

$$M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f) = \begin{pmatrix} \frac{5}{8} & \frac{17}{8} & -\frac{153}{8} & \frac{19}{8} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{33}{2} & \frac{19}{2} \\ -\frac{7}{8} & \frac{21}{8} & -\frac{21}{8} & \frac{7}{8} \\ -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

• • •

**Διαφορετικά:** Μπορούμε να υπολογίσουμε τον ζητούμενο πίνακα  $A := M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f)$  χωρίς να γνωρίζουμε την  $f$  ως εξής:

Από τις σχέσεις

$$f(\vec{e}_1) = 3\vec{e}_2, \quad f(\vec{e}_2) = 7\vec{e}_4, \quad f(\vec{e}_3) = \vec{e}_1 + \vec{e}_3, \quad f(\vec{e}_4) = \vec{e}_1 - 5\vec{e}_3$$

βλέπουμε άμεσα ότι ο πίνακας της  $f$  στην βάση  $\mathfrak{B}'$  είναι ο:

$$B := M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{B}'}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 7 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Σύμφωνα με την θεωρία, οι πίνακες  $A$  και  $B$  είναι όμοιοι και θα συνδέονται με την ακόλουθη σχέση:

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = B$$

όπου  $P = M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}'}$  είναι ο πίνακας μετάβασης από την  $\mathfrak{B}$  στην  $\mathfrak{B}'$ . Επομένως θα έχουμε:

$$A = P \cdot B \cdot P^{-1} \quad (*)$$

και το πρόβλημα ανάγεται στην εύρεση των  $P$  και  $P^{-1}$ . Επειδή:

$$\mathfrak{B}' = \{\vec{e}_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_4, \quad \vec{e}_2 = \vec{e}_1 + 3\vec{e}_2, \quad \vec{e}_3 = 3\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \quad \vec{e}_4 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_4\}$$

βλέπουμε άμεσα ότι:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ο  $P^{-1}$  μπορεί να υπολογισθεί είτε με την εύρεση του συμπληρωματικού του  $P$  ή ως ο πίνακας μετάβασης από την  $\mathfrak{B}'$  στην  $\mathfrak{B}$ . Τότε ο πίνακας  $A$  προκύπτει από την σχέση (\*).  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 60.** Έστω  $f, g : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  δύο γραμμικές απεικονίσεις και έστω η βάση του  $\mathbb{R}^3$ :

$$\mathfrak{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 1, 1), \vec{e}_2 = (1, 1, 0), \vec{e}_3 = (1, 0, 0)\}$$

Αν

$$M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(g) = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

να βρεθούν οι γραμμικές απεικονίσεις  $f + g$  και  $-3f + 2g$ .

**Λύση.** Από την θεωρία γνωρίζουμε ότι  $M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f + g) = M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f) + M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(g)$  και άρα

$$M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f + g) = \begin{pmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Επομένως έχουμε

$$\begin{cases} (f + g)(\vec{e}_1) = 7\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3 = 7(1, 1, 1) + 0(1, 1, 0) + 3(1, 0, 0) = (10, 7, 7) \\ (f + g)(\vec{e}_2) = 1\vec{e}_1 + 1\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3 = (1, 1, 1) + (1, 1, 0) + 3(1, 0, 0) = (5, 2, 1) \\ (f + g)(\vec{e}_3) = 1\vec{e}_1 - 1\vec{e}_2 + 1\vec{e}_3 = (1, 1, 1) - 1(1, 1, 0) + (1, 0, 0) = (1, 0, 1) \end{cases}$$

Έστω  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Τότε το τυχαίο διάνυσμα  $(x, y, z)$  γράφεται ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων της βάσης  $\mathfrak{B}$ . Έστω  $\kappa\vec{e}_1 + \lambda\vec{e}_2 + \mu\vec{e}_3 = (x, y, z)$ . Τότε

$$(x, y, z) = (\kappa + \lambda + \mu, \kappa + \lambda, \kappa) \implies \begin{cases} x = \kappa + \lambda + \mu \\ y = \kappa + \lambda \\ z = \kappa \end{cases} \implies \begin{cases} \kappa = z \\ \lambda = y - z \\ \mu = x - y \end{cases}$$

και άρα  $(x, y, z) = z\vec{e}_1 + (y - z)\vec{e}_2 + (x - y)\vec{e}_3$ . Αν εφαρμόσουμε τη γραμμική απεικόνιση  $f + g$  στο διάνυσμα  $(x, y, z)$  τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} (f + g)(x, y, z) &= (f + g)(z\vec{e}_1 + (y - z)\vec{e}_2 + (x - y)\vec{e}_3) \\ &= z(f + g)(\vec{e}_1) + (y - z)(f + g)(\vec{e}_2) + (x - y)(f + g)(\vec{e}_3) \\ &= z(10, 7, 7) + (y - z)(5, 2, 1) + (x - y)(1, 0, 1) \\ &= (x + 4y + 5z, 2y + 5z, x + 6z) \end{aligned}$$

Συνεπώς  $(f + g)(x, y, z) = (x + 4y + 5z, 2y + 5z, x + 6z)$  για κάθε  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .

Στην συνέχεια θα βρούμε τη γραμμική απεικόνιση  $-3f + 2g$ . Έχουμε:

$$M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(-3f + 2g) = M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(-3f) + M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(2g) = -3M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f) + 2M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(g) = \begin{pmatrix} 9 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Επομένως έχουμε

$$\begin{cases} (-3f + 2g)(\vec{e}_1) = 9\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 6\vec{e}_3 = 9(1, 1, 1) + 0(1, 1, 0) + 6(1, 0, 0) = (15, 9, 9) \\ (-3f + 2g)(\vec{e}_2) = -3\vec{e}_1 - 3\vec{e}_2 + 1\vec{e}_3 = -3(1, 1, 1) - 3(1, 1, 0) + (1, 0, 0) = (-5, -6, -3) \\ (-3f + 2g)(\vec{e}_3) = -3\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 + 2\vec{e}_3 = -3(1, 1, 1) + 3(1, 1, 0) + 2(1, 0, 0) = (2, 0, -3) \end{cases}$$

Έστω  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Δείξαμε παραπάνω ότι το τυχαίο διάνυσμα  $(x, y, z)$  γράφεται γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων της βάσης  $\mathfrak{B}$  ως εξής:  $(x, y, z) = z\vec{e}_1 + (y - z)\vec{e}_2 + (x - y)\vec{e}_3$ . Τότε αν εφαρμόσουμε τη γραμμική

απεικόνιση  $-3f + 2g$  στο τυχαίο διάνυσμα  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  έχουμε:

$$\begin{aligned} (-3f + 2g)(x, y, z) &= (-3f + 2g)(z\vec{e}_1 + (y - z)\vec{e}_2 + (x - y)\vec{e}_3) \\ &= z(-3f + 2g)(\vec{e}_1) + (y - z)(-3f + 2g)(\vec{e}_2) + (x - y)(-3f + 2g)(\vec{e}_3) \\ &= z(15, 9, 9) + (y - z)(-5, -6, -3) + (x - y)(2, 0, -3) \\ &= (2x - 7y + 20z, -6y + 15z, -3x + 12z) \end{aligned}$$

Συνεπώς  $(-3f + 2g)(x, y, z) = (2x - 7y + 20z, -6y + 15z, -3x + 12z)$  για κάθε  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .

**Β' Τρόπος:** Αφού ξέρουμε τον πίνακα της  $f$  στη βάση  $\mathfrak{B}$  και τον πίνακα της  $g$  στη βάση  $\mathfrak{B}$  τότε μπορούμε να βρούμε τον τύπο της  $f$  και τον τύπο της  $g$  αντίστοιχα. Έχουμε:

$$\begin{cases} f(\vec{e}_1) = f(1, 1, 1) = \vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 = (1, 1, 1) \\ f(\vec{e}_2) = f(1, 1, 0) = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3 = (3, 2, 1) \\ f(\vec{e}_3) = f(1, 0, 0) = \vec{e}_1 - \vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 = (0, 0, 1) \end{cases}$$

Συνεπώς αν εφαρμόσουμε την  $f$  στο τυχαίο διάνυσμα  $(x, y, z) = z\vec{e}_1 + (y - z)\vec{e}_2 + (x - y)\vec{e}_3$  του  $\mathbb{R}^3$  τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f(z\vec{e}_1 + (y - z)\vec{e}_2 + (x - y)\vec{e}_3) \\ &= zf(\vec{e}_1) + (y - z)f(\vec{e}_2) + (x - y)f(\vec{e}_3) \\ &= z(1, 1, 1) + (y - z)(3, 2, 1) + (x - y)(0, 0, 1) \\ &= (3y - 2z, 2y - z, x) \end{aligned}$$

Συνεπώς  $f(x, y, z) = (3y - 2z, 2y - z, x)$  για κάθε  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Δουλεύοντας παρόμοια βρίσκουμε ότι  $g(x, y, z) = (x + y + 7z, 6z, 6z)$  για κάθε  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ . Τότε γνωρίζοντας τους τύπους της  $f$  και της  $g$  εύκολα υπολογίζουμε τους τύπους της  $f + g$  και  $-3f + 2g$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 61.** Έστω  $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  μια γραμμική απεικόνιση της οποίας ο πίνακας στην κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$  είναι ο ακόλουθος

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

- (1) Να βρεθεί το διάνυσμα  $f(x, y, z)$ , για κάθε  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .
- (2) Να βρεθεί ο πίνακας  $B$  της  $f$  στη βάση  $\mathfrak{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, -2), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (2, 0, 1)\}$ .
- (3) Να βρεθεί αντιστρέψιμος πίνακας  $P$  έτσι ώστε  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .
- (4) Να υπολογισθεί ο πίνακας  $A^n, \forall n \geq 1$ .

**Λύση.** (1) Έστω  $\{\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$  η κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$ . Τότε από τον πίνακα  $A$  έχουμε:

$$\begin{cases} f(\vec{e}_1) = \vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3 = (1, 0, -2) \\ f(\vec{e}_2) = 0\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 = (0, 0, 0) \\ f(\vec{e}_3) = -2\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3 = (-2, 0, 4) \end{cases}$$

Επομένως ο τύπος της  $f$  είναι

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f(x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3) \\ &= xf(\vec{e}_1) + yf(\vec{e}_2) + zf(\vec{e}_3) \\ &= x(1, 0, -2) + y(0, 0, 0) + z(-2, 0, 4) \\ &= (x - 2z, 0, -2x + 4z) \end{aligned}$$

δηλαδή  $f(x, y, z) = (x - 2z, 0, -2x + 4z), \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .

- (2) Αφού θέλουμε να βρούμε τον πίνακα της  $f$  στη βάση  $\mathfrak{B}$  θα υπολογίσουμε την  $f$  στα διανύσματα της  $\mathfrak{B}$  και στην συνέχεια θα τα εκφράσουμε ως γραμμικό συνδυασμό των διανυσμάτων της  $\mathfrak{B}$ . Έχουμε:

$$\begin{cases} f(\vec{e}_1) = f(1, 0, -2) = (5, 0, -10) = 5\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 \\ f(\vec{e}_2) = f(0, 1, 0) = (0, 0, 0) = 0\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 \\ f(\vec{e}_3) = f(2, 0, 1) = (0, 0, 0) = 0\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 \end{cases}$$

Άρα ο πίνακας της  $f$  στη βάση  $\mathfrak{B}$  είναι

$$B = M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{B}}(f) = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (3) Ο αντιστρέψιμος πίνακας  $P$  που ψάχνουμε είναι ο πίνακας μετάβασης από την κανονική βάση  $\{\vec{e}_1 = (1, 0, 0), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (0, 0, 1)\}$  στη βάση  $\mathfrak{B} = \{\vec{e}_1 = (1, 0, -2), \vec{e}_2 = (0, 1, 0), \vec{e}_3 = (2, 0, 1)\}$ . Αυτό σημαίνει ότι γράφουμε τα διανύσματα της  $\mathfrak{B}$  ως γραμμικό συνδυασμό των διανυσμάτων της κανονικής βάσης. Άρα έχουμε:

$$\begin{cases} \vec{e}_1 = (1, 0, -2) = \vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 - 2\vec{e}_3 \\ \vec{e}_2 = (0, 1, 0) = 0\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + 0\vec{e}_3 \\ \vec{e}_3 = (2, 0, 1) = 2\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + \vec{e}_3 \end{cases} \implies P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ο πίνακας  $P^{-1}$  είναι ο πίνακας μετάβασης από τη βάση  $\mathfrak{B}$  στην κανονική βάση του  $\mathbb{R}^3$ , δηλαδή τώρα γράφουμε τα διανύσματα της κανονικής βάσης του  $\mathbb{R}^3$  ως γραμμικό συνδυασμό των διανυσμάτων της βάσης  $\mathfrak{B}$ . Διαφορετικά απλά υπολογίζουμε τον αντίστροφο πίνακα του  $P$  με το συνηθισμένο τρόπο. Και στις δύο περιπτώσεις βρίσκουμε ότι

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}$$

Επίσης εύκολα επαληθεύουμε τη σχέση:  $B = P^{-1} \cdot A \cdot P$ .

- (4) Από την τελευταία σχέση ο πίνακας  $A$  γράφεται ως εξής:  $A = P \cdot B \cdot P^{-1}$ . Επομένως έχουμε

$$\begin{aligned} A^2 &= A \cdot A \\ &= (P \cdot B \cdot P^{-1}) \cdot (P \cdot B \cdot P^{-1}) \\ &= P \cdot B \cdot P^{-1} P \cdot B \cdot P^{-1} \\ &= P \cdot B \cdot I_3 \cdot B \cdot P^{-1} \\ &= P \cdot B^2 \cdot P^{-1} \end{aligned}$$

και άρα για κάθε  $n \geq 1$  έχουμε:

$$A^n = P \cdot B^n \cdot P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & 0 & -\frac{2}{5} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{5} & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix} = \dots = \begin{pmatrix} 5^{n-1} & 0 & -2 \cdot 5^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 \cdot 5^{n-1} & 0 & 4 \cdot 5^{n-1} \end{pmatrix} \quad \square$$

**Λυμένη Άσκηση 62.** Έστω η απεικόνιση  $f : \mathbb{R}_3[t] \longrightarrow \mathbb{R}_2[t]$ ,  $f(P(t)) = P(t)' - P(t)''$ .

- (1) Να δείξετε ότι η  $f$  είναι γραμμική.
- (2) Να βρείτε μια βάση του  $\text{Ker } f$  και μια βάση της  $\text{Im } f$ .
- (3) Να βρεθεί ο πίνακας  $M_{\mathfrak{B}}^{\mathfrak{C}}(f)$ , όπου  $\mathfrak{B} = \{1, t, t^2, t^3\}$  είναι η κανονική βάση του  $\mathbb{R}_3[t]$  και  $\mathfrak{C} = \{1, t, t^2\}$  είναι η κανονική βάση του  $\mathbb{R}_2[t]$ .
- (4) Να βρεθεί ο πίνακας  $M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{C}'}(f)$  όπου  $\mathfrak{B}' = \{1, 1+t, 1+t+t^2, 1+t+t^2+t^3\}$  είναι βάση του  $\mathbb{R}_3[t]$  και  $\mathfrak{C}' = \{1, 2t-1, -1-4t+3t^2\}$  είναι βάση του  $\mathbb{R}_2[t]$ .
- (5) Να προσδιοριστούν αντιστρέψιμοι πίνακες  $P, Q$  έτσι ώστε:  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$ .



**Λύση.** (1) Έστω  $P(t), Q(t) \in \mathbb{R}_3[t]$  και  $\lambda \in \mathbb{R}$ . Τότε

$$\begin{aligned} f(P(t) + Q(t)) &= (P(t) + Q(t))' - (P(t) + Q(t))'' \\ &= P(t)' + Q(t)' - P(t)'' - Q(t)'' \\ &= (P(t)' - P(t)'') + (Q(t)' - Q(t)'') \\ &= f(P(t)) + f(Q(t)) \end{aligned}$$

και

$$\begin{aligned} f(\lambda P(t)) &= (\lambda P(t))' - (\lambda P(t))'' \\ &= \lambda P(t)' - \lambda P(t)'' \\ &= \lambda(P(t)' - P(t)'') \\ &= \lambda f(P(t)) \end{aligned}$$

Άρα η απεικόνιση  $f$  είναι γραμμική.

(2) Έστω  $P(t) = \alpha + \beta t + \gamma t^2 + \delta t^3 \in \mathbb{R}_3[t]$ . Τότε:  $P(t) \in \text{Ker } f$  αν και μόνον αν:

$$f(P(t)) = 0 \iff P(t)' - P(t)'' = 0 \quad (*)$$

Έχουμε  $P(t)' = \beta + 2\gamma t + 3\delta t^2$  και  $P(t)'' = 2\gamma + 6\delta t$ . Τότε:

$$\begin{aligned} P(t)' - P(t)'' = 0 &\implies (\beta + 2\gamma t + 3\delta t^2) - (2\gamma + 6\delta t) = 0 \\ &\implies (\beta - 2\gamma) + (2\gamma - 6\delta)t + 3\delta t^2 = 0 + 0t + 0t^2 \\ &\implies \beta = \gamma = \delta = 0 \end{aligned}$$

Συνεπώς ο πυρήνας της  $f$  είναι

$$\begin{aligned} \text{Ker } f &= \{P(t) \in \mathbb{R}_3[t] \mid f(P(t)) = 0\} \\ &= \{P(t) \in \mathbb{R}_3[t] \mid \beta = \gamma = \delta = 0\} \\ &= \{P(t) = a \in \mathbb{R}_3[t] \mid a \in \mathbb{R}\} \\ &= \{a \cdot 1 \mid a \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle 1 \rangle \end{aligned}$$

Άρα ο πυρήνας  $\text{Ker } f$  της  $f$  αποτελείται από όλα τα σταθερά πολυώνυμα και βάση του  $\text{Ker } f$  είναι το σταθερό πολυώνυμο 1. Στην συνέχεια θα βρούμε μια βάση της εικόνας  $\text{Im } f$  της  $f$ . Από την εξίσωση των διαστάσεων έχουμε:

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_3[t] = \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker } f + \dim_{\mathbb{R}} \text{Im } f \implies \dim_{\mathbb{R}} \text{Im } f = 4 - 1 = 3$$

και  $\text{Im } f$  υπόχωρος του  $\mathbb{R}_2[t]$ . Τότε  $\text{Im } f = \mathbb{R}_2[t]$  αφού  $\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}_2[t] = 3$ . Επομένως μια βάση της εικόνας  $\text{Im } f$  της  $f$  είναι η κανονική βάση του  $\mathbb{R}_2[t]$ , δηλαδή το σύνολο  $\{1, t, t^2\}$ . Διαφορετικά:

$$\mathbb{R}_3[t] = \langle 1, t, t^2, t^3 \rangle \implies \text{Im } f = f(\mathbb{R}_3[t]) = \langle f(1), f(t), f(t^2), f(t^3) \rangle = \langle 1, 2t - 2, 3t^2 - 6t \rangle$$

Άρα τα παραπάνω διανύσματα αποτελούν βάση της  $\text{Im } f$  της  $f$  διότι είναι γραμμικά ανεξάρτητα. Επίσης αφού  $\dim_{\mathbb{R}} \text{Im } f = 3$  και έχουμε βρει τρία διανύσματα που παράγουν τον χώρο τότε από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι αποτελούν βάση.

(3) Έχουμε:

$$\begin{cases} f(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2 \\ f(t) = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2 \\ f(t^2) = 2t - 2 = -2 \cdot 1 + 2 \cdot t + 0 \cdot t^2 \\ f(t^3) = 3t^2 - 6t = 0 \cdot 1 - 6 \cdot t + 3 \cdot t^2 \end{cases} \implies A = M_{\mathbb{B}}^{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(4) Έχουμε:

$$\begin{cases} f(1) = 0 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot (2t - 1) + 0 \cdot (-1 - 4t + 3t^2) \\ f(1+t) = 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot (2t - 1) + 0 \cdot (-1 - 4t + 3t^2) \\ f(1+t+t^2) = -1 + 2t = 0 \cdot 1 + 1 \cdot (2t - 1) + 0 \cdot (-1 - 4t + 3t^2) \\ f(1+t+t^2+t^3) = -1 - 4t + 3t^2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot (2t - 1) + 1 \cdot (-1 - 4t + 3t^2) \end{cases}$$

και άρα ο πίνακας  $M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{C}'}(f)$  είναι

$$B = M_{\mathfrak{B}'}^{\mathfrak{C}'}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(5) Οι πίνακες  $A$  και  $B$  που βρήκαμε παραπάνω είναι όμοιοι διότι είναι οι πίνακες στην ίδια γραμμική απεικόνιση  $f$  σε διαφορετικά ζεύγη βάσεων. Επομένως από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αντιστρέψιμοι πίνακες  $P, Q$  έτσι ώστε:  $B = Q^{-1} \cdot A \cdot P$ . Ο πίνακας  $P$  είναι ο πίνακας μετάβασης από τη βάση  $\mathfrak{B}$  στη βάση  $\mathfrak{B}'$  ενώ ο πίνακας  $Q$  είναι ο πίνακας μετάβασης από τη βάση  $\mathfrak{C}$  στη βάση  $\mathfrak{C}'$ . Έχουμε:

$$\begin{cases} 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2 + 0 \cdot t^3 \\ 1+t = 1 \cdot 1 + 1 \cdot t + 0 \cdot t^2 + 0 \cdot t^3 \\ 1+t+t^2 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot t + 1 \cdot t^2 + 0 \cdot t^3 \\ 1+t^2+t^3 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot t + 1 \cdot t^2 + 1 \cdot t^3 \end{cases} \implies P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

και

$$\begin{cases} 1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot t + 0 \cdot t^2 \\ 2t - 1 = -1 \cdot 1 + 2 \cdot t + 0 \cdot t^2 \\ -1 - 4t + 3t^2 = -1 \cdot 1 - 4 \cdot t + 3 \cdot t^2 \end{cases} \implies Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Ο πίνακας  $Q^{-1}$  είναι ο πίνακας μετάβασης από τη βάση  $\mathfrak{C}'$  στη βάση  $\mathfrak{C}$ . Μπορούμε όμως να υπολογίσουμε απλά τον αντίστροφο του πίνακα  $Q$ . Τότε

$$Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

Συνεπώς βρήκαμε αντιστρέψιμους πίνακες  $P, Q$  έτσι ώστε:  $Q^{-1} \cdot A \cdot P = B$ .  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 63.** Έστω

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

Να βρεθεί η βαθμίδα  $\mathbf{r}(A) := r$  του  $A$  και ακολούθως να βρεθούν αντιστρέψιμοι πίνακες  $P, Q$  έτσι ώστε

$$Q^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} I_r & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & \mathbb{O} \end{pmatrix}$$

όπου  $I_r$  είναι ο μοναδιαίος  $r \times r$  πίνακας.

**Λύση.** Θεωρούμε ότι ο  $3 \times 4$  πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

είναι ο πίνακας της  $\mathbb{K}$ -γραμμικής απεικόνισης

$$\phi : M_{4 \times 1}(\mathbb{K}) \longrightarrow M_{3 \times 1}(\mathbb{K})$$

ως προς τις αντίστοιχες κανονικές βάσεις

$$\mathcal{B}_4 = \left\{ \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

του  $M_{4 \times 1}(\mathbb{K})$  και

$$\mathcal{B}_3 = \left\{ \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

του  $M_{3 \times 1}(\mathbb{K})$ . Δηλαδή, αν  $\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \in M_{4 \times 1}(\mathbb{K})$ , τότε

$$\phi(\vec{v}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha - \beta + \gamma + 2\delta \\ 2\alpha + \beta + 3\gamma + 2\delta \\ \alpha + 5\beta + 3\gamma - 2\delta \end{pmatrix}$$

Προσδιορίζουμε τον  $\text{Ker}\phi$ : Ένα διάνυσμα  $\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix}$  ανήκει στον πυρήνα της  $\phi$ , αν και μόνο αν,

$$\begin{pmatrix} \alpha - \beta + \gamma + 2\delta \\ 2\alpha + \beta + 3\gamma + 2\delta \\ \alpha + 5\beta + 3\gamma - 2\delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Επιλύοντας το αντίστοιχο ομογενές σύστημα:

$$\begin{aligned} \alpha - \beta + \gamma + 2\delta &= 0 \\ 2\alpha + \beta + 3\gamma + 2\delta &= 0 \\ \alpha + 5\beta + 3\gamma - 2\delta &= 0 \end{aligned}$$

ως προς  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ , διαπιστώνουμε ότι το διάνυσμα  $\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix}$  ανήκει στον πυρήνα της  $\phi$ , αν και μόνο αν

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ -\frac{\alpha}{2} - \beta \\ -\frac{\alpha}{4} + \beta \end{pmatrix}, \alpha, \beta \in \mathbb{K}.$$

Συνεπώς η διάσταση του πυρήνα είναι 2 και μια βάση του είναι η  $\mathcal{K} = \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ . Συμπληρώνουμε

τη βάση αυτή σε μια βάση του  $M_{4 \times 1}(\mathbb{K})$ . Πράγματι, το σύνολο

$$\mathcal{C}_4 = \left\{ \vec{c}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{c}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{c}_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{c}_4 = \begin{pmatrix} -4 \\ -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

είναι βάση του  $M_{4 \times 1}(\mathbb{K})$ . Αυτό ελέγχεται εύκολα, διαπιστώνοντας ότι η ορίζουσα του πίνακα

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

είναι διάφορη του μηδενός. Η εικόνα  $\text{Im}(\phi)$  έχει διάσταση  $4 - \dim(\text{Ker } \phi) = 2$ . Αυτή είναι ακριβώς και η βαθμίδα του  $A$  επειδή γνωρίζουμε ότι  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(\phi) = r(A)$ . Επιπλέον η εικόνα  $\text{Im}(\phi)$  παράγεται από τα διανύσματα  $\phi(\vec{c}_1), \phi(\vec{c}_2)$ , τα οποία μάλιστα είναι γραμμικώς ανεξάρτητα, αφού από  $\lambda\phi(\vec{c}_1) + \mu\phi(\vec{c}_2) = \vec{0}$ , έπεται  $\phi(\lambda\vec{c}_1 + \mu\vec{c}_2) = \vec{0}$ . Τότε όμως το διάνυσμα  $\lambda\vec{c}_1 + \mu\vec{c}_2$  ανήκει στον πυρήνα  $\text{Ker } \phi$ , πράγμα αδύνατο, επειδή από  $\lambda\vec{c}_1 + \mu\vec{c}_2 = \rho\vec{c}_3 + \tau\vec{c}_4$ , έπεται  $\lambda = \mu = \rho = \tau = 0$ . Όστε μια βάση της εικόνας είναι το σύνολο

$$\mathcal{L} = \left\{ \phi(\vec{c}_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \phi(\vec{c}_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}.$$

Συμπληρώνουμε την  $\mathcal{L}$  σε μια βάση του  $M_{3 \times 1}(\mathbb{K})$ . Πράγματι, το σύνολο

$$\mathcal{C}_3 = \left\{ \vec{\gamma}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{\gamma}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \vec{\gamma}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

είναι βάση του  $M_{3 \times 1}(\mathbb{K})$ . (Τα τρία διανύσματα του  $\mathcal{C}_3$  είναι γραμμικά ανεξάρτητα σε έναν χώρο διάστασης 3.) Ας δούμε τη μορφή έχει ο πίνακας  $M(\phi)_{C_4}^{C_3}$  της  $\phi$  ως προς τις βάσεις  $\mathcal{C}_4, \mathcal{C}_3$ . Έχουμε:

$$\begin{aligned} \phi(\vec{c}_1) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = 1\vec{\gamma}_1 + 0\vec{\gamma}_2 + 0\vec{\gamma}_3, \\ \phi(\vec{c}_2) &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = 0\vec{\gamma}_1 + 1\vec{\gamma}_2 + 0\vec{\gamma}_3, \\ \phi(\vec{c}_3) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0\vec{\gamma}_1 + 0\vec{\gamma}_2 + 0\vec{\gamma}_3, \\ \phi(\vec{c}_4) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0\vec{\gamma}_1 + 0\vec{\gamma}_2 + 0\vec{\gamma}_3 \end{aligned}$$

Επομένως,

$$M(\phi)_{C_4}^{C_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Από τη θεωρία γνωρίζουμε ότι

$$M(\phi)_{C_4}^{C_3} = (M_{\mathcal{B}_3}^{C_3})^{-1} \cdot M(\phi)_{\mathcal{B}_4}^{\mathcal{B}_3} \cdot M_{\mathcal{B}_4}^{C_4},$$

όπου ο  $M_{\mathcal{B}_4}^{C_4}$  είναι ο πίνακας μετάβασης από την  $\mathcal{B}_4$  στη  $C_4$  και ο  $M_{\mathcal{B}_3}^{C_3}$  είναι ο πίνακας μετάβασης από την  $\mathcal{B}_3$  στη  $C_3$ . Δηλαδή,

$$M(\phi)_{\mathcal{B}_4}^{C_4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad M(\phi)_{\mathcal{B}_3}^{C_3} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Ώστε ο  $P$  της άσκησης είναι ο  $M_{\mathcal{B}_4}^{C_4}$  και ο  $Q$  της άσκησης είναι ο  $M_{\mathcal{B}_3}^{C_3}$ . Αυτό ελέγχεται αφού το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού:

$$Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{είναι ο πίνακας } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ Για βοήθεια: } \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{5}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ 1 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

Αφού λοιπόν ο  $A$  είναι ισοδύναμος με τον  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  έχει την ίδια βαθμίδα με αυτόν, δηλαδή 2.  $\square$

**Λυμένη Άσκηση 64.** Έστω  $f, g : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{K}$  δύο μη μηδενικές γραμμικές απεικονίσεις, όπου  $\mathcal{E}$  είναι ένας διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης υπεράνω ενός σώματος  $\mathbb{K}$ . Ορίζουμε μια νέα απεικόνιση ως εξής:

$$h : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{K}^2, \quad \vec{x} \mapsto h(\vec{x}) := (f(\vec{x}), g(\vec{x}))$$

Να δείξετε τα ακόλουθα:

- (1) Η απεικόνιση  $h$  είναι γραμμική.
- (2)  $\text{Ker}(h) = \text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)$ .
- (3)  $\text{Im}(h) = \mathbb{K}^2$  (δηλαδή η  $h$  είναι επιμορφισμός) αν και μόνον αν  $\text{Ker}(f) + \text{Ker}(g) = \mathcal{E}$ .

**Λύση.** (1) Δείχνουμε πρώτα ότι κάθε μη-μηδενική γραμμική απεικόνιση  $f : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{K}$  είναι επιμορφισμός. Πράγματι επειδή η  $f$  είναι μη-μηδενική, έπεται ότι  $\text{Im}(f) \neq \{\vec{0}\}$ . Επειδή ο  $\mathbb{K}$ -διανυσματικός χώρος  $\mathbb{K}$  έχει ως υπόχωρους μόνο τον μηδενικό υπόχωρο και τον εαυτό του, έπεται ότι  $\text{Im}(f) = \mathbb{K}$ , και άρα η  $f$  είναι επιμορφισμός.

- (2) Επειδή οι  $f, g$  είναι μη-μηδενικές, από το (1) έπεται ότι οι  $f, g$  είναι επιμορφισμοί. Έτσι  $\text{Im}(f) = \mathbb{K} = \text{Im}(g)$  και άρα:  $\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(f) = 1 = \dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(g)$ . Από την Θεμελιώδη Εξίσωση Διαστάσεων για τις  $f$  και  $g$  θα έχουμε:

$$\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f) + 1 \quad \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(g) + 1$$

και επομένως αν θέσουμε  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} := n$ , θα έχουμε:

$$\dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f) = n - 1 = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(g) \quad (*)$$

- (3) Η απόδειξη ότι η  $h$  είναι γραμμική προκύπτει εύκολα από την γραμμικότητα των  $f$  και  $g$ .
- (4) Έστω  $\vec{x} \in \text{Ker}(h)$ . Τότε  $(f(\vec{x}), g(\vec{x})) = (0, 0)$  και άρα  $f(\vec{x}) = 0 = g(\vec{x})$ . Επομένως προκύπτει ότι  $\vec{x} \in \text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)$ . Αντίστροφα είναι προφανές ότι κάθε διάνυσμα  $\vec{x} \in \text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)$  ανήκει στον πυρήνα της  $h$ . Έτσι  $\text{Ker}(h) = \text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)$ .
- (5) (α) ( $\implies$ ) Έστω ότι η  $h$  είναι επιμορφισμός, δηλαδή  $\text{Im}(h) = \mathbb{K}^2$ . Τότε από την Θεμελιώδη Εξίσωση Διαστάσεων για την  $h$ , θα έχουμε  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(h) + \dim_{\mathbb{K}} \mathbb{K}^2$  και άρα  $n = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(h) + 2$ , δηλαδή:

$$\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)) = n - 2 \quad (**)$$

Επίσης θα έχουμε:

$$\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f) + \text{Ker}(g)) = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(f) + \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(g) - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)) \quad (***)$$

Επομένως

$$\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f) + \text{Ker}(g)) = n - 1 + n - 1 - (n - 2) = n$$

Επειδή ο υπόχωρος  $\text{Ker}(f) + \text{Ker}(g)$  του  $\mathcal{E}$  έχει ίδια διάσταση με τον  $\mathcal{E}$ , έπεται ότι:  $\text{Ker}(f) + \text{Ker}(g) = \mathcal{E}$ .

- (β) ( $\impliedby$ ) Από την Θεμελιώδη Εξίσωση Διαστάσεων για την  $h$ , θα έχουμε  $n = \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{E} = \dim_{\mathbb{K}} \text{Ker}(h) + \dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(h)$  και άρα:

$$\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(h) = n - \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)) \quad (***)$$

Από την υπόθεση ότι  $\text{Ker}(f) + \text{Ker}(g) = \mathcal{E}$ , θα έχουμε  $n = \dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f) + \text{Ker}(g))$ . Άρα χρησιμοποιώντας την (\*\*\*) θα έχουμε

$$\dim_{\mathbb{K}}(\text{Ker}(f) \cap \text{Ker}(g)) = n - 1 + n - 1 - n = n - 2$$

καιότε χρησιμοποιώντας την (\*\*\*), θα έχουμε:

$$\dim_{\mathbb{K}} \text{Im}(h) = n - (n - 2) = 2$$

Επειδή ο υπόχωρος  $\text{Im}(h)$  του  $\mathbb{K}^2$  έχει ίδια διάσταση 2 με τον  $\mathbb{K}^2$ , έπεται ότι:  $\text{Im}(h) = \mathbb{K}^2$ , δηλαδή η  $h$  είναι επιμορφισμός.  $\square$

## Μέρος 7. Θεωρητικά Θέματα

### 51. Ορίζουσα Γενικευμένων άνω Τριγωνικών Πινάκων

**Πρόταση.** Θεωρούμε τον  $n \times n$  πίνακα  $A$  ο οποίος είναι τής μορφής:

$$\begin{pmatrix} B & C \\ \mathbb{O} & D \end{pmatrix},$$

όπου  $B \in M_{r \times r}(\mathbb{K})$ ,  $\mathbb{O} \in M_{(n-r) \times r}(\mathbb{K})$ ,  $C \in M_{r \times (n-r)}(\mathbb{K})$ ,  $D \in M_{(n-r) \times (n-r)}(\mathbb{K})$ .

Να δειχθεί ότι  $\det A = \det B \det D$ .

*Απόδειξη.* Γενικά εκτελώντας σε έναν πίνακα  $\Omega$ , ορισμένες εναλλαγές γραμμών ή/και προσθέτοντας πολλαπλάσια γραμμών σε άλλες μπορούμε να σχηματίσουμε έναν άνω τριγωνικό πίνακα  $\Omega'$  με  $\det \Omega = (-1)^\epsilon \det \Omega'$ , όπου το  $\epsilon = 1$ , όταν το πλήθος από τις εναλλαγές των γραμμών είναι άρτιο και  $\epsilon = -1$ , όταν το πλήθος από τις εναλλαγές είναι περιττό.

Αυτό γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως κατά τη μετατροπή ενός πίνακα σε  $\gamma$ -κλιμακωτή μορφή, χωρίς όμως την απαίτηση το πρώτο στοιχείο κάθε μη μηδενικής γραμμής να ισούται με 1. Έτσι δεν χρειάζεται να πολλαπλασιάσουμε κάποια γραμμή με ένα μη μηδενικό στοιχείο, αφού τότε θα δεν θα ήταν εύκολο να παρακοιλουθούμε τις αλληλαγές στην τιμή της ορίζουσας. Σε σχέση με την παρατήρηση αυτή σκεφτείτε ότι ένας  $\gamma$ -κλιμακωτός  $n \times n$  πίνακας είναι ένας ειδικού τύπου άνω τριγωνικός πίνακας και αντίστροφα ένας άνω τριγωνικός πίνακας μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε έναν  $\gamma$ -κλιμακωτό.

Ας προχωρήσουμε τώρα στην απόδειξη τής συγκεκριμένης άσκησης.

Επί των πρώτων  $r$  γραμμών του πίνακα  $A$  εκτελούμε εναλλαγές γραμμών ή/και προσθέτουμε πολλαπλάσια γραμμών σε άλλες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε στη θέση του  $B$  να προκύψει ένας άνω τριγωνικός πίνακας  $B'$ . Έτσι από τον  $A$  έχει προκύψει ο

$$A' = \begin{pmatrix} B' & C' \\ \mathbb{O} & D \end{pmatrix}.$$

Λόγω των εναλλαγών στις  $r$  γραμμές του  $A$  έχουμε:  $\det A' = (-1)^{\epsilon_1} \det A$  καθώς επίσης και  $\det B' = (-1)^{\epsilon_1} \det B$ ,  $\epsilon_1 = \pm 1$ .

Επί των τελευταίων  $n - r$  γραμμών του πίνακα  $A'$  εκτελούμε εναλλαγές γραμμών ή/και προσθέτουμε πολλαπλάσια γραμμών σε άλλες, κατά τέτοιο τρόπο ώστε στη θέση του  $D$  να προκύψει ένας άνω τριγωνικός πίνακας  $D'$ . Έτσι από τον  $A'$  έχει προκύψει ο

$$A'' = \begin{pmatrix} B' & C' \\ \mathbb{O} & D' \end{pmatrix}.$$

Λόγω των εναλλαγών στις  $n - r$  γραμμές του  $A'$  έχουμε:  $\det A'' = (-1)^{\epsilon_2} \det A'$  καθώς επίσης και  $\det D' = (-1)^{\epsilon_2} \det D$ ,  $\epsilon_2 = \pm 1$ .

Έχουμε  $\det A = (-1)^{\epsilon_1} (-1)^{\epsilon_2} \det A''$ ,  $\det B = (-1)^{\epsilon_1} \det B'$ ,  $\det D = (-1)^{\epsilon_2} \det D'$ .

Αλλά ο  $A''$  είναι άνω τριγωνικός, αφού οι  $B'$  και  $D'$  είναι άνω τριγωνικοί. Επομένως,  $\det A'' = \det B' \det D'$  (ως γινόμενο των στοιχείων τής κύριας διαγωνίου). Συνεπώς,

$$\det A = (-1)^{\epsilon_1} (-1)^{\epsilon_2} \det A'' = (-1)^{\epsilon_1} (-1)^{\epsilon_2} \det B' \det D' = \det B \det D. \quad \square$$

## 52. Βαθμίδα Γραμμών και Βαθμίδα Στηλών

Για κάθε πίνακα  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ , συμβολίζουμε με  $\sigma(A)$  την βαθμίδα στηλών του και με  $\gamma(A)$  την βαθμίδα γραμμών του.

**Θεώρημα.** Έστω  $A \in M_{m \times n}(\mathbb{K})$ . Τότε:

$$\sigma(A) = \gamma(A)$$

Απόδειξη. Θεωρούμε του υπόχωρου του  $\mathbb{K}_m$ :

$$\mathcal{R} := \{A \cdot X \in \mathbb{K}_m \mid X \in \mathbb{K}_n\} \quad \text{και} \quad \mathcal{S} := \{{}^t AA \cdot X \in \mathbb{K}_m \mid X \in \mathbb{K}_n\}$$

Τότε  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{R} = \sigma(A)$  και  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{S} = \sigma({}^t AA)$ . Επειδή  $\mathcal{S} \subseteq \{{}^t AY \in \mathbb{K}_n \mid Y \in \mathbb{K}_m\}$ , θα έχουμε:  $\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{S} = \sigma({}^t AA) \leq \dim_{\mathbb{K}} \{{}^t AY \in \mathbb{K}_n \mid Y \in \mathbb{K}_m\} = \sigma({}^t A) = \gamma(A)$ , και άρα:

$$\dim_{\mathbb{K}} \mathcal{S} \leq \gamma(A) \tag{1}$$

Έστω  $\{AX_1, \dots, AX_r\}$  μια βάση του  $\mathcal{R}$ , οπότε  $r = \sigma(A)$ . Έστω  $\lambda_1 {}^t AA X_1 + \dots + \lambda_r {}^t AA X_r = 0$ . Τότε  ${}^t AA(\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_r X_r) = 0$  και έστω  $Y = \lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_r X_r$ . Τότε  ${}^t(A \cdot Y)(A \cdot Y) = {}^t Y \cdot {}^t A \cdot A \cdot Y = 0$ . Προφανώς όμως μια στήλη  $Z = AY$  ικανοποιεί την  ${}^t Z \cdot Z = 0$  αν και μόνον αν  $Z = 0$ . Επομένως  $A \cdot Y = 0$  και άρα  $A(\lambda_1 X_1 + \dots + \lambda_r X_r) = 0 \implies \lambda_1 AX_1 + \dots + \lambda_r AX_r = 0 \implies \lambda_1 = \dots = \lambda_r = 0$  λόγω γραμμικής ανεξαρτησίας των  $AX_1, \dots, AX_r$ . Επομένως το υποσύνολο  $\{{}^t AA X_1, \dots, {}^t AA X_r\}$  του  $\mathcal{S}$  είναι γραμμικά ανεξάρτητο και άρα  $r \leq \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{S}$ . Από την (1):

$$\sigma(A) = r \leq \dim_{\mathbb{K}} \mathcal{S} = \sigma(A) = \gamma(A) \tag{2}$$

Δουλεύοντας με γραμμές θα έχουμε:  $\gamma(A) \leq \sigma(A)$  και άρα:  $\gamma(A) = \sigma(A)$ .  $\square$

Σύμφωνα με το παραπάνω Θεώρημα μπορούμε να ορίσουμε την βαθμίδα  $\mathbf{r}(A)$  κάθε πίνακα  $A$  ως την κοινή τιμή:

$$\mathbf{r}(A) := \sigma(A) = \gamma(A)$$