

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ Β' (Μ-Ω)

ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ 8

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Μπεληγιάννης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

<http://users.uoi.gr/abeligia/LinearAlgebraII2023/LAII2023.html>

Παρασκευή 5 Μαΐου 2023

Άσκηση 1. Θεωρούμε τον πίνακα πραγματικών αριθμών

$$A = \begin{pmatrix} a & 4 & 4 \\ 4 & 8 & 8 \\ 4 & 8 & b \end{pmatrix}$$

- (1) Να προσδιορισθούν οι αριθμοί a, b , έτσι ώστε ο πίνακας A να έχει ως ιδιοτιμή το 0 με πολλαπλότητα 2.
- (2) Για τις τιμές των a, b που θα βρείτε, να υπολογίσετε ορθογώνιο πίνακα P έτσι ώστε ο πίνακας ${}^t P \cdot A \cdot P$ να είναι διαγώνιος.
- (3) Να υπολογίσετε τον πίνακα A^m , $\forall m \geq 1$.

Λύση. (1) Ο πίνακας A είναι συμμετρικός και άρα διαγωνοποιείται.

Προφανώς το $\lambda = 0$ είναι ιδιοτιμή του A αν και μόνον αν το ομογενές σύστημα

$$\begin{pmatrix} a & 4 & 4 \\ 4 & 8 & 8 \\ 4 & 8 & b \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\Sigma)$$

έχει μη-μηδενικές λύσεις. Επιπλέον επειδή ο ιδιοχώρος $\mathcal{V}_A(0)$ ο οποίος αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή $\lambda = 0$ συμπίπτει με το σύνολο λύσεων $\Lambda(\Sigma)$ του (Σ) , θα έχουμε ότι: ο πίνακας A ως ιδιοτιμή το 0 με πολλαπλότητα 2 αν και μόνον αν

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}_A(0) = 2 \iff \dim_{\mathbb{R}} \Lambda(\Sigma) = 2 \iff 3 - r(A) = 2 \iff r(A) = 1$$

Γνωρίζουμε όμως ότι η βαθμίδα ενός 3×3 πίνακα είναι ίση με 1 αν και μόνον αν υπάρχει ένα μη-μηδενικό στοιχείο του πίνακα και όλες οι 2×2 ελάσσονες ορίζουσες που το περιβάλλουν είναι ίσες με μηδέν. Επομένως $r(A) = 1$ αν και μόνον αν οι ακόλουθες ελάσσονες ορίζουσες δεύτερης τάξης του πίνακα A είναι μηδέν:

$$\left\{ \begin{array}{l} \begin{vmatrix} a & 4 \\ 4 & 8 \end{vmatrix} = 8a - 16 = 0 \implies a = 2 \\ \text{και} \\ \begin{vmatrix} 8 & 8 \\ 8 & b \end{vmatrix} = 8b - 64 = 0 \implies b = 8 \end{array} \right.$$

Συνοπώς δείξαμε ότι:

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}_A(0) = 2 \iff a = 2 \text{ και } b = 8$$

- (2) Για τις τιμές $a = 2$ και $b = 8$, ο πίνακας A παίρνει την μορφή

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 4 & 8 & 8 \\ 4 & 8 & 8 \end{pmatrix}$$

Υπολογίζουμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A . Έχουμε:

$$\begin{aligned}
P_A(t) &= \begin{vmatrix} 2-t & 4 & 4 \\ 4 & 8-t & 8 \\ 4 & 8 & 8-t \end{vmatrix} \xrightarrow{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 - \Sigma_3} \begin{vmatrix} 2-t & 0 & 4 \\ 4 & -t & 8 \\ 4 & t & 8-t \end{vmatrix} = t \begin{vmatrix} 2-t & 0 & 4 \\ 4 & -1 & 8 \\ 4 & 1 & 8-t \end{vmatrix} \\
&\xrightarrow{\Gamma_2 \rightarrow \Gamma_2 + \Gamma_3} t \begin{vmatrix} 2-t & 0 & 4 \\ 8 & 0 & 16-t \\ 4 & 1 & 8-t \end{vmatrix} = (-t) \begin{vmatrix} 2-t & 4 \\ 8 & 16-t \end{vmatrix} = (-t)((2-t)(16-t) - 32) \\
&= (-t)(t^2 - 18t) = -t^2(t - 18)
\end{aligned}$$

Συνεπώς οι ιδιοτιμές είναι $\lambda_1 = 0$ πολλαπλότητας δύο (όπως ακριβώς περιμέναμε) και $\lambda_2 = 18$ πολλαπλότητας ένα.

- Για τον ιδιόχωρο $\mathcal{V}_A(0)$ λύνουμε το παρακάτω ομογενές σύστημα:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 4 & 8 & 8 \\ 4 & 8 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x = -2y - 2z$$

και άρα

$$\begin{aligned}
\mathcal{V}_A(0) &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x = -2y - 2z \right\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} -2y - 2z \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid y, z \in \mathbb{R} \right\} \\
&= \left\{ y \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid y, z \in \mathbb{R} \right\} \\
&= \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)
\end{aligned}$$

Το σύνολο $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ αποτελεί προφανώς μια βάση του ιδιόχωρου $\mathcal{V}_A(0)$ η οποία δεν είναι ορθογώνια διότι

$$\left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle = 4 \neq 0$$

Για να προσδιορίσουμε μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(0)$ εφαρμόζουμε τη διαδικασία Gram-Schmidt.

Διαδικασία Gram-Schmidt:

Θέτουμε $X_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ και $X_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Τότε $Y_1 = X_1 = (-2, 1, 0)$ και

$$\begin{aligned}
Y_2 = X_2 - \frac{\langle X_2, Y_1 \rangle}{\langle Y_1, Y_1 \rangle} \cdot Y_1 &= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{5} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Υπολογίζουμε τα μέτρα των διανυσμάτων Y_1 και Y_2 :

$$\begin{aligned}
\|Y_1\| &= \left\| \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{5} \\
\|Y_2\| &= \left\| \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{2}{5} \\ -\frac{4}{5} \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{\frac{45}{25}} = \frac{3}{\sqrt{5}}
\end{aligned}$$

Επομένως μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(0)$ είναι η

$$\left\{ F_1 = \frac{Y_1}{\|Y_1\|}, F_2 = \frac{Y_2}{\|Y_2\|} \right\} = \left\{ \left(\begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{2}{3\sqrt{5}} \\ -\frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix} \right) \right\}$$

- Για τον ιδιόχωρο $\mathcal{V}_A(18)$ έχουμε το σύστημα:

$$\begin{pmatrix} -16 & 4 & 4 \\ 4 & -10 & 8 \\ 4 & 8 & -10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -4x + y + z = 0 \\ 2x - 5y + 4z = 0 \\ 2x + 4y - 5z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} -4x + y + z = 0 \\ 2x - 5y + 4z = 0 \end{cases}$$

Αν λύσουμε τη πρώτη εξίσωση ως προς y και αντικαταστήσουμε στη δεύτερη βρίσκουμε $2x = z$ και τότε έπεται ότι $y = z$. Άρα

$$\begin{aligned}
\mathcal{V}_A(18) &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x = \frac{z}{2} \text{ και } y = z \right\} \\
&= \left\{ \begin{pmatrix} \frac{z}{2} \\ z \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid z \in \mathbb{R} \right\} \\
&= \left\{ z \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid z \in \mathbb{R} \right\} \\
&= \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)
\end{aligned}$$

Επομένως μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(18)$ είναι το σύνολο

$$\{F_3\} = \left\{ \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\|} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{pmatrix} \right\}$$

Τότε έχουμε τον ορθογώνιο πίνακα

$$P = (F_1 \ F_2 \ F_3) = \begin{pmatrix} -\frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

για τον οποίο ισχύει ότι:

$${}^tP \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} \implies A = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} \cdot {}^tP$$

(3) Για κάθε $m \geq 1$ έχουμε:

$$A = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix} \cdot {}^tP \implies A^m = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 18 \end{pmatrix}^m \cdot {}^tP = \dots = 18^{m-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 4 & 4 \\ 4 & 8 & 8 \\ 4 & 8 & 8 \end{pmatrix} = 18^{m-1}A \quad \square$$

Άσκηση 2. Να προσδιορισθεί ο αριθμός a έτσι ώστε ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & -a \\ a & 4 & -4 \\ -a & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

να είναι μη-αρνητικός. Ακολουθώντας να βρεθούν οι τιμές του a για τις οποίες ο πίνακας A είναι μη-αρνητικός και έχει μια ιδιοτιμή με πολλαπλότητα ίση με 2, και για τις τιμές αυτές να βρεθεί ορθογώνιος πίνακας P έτσι ώστε ${}^tP \cdot A \cdot P$ να είναι διαγώνιος.

Λύση. Παρατηρούμε ότι ο πίνακας A είναι συμμετρικός. Ο πίνακας A είναι μη-αρνητικός αν και μόνο αν οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι ≥ 0 .

Έχουμε:

$$\begin{aligned} P_A(t) &= \begin{vmatrix} 1-t & a & a \\ a & 4-t & -4 \\ -a & -4 & 4-t \end{vmatrix} \xrightarrow{\Gamma_3 \rightarrow \Gamma_3 + \Gamma_2} \begin{vmatrix} 1-t & a & -a \\ a & 4-t & -4 \\ 0 & -t & -t \end{vmatrix} = (-t) \begin{vmatrix} 1-t & a & -a \\ a & 4-t & -4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 - \Sigma_3} (-t) \begin{vmatrix} 1-t & 2a & -a \\ a & 8-t & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (-t) \begin{vmatrix} 1-t & 2a \\ a & 8-t \end{vmatrix} = (-t)(t^2 - 9t + 8 - 2a^2) \\ &= (-t) \left(t - \left(\frac{9}{2} + \frac{\sqrt{49 + 8a^2}}{2} \right) \right) \left(t - \left(\frac{9}{2} - \frac{\sqrt{49 + 8a^2}}{2} \right) \right) \end{aligned}$$

Επομένως έχουμε τις ιδιοτιμές:

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = \frac{9}{2} + \frac{\sqrt{49 + 8a^2}}{2} > 0, \quad \lambda_3 = \frac{9}{2} - \frac{\sqrt{49 + 8a^2}}{2}$$

και πρέπει $\lambda_3 \geq 0$, δηλαδή

$$9 \geq \sqrt{49 + 8a^2} \implies 81 \geq 49 + 8a^2 \implies 8a^2 \leq 32 \implies a^2 \leq 4 \implies (a+2)(a-2) \leq 0 \\ \implies -2 \leq a \leq 2$$

Άρα ο πίνακας A είναι μη-αρνητικός αν και μόνο αν: $-2 \leq a \leq 2$.

Ο πίνακας A είναι μη-αρνητικός και, επειδή $\lambda_2 > 0$, έχει διπλή ιδιοτιμή αν είτε $\lambda_3 = \lambda_1 = 0$ είτε $\lambda_2 = \lambda_3$. Όμως $\lambda_3 = 0$ αν και μόνον αν $\sqrt{49 + 8a^2} = 9$ αν και μόνον αν $8a^2 = 32$ αν και μόνον αν $a = \pm 2$. Επίσης $\lambda_2 \neq \lambda_3$ διότι διαφορετικά θα έχουμε $\sqrt{49 + 8a^2} = 0$, δηλαδή $0 = 49 + 8a^2 \geq 49$ το οποίο είναι άτοπο. Άρα ο πίνακας A είναι θετικός και έχει διπλή ιδιοτιμή το $\lambda = 0$ αν και μόνον αν $a = \pm 2$, και τότε ο A έχει το $\lambda = 0$ ως ιδιοτιμή με πολλαπλότητα ίση με 2 και το $\lambda = 9$ ως ιδιοτιμή με πολλαπλότητα ίση με 1.

(1) Αν $a = 2$, τότε:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

Με τη συνήθη διαδικασία βλέπουμε εύκολα ότι το σύνολο:

$$\left\{ F_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, F_2 = \frac{\sqrt{5}}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

είναι μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(0)$, και το σύνολο

$$\left\{ F_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

είναι μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(9)$.

Τότε ο πίνακας

$$P = (F_1 \ F_2 \ F_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{4}}{3} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

είναι ορθογώνιος και ισχύει ότι:

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \implies A = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \cdot {}^t P$$

Μια τετραγωνική ρίζα του A είναι τότε ο πίνακας

$$\sqrt{A} = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot {}^t P = \dots = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

(2) Αν $a = -2$, τότε:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ -2 & -4 & 4 \end{pmatrix}$$

Με τη συνήθη διαδικασία βλέπουμε εύκολα ότι το σύνολο:

$$\left\{ F_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, F_2 = \frac{\sqrt{5}}{3} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

είναι μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(0)$, και το σύνολο

$$\left\{ F_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

είναι μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(9)$.

Τότε ο πίνακας

$$Q = (F_1 \ F_2 \ F_3) = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & -\frac{2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

είναι ορθογώνιος και ισχύει ότι:

$${}^t Q \cdot A \cdot Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \implies A = Q \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \cdot {}^t Q$$

Μια τετραγωνική ρίζα του A είναι τότε ο πίνακας

$$\sqrt{A} = Q \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot {}^t Q = \dots = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \square$$

Άσκηση 3. Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} \frac{9}{2} & 0 & -\frac{7}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ -\frac{7}{2} & 0 & \frac{9}{2} \end{pmatrix}$$

Να βρεθεί πίνακας $B \in M_3(\mathbb{R})$, έτσι ώστε:

$$B^3 = A$$

Λύση. Έχουμε:

$$\begin{aligned} P_A(t) &= \begin{vmatrix} \frac{9}{2} - t & 0 & -\frac{7}{2} \\ 0 & -1 - t & 0 \\ -\frac{7}{2} & 0 & \frac{9}{2} - t \end{vmatrix} = (-1 - t) \begin{vmatrix} \frac{9}{2} - t & -\frac{7}{2} \\ -\frac{7}{2} & \frac{9}{2} - t \end{vmatrix} = (-1 - t) \left(\left(\frac{9}{2} - t \right)^2 - \frac{49}{4} \right) \\ &= (-1 - t) \left(\frac{9}{2} - t + \frac{7}{2} \right) \left(\frac{9}{2} - t - \frac{7}{2} \right) = (-1 - t)(8 - t)(1 - t) = -(t + 1)(t - 8)(t - 1) \end{aligned}$$

Άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 8, \quad \lambda_3 = -1$$

πολλαπλότητας ένα. Στη συνέχεια υπολογίζουμε εύκολα ορθοκανονικές βάσεις για τους αντίστοιχους ιδιοχώρους. Βρίσκουμε:

$$\mathcal{V}_A(1) = \left\{ x \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \right)$$

$$\mathcal{V}_A(-1) = \left\{ x \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$\mathcal{V}_A(8) = \left\{ x \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \right)$$

Θέτουμε

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

αποκτούμε έναν ορθογώνιο πίνακα P έτσι ώστε

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \implies A = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \cdot {}^t P$$

Θέτουμε

$$B = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot {}^t P = \dots = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Τότε

$$B^3 = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^3 \cdot {}^t P = P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix} \cdot {}^t P = A \quad \square$$

Άσκηση 4. Έστω A ένας $n \times n$ συμμετρικός πίνακας πραγματικών αριθμών. Αν οι ιδιοτιμές του A είναι οι αριθμοί 1 και -1 , να δείχθει ότι:

$$A^2 = I_n$$

Ισχύει το αντίστροφο; Πότε ο πίνακας A είναι θετικός;

Λύση. Επειδή ο πίνακας A είναι συμμετρικός, από το Φασματικό Θεώρημα, υπάρχει ορθογώνιος πίνακας P έτσι ώστε

$${}^t P \cdot A \cdot P = \Delta$$

όπου Δ είναι ένας διαγώνιος πίνακας, και τα διαγώνια στοιχεία του είναι οι αριθμοί 1 και -1 . Προφανώς τότε θα έχουμε $\Delta^2 = I_n$ και τότε:

$$({}^t P \cdot A \cdot P)^2 = (\Delta)^2 \implies {}^t P \cdot A^2 \cdot P = I_n \implies A^2 = P \cdot I_n \cdot {}^t P = P \cdot {}^t P = I_n$$

Αντίστροφα, έστω A ένας συμμετρικός πίνακας για τον οποίο ισχύει ότι $A^2 = I_n$. Θεωρούμε το πολυώνυμο $P(t) = t^2 - 1$. Τότε προφανώς $P(A) = A^2 - I_n = O$, και επομένως το ελάχιστο πολυώνυμο $Q_A(t)$ διαιρεί το πολυώνυμο $P(t) = t^2 - 1 = (t - 1)(t + 1)$. Άρα το ελάχιστο πολυώνυμο $Q_A(t)$ είναι ένα εκ των:

$$t - 1, \quad t + 1, \quad (t - 1)(t + 1)$$

Αν $Q_A(t) = t - 1$, τότε $A = I_n$ και όλες οι ιδιοτιμές του A είναι ίσες με 1. Αν $Q_A(t) = t + 1$, τότε $A = -I_n$ και όλες οι ιδιοτιμές του A είναι ίσες με -1 . Τέλος, αν $Q_A(t) = (t - 1)(t + 1)$, τότε, επειδή το ελάχιστο πολυώνυμο και το χαρακτηριστικό πολυώνυμο έχουν τις ίδιες ρίζες, έπεται ότι οι ιδιοτιμές του A είναι ίσες με 1 ή -1 .

Ο πίνακας A είναι θετικός αν και μόνον αν όλες οι ιδιοτιμές του είναι θετικές. Επειδή οι ιδιοτιμές του A είναι ± 1 , αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν η μόνη ιδιοτιμή του A είναι η $\lambda = 1$. Από τα παραπάνω έπεται ότι ο A είναι θετικός αν και μόνον αν $Q_A(t) = t - 1$ και αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν $A = I_n$. Με άλλα λόγια δείξαμε ότι:

$$A = I_n \iff {}^t A = A > 0 \text{ και } A^2 = I_n \quad \square$$

Άσκηση 5. Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- (1) Να δείξετε ότι ο πίνακας A είναι μη-αρνητικός.
- (2) Να βρείτε μια τετραγωνική ρίζα του A .

Λύση. Εύκολα βλέπουμε ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A είναι:

$$P_A(t) = -t^2(t - 3)$$

Άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι οι: $\lambda_1 = 0$ με πολλαπλότητα ίση με 2, και $\lambda = 3$ με πολλαπλότητα ίση με 1. Επομένως ο συμμετρικός πίνακας A είναι μη-αρνητικός.

Υπολογίζουμε εύκολα μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(0)$ είναι το σύνολο

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

και μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(3)$ είναι το σύνολο

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Άρα θέτοντας

$$P = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

αποκτούμε ένα ορθογώνιο πίνακα έτσι ώστε:

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Τότε μια τετραγωνική ρίζα του A είναι ο πίνακας

$$\sqrt{A} = P \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \cdot {}^t P = \dots = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{3}} A$$

□

Άσκηση 6. Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(1) Να δείξετε ότι ο πίνακας A είναι θετικός.

(2) Να βρείτε συμμετρικό και αντιστρέψιμο πίνακα B έτσι ώστε: $A = B^2$.

Λύση. Έχουμε:

$$P_A(t) = \begin{vmatrix} 3-t & 0 & -1 \\ 0 & 2-t & 0 \\ -1 & 0 & 3-t \end{vmatrix} = (2-t) \begin{vmatrix} 3-t & -1 \\ -1 & 3-t \end{vmatrix} = \dots = -(t-2)^2(t-4)$$

Άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι: $\lambda_1 = 2 > 0$ πολλαπλότητας δυο και $\lambda_2 = 4 > 0$ πολλαπλότητας ένα. Επομένως ο πίνακας A είναι θετικός.

Στη συνέχεια υπολογίζουμε εύκολα ορθοκανονικές βάσεις για τους αντίστοιχους ιδιοχώρους. Θα έχουμε:

$$\mathcal{V}_A(2) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ x \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + y \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x, y \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Το σύνολο διανυσμάτων

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

αποτελεί μια βάση του ιδιοχώρου $\mathcal{V}_A(2)$ η οποία όπως παρατηρούμε είναι ορθογώνια. Άρα μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(2)$ είναι το σύνολο

$$\left\{ F_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, F_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Για τον ιδιοχώρο $\mathcal{V}_A(4)$ θα έχουμε:

$$\mathcal{V}(4) = \left\{ \begin{pmatrix} -x \\ 0 \\ x \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ x \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

και άρα μια ορθοκανονική βάση του ιδιοχώρου $\mathcal{V}_A(4)$ είναι η εξής:

$$\left\{ F_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Θέτοντας

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

αποκτούμε έναν ορθογώνιο πίνακα για τον οποίο ισχύει ότι:

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \implies A = P \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot {}^t P$$

Θεωρούμε τον πίνακα

$$B = P \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot {}^t P = \dots = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} + 1 \end{pmatrix}$$

ο οποίος είναι συμμετρικός και αντιστρέψιμος διότι

$$|B| = |P| \cdot \begin{vmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} \cdot |{}^t P| = 4 \neq 0$$

Τότε

$$B^2 = P \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^2 \cdot {}^t P = P \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot {}^t P = A$$

και άρα βρήκαμε ένα συμμετρικό και αντιστρέψιμο πίνακα $B \in M_3(\mathbb{R})$, έτσι ώστε: $B^2 = A$. □

Άσκηση 7. Έστω A ένας 4×4 συμμετρικός πίνακας πραγματικών αριθμών. Υποθέτουμε ότι:

(1) Ο αριθμός 1 είναι ιδιοτιμή του A με αντίστοιχο ιδιοδιάνυσμα

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

(2) Ο αριθμός 2 είναι ιδιοτιμή του A , και $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}(2) = 3$.

Να βρεθεί ο πίνακας A .

Λύση. Επειδή ο πίνακας A είναι συμμετρικός, από το Φασματικό Θεώρημα έπεται ότι ο πίνακας A είναι διαγωνοποιήσιμος. Προφανώς ο ιδιοχώρος $\mathcal{V}_A(1)$ έχει διάσταση ίση με 1 και μια βάση του είναι το διάνυσμα

$$G_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

και μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(1)$ είναι το διάνυσμα

$$F_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Επειδή ο πίνακας A είναι διαγωνοποιήσιμος και ο αριθμός 2 είναι ιδιοτιμή του A , και $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}(2) = 3$, έπεται ότι η πολλαπλότητα της ιδιοτιμής $\lambda = 2$ είναι ίση με 3. Έστω $\{F_2, F_3, F_4\}$ μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(2)$. Επειδή οι ιδιοτιμές 1 και 2 είναι διαφορετικές έπεται ότι τα αντίστοιχα ιδιοδιανύσματα είναι ορθογώνια, και επομένως:

$$\langle F_1, F_2 \rangle = \langle F_1, F_3 \rangle = \langle F_1, F_4 \rangle = 0$$

Άρα το σύνολο $\{F_1, F_2, F_3, F_4\}$ είναι μια ορθοκανονική βάση του \mathbb{R}_4 , και ιδιαίτερα έχουμε ότι:

$$\mathcal{V}_A(1)^\perp = \mathcal{V}_A(2)$$

Έστω $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \in \mathcal{V}_A(2)$. Τότε $X \in \mathcal{V}_A(1)^\perp$, δηλαδή θα έχουμε:

$$\langle F_1, X \rangle = 0 \implies \left\langle \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} \right\rangle = 0 \implies \frac{1}{\sqrt{6}}(-x + 2y - w) = 0 \implies w = -x + 2y$$

Άρα

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ -x + 2y \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

και επομένως

$$\mathcal{V}_A(2) = \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_4 \mid x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$$

Προφανώς το σύνολο στηλών

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

αποτελεί μια βάση του $\mathcal{V}_A(2)$ η οποία δεν είναι ορθοκανονική διότι αν και

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle = 0 = \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$$

έχουμε:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = -2$$

Εφαρμόζοντας τη διαδικασία Gram-Schmidt προκύπτει ότι μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(2)$ είναι το σύνολο

$$\left\{ F_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, F_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, F_4 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$$

Επομένως θα έχουμε ότι το σύνολο $\{F_1, F_2, F_3, F_4\}$ είναι μια ορθοκανονική βάση του \mathbb{R}_4 . Τότε ο πίνακας

$$P = (F_1 F_2 F_3 F_4) = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} & 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1/\sqrt{6} & 0 & 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

είναι ένας ορθογώνιος πίνακας έτσι ώστε:

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Τότε θα έχουμε:

$$\begin{aligned} A &= P \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot {}^t P = \\ &= \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} & 0 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{6} & 0 & 1/\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1/\sqrt{6} & 0 & 2/\sqrt{5} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} & 2/\sqrt{6} & 0 & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{5} & 0 & 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{2} & 0 & 0 & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 7/6 & -1/3 & 0 & -5/6 \\ -1/3 & 16/15 & 0 & 7/15 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -5/6 & 7/15 & 0 & 83/30 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Επομένως ο συμμετρικός πίνακας A είναι ο

$$A = \begin{pmatrix} 7/6 & -1/3 & 0 & -5/6 \\ -1/3 & 16/15 & 0 & 7/15 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -5/6 & 7/15 & 0 & 83/30 \end{pmatrix}$$

□

Άσκηση 8. Να αναχθεί η τετραγωνική μορφή

$$q : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad q(x, y, z) = \frac{7}{2}x^2 + \frac{7}{2}y^2 + 5z^2 - xy - 2xz + 2yz$$

σους κύριους άξονές της, οι οποίοι και να βρεθούν.

Λύση. Ο πίνακας της τετραγωνικής μορφής q είναι

$$A = \begin{pmatrix} \frac{7}{2} & -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} & 1 \\ -1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Υπολογίζουμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A . Έχουμε:

$$\begin{aligned} P_A(t) &= \begin{vmatrix} \frac{7}{2} - t & -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} - t & 1 \\ -1 & 1 & 5 - t \end{vmatrix} \xrightarrow{\Gamma_1 \rightarrow \Gamma_1 + \Gamma_2} \begin{vmatrix} 3 - \lambda & 3 - t & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} - t & 1 \\ -1 & 1 & 5 - t \end{vmatrix} = (3 - t) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} - t & 1 \\ -1 & 1 & 5 - t \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2 - \Sigma_1} (3 - t) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 4 - t & 1 \\ -1 & 2 & 5 - t \end{vmatrix} = (3 - t) \begin{vmatrix} 4 - t & 1 \\ 2 & 5 - t \end{vmatrix} = (3 - t)((4 - t)(5 - t) - 2) \\ &= (3 - t)(t^2 - 9t + 18) = -(t - 3)^2(t - 6) \end{aligned}$$

Άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι $\lambda_1 = 3$ πολλαπλότητας δυο και $\lambda_2 = 6$ πολλαπλότητας ένα.

Για τον ιδιόχωρο $\mathcal{V}_A(3)$ λύνουμε το παρακάτω ομογενές σύστημα:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} x - y - 2z = 0 \\ -x + y + 2z = 0 \\ -x + y + 2z = 0 \end{cases} \implies x = y + 2z$$

και άρα

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_A(3) &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x = y + 2z \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} y + 2z \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid y, z \in \mathbb{R} \right\} \\ &= \left\{ y \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid y, z \in \mathbb{R} \right\} \implies \mathcal{V}_A(3) = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Το παραπάνω σύνολο διανυσμάτων αποτελεί μια βάση του ιδιόχωρου $\mathcal{V}_A(3)$ η οποία όμως δεν είναι ορθογώνια. Για να βρούμε μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(3)$ εφαρμόζουμε τη διαδικασία Gram-Schmidt:

Διαδικασία Gram-Schmidt:

Θέτουμε $X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ και $X_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Τότε $Y_1 = X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ και

$$\begin{aligned} Y_2 &= X_2 - \frac{\langle X_2, Y_1 \rangle}{\langle Y_1, Y_1 \rangle} \cdot Y_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\left\langle \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle}{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Υπολογίζουμε τα μέτρα των διανυσμάτων \vec{y}_1 και \vec{y}_2 :

$$\|Y_1\| = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{2}$$

$$\|\vec{y}_2\| = \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle} = \sqrt{3}$$

Τότε μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(3)$ είναι

$$\left\{ F_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, F_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Για τον ιδιόχωρο $\mathcal{V}_A(6)$ έχουμε το ομογενές σύστημα:

$$\begin{pmatrix} -\frac{5}{2} & -\frac{1}{2} & -1 \\ -\frac{1}{2} & -\frac{5}{2} & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies \begin{cases} -5x - y - 2z = 0 \\ -x - 5y + 2z = 0 \\ -x + y - z = 0 \end{cases}$$

Προσθέτοντας τις δύο πρώτες εξισώσεις βρίσκουμε $x = -y$ και αντικαθιστώντας στη τρίτη έχουμε ότι $z = 2y$. Επομένως έχουμε:

$$\mathcal{V}_A(6) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x = -y \text{ και } z = 2y \right\} = \left\{ y \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid y \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$$

και άρα μια ορθοκανονική βάση του ιδιόχωρου $\mathcal{V}(6)$ είναι

$$\left\{ F_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

Συνεπώς οι κύριοι άξονες της τετραγωνικής μορφής q είναι

$$\left\{ F_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, F_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, F_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

και η τετραγωνική μορφή q στους κύριους άξονες γράφεται ως εξής:

$$q(x', y', z') = 3(x')^2 + 3(y')^2 + 6(z')^2$$

□

Άσκηση 9. Να προσδιορισθεί το είδος των καμπύλων οι οποίες ορίζονται από τις εξισώσεις:

$$(C_1): \quad xy = 1$$

$$(C_2): \quad 5x^2 - 4xy + 8y^2 = 1$$

Λύση. Ο πίνακας της τετραγωνικής μορφής $q(x, y) = xy$ είναι

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

και το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A είναι

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - \frac{1}{4}$$

Συνεπώς έχουμε τις απλές ιδιοτιμές $\lambda_1 = \frac{1}{2}$ και $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$. Τότε στους κύριους άξονες $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ η τετραγωνική μορφή q γράφεται ως εξής:

$$q(x', y') = \frac{1}{2}(x')^2 - \frac{1}{2}(y')^2$$

και άρα η καμπύλη (C_1) : $xy = 1$ παριστάνει υπερβολή αφού

$$(C_1): \frac{1}{2}(x')^2 - \frac{1}{2}(y')^2 = 1 \implies (x')^2 - (y')^2 = 2 : \text{ υπερβολή}$$

Για τη καμπύλη (C_2) έχουμε ότι πίνακας της τετραγωνικής μορφής $q(x, y) = 5x^2 - 4xy + 8y^2$ είναι

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}$$

και υπολογίζουμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A :

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 5 - \lambda & -2 \\ -2 & 8 - \lambda \end{vmatrix} = (5 - \lambda)(8 - \lambda) - 4 = \lambda^2 - 13\lambda + 36 = (\lambda - 9)(\lambda - 4)$$

Επομένως έχουμε τις απλές ιδιοτιμές $\lambda_1 = 9$ και $\lambda_2 = 4$. Τότε στους κύριους άξονες $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ η τετραγωνική μορφή q γράφεται ως εξής:

$$q(x', y') = 9(x')^2 + 4(y')^2$$

και άρα η καμπύλη (C_2) : $5x^2 - 4xy + 8y^2 = 1$ παριστάνει έλλειψη διότι

$$(C_2): 9(x')^2 + 4(y')^2 = 1 \implies \frac{(x')^2}{(\frac{1}{3})^2} + \frac{(y')^2}{(\frac{1}{2})^2} = 1 : \text{ έλλειψη}$$

□

Άσκηση 10. Θεωρούμε την τετραγωνική μορφή

$$q: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad q(x, y, z) = 13x^2 + 24y^2 + 29z^2 + 28xy + 8xz + 36yz$$

- (1) Να αναχθεί η τετραγωνική μορφή q στους κύριους άξονές της, οι οποίοι και να βρεθούν.
- (2) Να βρεθεί το είδος της δευτεροβάθμιας επιφάνειας

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid q(x, y, z) = 1\}$$

- (3) Να δειχθεί ότι ο πίνακας A της τετραγωνική μορφής q είναι θετικός και να βρεθεί μια τετραγωνική ρίζα του A .

Λύση. Θεωρούμε τον πίνακα της τετραγωνικής μορφής q στην συνήθη (ορθοκανονική) βάση του \mathbb{R}^3 :

$$A = \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix}$$

- (1) Εύκολα υπολογίζουμε ότι το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A είναι το

$$P_A(t) = |A - tI_3| = -(t - 49)(t - 1)(t - 16)$$

Άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι οι εξής:

$$\lambda_1 = 49, \quad \lambda_2 = 1, \quad \lambda_3 = 16$$

και ιδιαίτερα έπεται ότι ο πίνακας A είναι θετικός.

Με τη συνήθη διαδικασία, έχουμε την ακόλουθη περιγραφή των αντίστοιχων ιδιοχώρων

$$\begin{aligned} \mathcal{V}_A(49) &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} \\ \mathcal{V}_A(1) &= \left\{ x \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} \\ \mathcal{V}_A(16) &= \left\{ x \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$

Επομένως τα διανύσματα

$$G_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad G_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad G_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

είναι βάσεις των ιδιοχώρων $\mathcal{V}_A(49)$, $\mathcal{V}_A(1)$, και $\mathcal{V}_A(16)$ αντίστοιχα.

Παρατηρούμε ότι τα παραπάνω διανύσματα είναι ανά δύο ορθογώνια¹, και επομένως, θέτοντας

$$\left\{ F_1 = \frac{G_1}{\|G_1\|} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad F_2 = \frac{G_2}{\|G_2\|} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad F_3 = \frac{G_3}{\|G_3\|} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

αποκτούμε μια ορθοκανονική βάση του \mathbb{R}^3 , και τα διανύσματα F_1, F_2, F_3 είναι οι κύριοι άξονες της τετραγωνικής μορφής q .

Η τετραγωνική μορφή q στους κύριους άξονες γράφεται ως εξής:

$$q(x', y', z') = 49(x')^2 + (y')^2 + 16(z')^2$$

(2) Από το μέρος (2) θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{(x', y', z') \in \mathbb{R}^3 \mid q(x', y', z') = 1\} = \{(x', y', z') \in \mathbb{R}^3 \mid 49(x')^2 + (y')^2 + 16(z')^2 = 1\} = \\ &= \left\{ (x', y', z') \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{(x')^2}{(\frac{1}{7})^2} + \frac{(y')^2}{1^2} + \frac{(z')^2}{(\frac{1}{2})^2} = 1 \right\} \end{aligned}$$

και επομένως η δευτεροβάθμια επιφάνεια \mathcal{S} είναι ένα ελλειψοειδές.

(3) Θεωρούμε τον ορθογώνιο πίνακα

$$P = (F_1 \ F_2 \ F_3) = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \\ 2/3 & 1/3 & 2/3 \end{pmatrix}$$

ο οποίος έχει την ιδιότητα

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 49 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 16 \end{pmatrix}$$

Τότε η τετραγωνική ρίζα του πίνακα A είναι ο πίνακας

$$\sqrt{A} = P \cdot \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot {}^t P = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix} \quad \square$$

Άσκηση 11. Να προσδιορισθεί το είδος της τετραγωνικής επιφάνειας η οποία ορίζεται από την εξίσωση:

$$(\mathcal{S}) : 9x^2 - 4xy + 6y^2 + 3z^2 + 2\sqrt{5}x + 4\sqrt{5}y + 12z + 16 = 0$$

Λύση. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$q : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad q(x, y, z) = 9x^2 - 4xy + 6y^2 + 3z^2$$

Τότε η απεικόνιση q είναι μια τετραγωνική μορφή της οποίας ο πίνακας είναι

$$A = \begin{pmatrix} 9 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

¹Αυτό το περιμένουμε διότι τα παραπάνω διανύσματα είναι ιδιοδιανύσματα του A τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές ιδιοτιμές του A .

Υπολογίζουμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A . Έχουμε:

$$P_A(t) = \begin{vmatrix} 9-t & -2 & 0 \\ -2 & 6-t & 0 \\ 0 & 0 & 3-t \end{vmatrix} = (3-t) \cdot \begin{vmatrix} 9-t & -2 \\ -2 & 6-t \end{vmatrix} = \dots = -(t-10) \cdot (t-5) \cdot (t-3)$$

και άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι οι εξής:

$$\lambda_1 = 10, \quad \lambda_2 = 5, \quad \lambda_3 = 3$$

Στη συνέχεια υπολογίζουμε ορθοκανονικές βάσεις των αντίστοιχων ιδιοχώρων. Εύκολα βρίσκουμε τα εξής:

$$\mathcal{V}_A(10) = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \implies \text{ΟΚΒ του } \mathcal{V}_A(10) : \left\{ F_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\mathcal{V}_A(5) = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \implies \text{ΟΚΒ του } \mathcal{V}_A(5) : \left\{ F_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\mathcal{V}_A(3) = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \implies \text{ΟΚΒ του } \mathcal{V}_A(3) : \left\{ F_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Τότε το σύνολο $\{F_1, F_2, F_3\}$ είναι μια ορθοκανονική βάση του \mathbb{R}_3 η οποία αποτελείται από τους κύριους άξονες της τετραγωνικής μορφής q .

Θέτοντας

$$P = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

αποκτούμε έναν ορθογώνιο πίνακα για τον οποίο ισχύει ότι

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Σημειώνουμε ότι $|P| = 1$ και άρα από το Θεώρημα του Euler, ο ορθογώνιος πίνακας P γεωμετρικά παριστάνει στροφή επιπέδου (Π) γύρω από άξονα (ϵ) κατά γωνία θ .

Έστω $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3$. Επειδή το σύνολο $\{F_1, F_2, F_3\}$ είναι μια (ορθοκανονική) βάση του \mathbb{R}_3 , θα έχουμε μοναδική γραφή γράφεται ως:

$$X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x' F_1 + y' F_2 + z' F_3$$

και γνωρίζουμε ότι:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \cdot \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \implies x = \frac{-2x' + y'}{\sqrt{5}}, \quad y = \frac{x' + 2y'}{\sqrt{5}}, \quad z = z'$$

Τότε η εξίσωση της αρχικής επιφάνειας γράφεται ως εξής:

$$10(x')^2 + 5(y')^2 + 3(z')^2 + 2(-2x' + y') + 4(x' + 2y') + 12z' + 16 = 0$$

$$\implies 10(x')^2 + 5(y')^2 + 3(z')^2 + 10y' + 12z' + 16 = 0$$

$$\implies 10(x')^2 + 5((y')^2 + 2y' + 1) + 3((z')^2 + 4z' + 4) + 16 - 17 = 0$$

$$\implies 10(x')^2 + 5((y')^2 + 2y' + 1) + 3((z')^2 + 4z' + 4) = 1 \quad (S')$$

Η επιφάνεια (S') προέκυψε από την αρχική επιφάνεια S μετά από στροφή των αξόνων η οποία προσδιορίζεται από τον ορθογώνιο πίνακα P .

Τέλος θέτοντας

$$x'' = x', \quad y'' = y' + 1, \quad z'' = z' + 2$$

δηλαδή εφαρμόζοντας την παράλληλη μεταφορά

$$(x', y', z') \longmapsto (x'', y'', z'') = (x', y', z') + (0, 1, 2)$$

η επιφάνεια (S') γράφεται

$$10(x'')^2 + 5(y'')^2 + 3(z'')^2 = 1$$

δηλαδή

$$\frac{(x'')^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{10}}\right)^2} + \frac{(y'')^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} + \frac{(z'')^2}{\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = 1 \quad (S'')$$

η οποία παριστάνει ελλειψοειδές στο νέο σύστημα συντεταγμένων το οποίο προέκυψε μετά από στροφή και παράλληλη μεταφορά. Επομένως και η αρχική επιφάνεια (S) είναι ένα ελλειψοειδές. \square

Άσκηση 12. Θεωρούμε την τετραγωνική μορφή

$$q : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}, \quad q(x, y, z) = 3x^2 + 3y^2 + 2z^2 - 2xy$$

- (1) Να αναχθεί η τετραγωνική μορφή q στους κύριους άξονές της, οι οποίοι και να βρεθούν.
- (2) Να προσδιοριστεί το είδος της τετραγωνικής επιφάνειας η οποία ορίζεται από την εξίσωση:

$$(S) : 3x^2 + 3y^2 + 2z^2 - 2xy = 8$$

- (3) Να δείξετε ότι ο πίνακας A της τετραγωνικής μορφής q είναι θετικός και στη συνέχεια να βρεθεί συμμετρικός και αντιστρέψιμος πίνακας B έτσι ώστε: $B^2 = A$.

Λύση. (1) Ο πίνακας της τετραγωνικής μορφής q είναι

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Υπολογίζουμε το χαρακτηριστικό πολυώνυμο του πίνακα A . Έχουμε:

$$P_A(t) = \begin{vmatrix} 3-t & -1 & 0 \\ -1 & 3-t & 0 \\ 0 & 0 & 2-t \end{vmatrix} = (2-t)((3-t)^2 - 1) = (2-t)^2(4-t)$$

και άρα οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι $\lambda_1 = 2$ με πολλαπλότητα ίση με δυο και $\lambda_2 = 4$ η οποία είναι απλή.

Για τον ιδιόχωρο $\mathcal{V}_A(2)$ λύνουμε το παρακάτω ομογενές σύστημα:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies x = y$$

και άρα

$$\begin{aligned} \mathcal{V}(2) &= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x = y \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ x \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x, z \in \mathbb{R} \right\} = \\ &= \left\{ x \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x, z \in \mathbb{R} \right\} \implies \mathcal{V}(2) = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) \end{aligned}$$

Το σύνολο διανυσμάτων

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

αποτελεί μια βάση του $\mathcal{V}_A(2)$ η οποία παρατηρούμε ότι είναι ορθογώνια. Επομένως το σύνολο διανυσμάτων

$$\left\{ F_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, F_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

αποτελεί μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(2)$.

Για τον ιδιόχωρο $\mathcal{V}_A(4)$ έχουμε το παρακάτω ομογενές σύστημα :

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \implies y = -x \text{ και } z = 0$$

και άρα

$$\mathcal{V}_A(4) = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid y = -x \text{ και } z = 0 \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ -x \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}_3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \mathcal{L} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \right)$$

Συνεπώς μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_A(4)$ αποτελεί το σύνολο

$$\left\{ F_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

Το σύνολο $\{F_1, F_2, F_3\}$ αποτελεί τότε μια ορθοκανονική βάση του \mathbb{R}_3 η οποία αποτελείται από τους κύριους άξονες της τετραγωνικής μορφής q . Δηλαδή οι κύριοι άξονες της q είναι

$$\left\{ F_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix}, F_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, F_3 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

και η τετραγωνική μορφή q στους κύριους άξονες γράφεται ως εξής :

$$q(x', y', z') = 2(x')^2 + 2(y')^2 + 4(z')^2$$

(2) Από το μέρος (2) έχουμε ότι

$$(S') : \quad 2(x')^2 + 2(y')^2 + 4(z')^2 = 8 \implies \frac{(x')^2}{(2)^2} + \frac{(y')^2}{(2)^2} + \frac{(z')^2}{(\sqrt{2})^2} = 1$$

και άρα το είδος της τετραγωνικής επιφάνειας η οποία ορίζεται από την εξίσωση :

$$(S) : \quad 3x^2 + 3y^2 + 2z^2 - 2xy = 8$$

είναι ελλειψοειδές.

(3) Από το ερώτημα (1) έχουμε ότι οι ιδιοτιμές του πίνακα A είναι $\lambda_1 = 2 > 0$, $\lambda_2 = 4 > 0$ και άρα ο πίνακας A είναι θετικός. Πάλι από το ερώτημα (1) γνωρίζουμε ότι υπάρχει ορθογώνιος πίνακας

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

έτσι ώστε

$${}^tP \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \implies A = P \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot {}^tP$$

Θεωρούμε το πίνακα

$$B = P \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \cdot {}^tP = \dots = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Τότε

$$B^2 = P \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^2 \cdot {}^tP = P \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \cdot {}^tP = A$$

και επομένως:

$$\sqrt{A} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} - 1 & \frac{1}{\sqrt{2}} + 1 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix} \quad \square$$

Άσκηση 13. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης και έστω

$$f, g: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

δύο αυτοπροσαρτημένοι ενδομορφισμοί του \mathcal{E} . Να δείχθει ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

(1)

$$f \circ g = g \circ f$$

(2) Υπάρχει μια ορθοκανονική βάση \mathcal{B} του \mathcal{E} η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του f και του g .

Λύση. • (1) \implies (2) Έστω ότι $f \circ g = g \circ f$. Επειδή οι f και g είναι αυτοπροσαρτημένοι, οι f και g έχουν όλες τις ιδιοτιμές τους στο \mathbb{R} . Έστω λ μια ιδιοτιμή του f και έστω $\mathcal{V}_f(\lambda)$ ο αντίστοιχος ιδιοχώρος. Αν $\vec{x} \in \mathcal{V}_f(\lambda)$, τότε $f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$ και τότε:

$$f(\vec{x}) = \lambda\vec{x} \implies g(f(\vec{x})) = g(\lambda\vec{x}) \implies (g \circ f)(\vec{x}) = \lambda g(\vec{x}) \implies (f \circ g)(\vec{x}) = \lambda g(\vec{x}) \implies f(g(\vec{x})) = \lambda g(\vec{x})$$

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι $g(\mathcal{V}_f(\lambda)) \subseteq \mathcal{V}_f(\lambda)$, και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να ορίσουμε τον επαγόμενο ενδομορφισμό

$$g' = g|_{\mathcal{V}_f(\lambda)}: \mathcal{V}_f(\lambda) \longrightarrow \mathcal{V}_f(\lambda), \quad g'(\vec{x}) = g(\vec{x})$$

Προφανώς ο ενδομορφισμός g' του $\mathcal{V}_f(\lambda)$ είναι αυτοπροσαρτημένος διότι ο ενδομορφισμός g είναι αυτοπροσαρτημένος. Από το Φασματικό Θεώρημα, υπάρχει μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_f(\lambda)$ η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του g' . Προφανώς τότε τα ιδιοδιανύσματα του g' είναι και ιδιοδιανύσματα του g . Από την άλλη πλευρά τα ιδιοδιανύσματα αυτά είναι και ιδιοδιανύσματα του f διότι είναι μη-μηδενικά (επειδή αποτελούν βάση του $\mathcal{V}_f(\lambda)$) και ανήκουν στον ιδιοχώρο $\mathcal{V}_f(\lambda)$. Επομένως, για κάθε ιδιοτιμή λ του f υπάρχει μια ορθοκανονική βάση του $\mathcal{V}_f(\lambda)$ η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του f και του g .

Επειδή ο f , ως αυτοπροσαρτημένος, είναι διαγωνοποιήσιμος, έπεται ότι μπορούμε να γράψουμε:

$$\mathcal{E} = \mathcal{V}_f(\lambda_1) \oplus \mathcal{V}_f(\lambda_2) \oplus \dots \oplus \mathcal{V}_f(\lambda_k) \quad \text{και} \quad i \neq j \implies \mathcal{V}_f(\lambda_i) \perp \mathcal{V}_f(\lambda_j)$$

όπου $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ είναι οι διακεκριμένες ιδιοτιμές του f . Έστω \mathcal{B}_i μια ορθοκανονική βάση του ιδιοχώρου $\mathcal{V}_f(\lambda_i)$, $1 \leq i \leq k$. Τότε επειδή το παραπάνω άθροισμα είναι ορθογώνιο ευθύ άθροισμα, έπεται ότι το σύνολο

$$\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2 \cup \dots \cup \mathcal{B}_k$$

είναι μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του f και του g .

- (2) \implies (1) Έστω

$$\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$$

μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του f και του g . Για κάθε $i = 1, 2, \dots, n$, έστω ότι

$$f(\vec{e}_i) = \lambda_i \vec{e}_i \quad \text{και} \quad g(\vec{e}_i) = \mu_i \vec{e}_i$$

Τότε, $\forall i = 1, 2, \dots, n$:

$$(f \circ g)(\vec{e}_i) = f(g(\vec{e}_i)) = f(\mu_i \vec{e}_i) = \mu_i f(\vec{e}_i) = \mu_i \lambda_i \vec{e}_i = \lambda_i \mu_i \vec{e}_i = \lambda_i g(\vec{e}_i) = g(\lambda_i \vec{e}_i) = g(f(\vec{e}_i)) = (g \circ f)(\vec{e}_i)$$

Τότε για κάθε $\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n \in \mathcal{E}$, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} (f \circ g)(\vec{x}) &= f(g(\vec{x})) = f\left(g\left(\sum_{i=1}^n x_i \vec{e}_i\right)\right) = \sum_{i=1}^n x_i f(\mu_i \vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n x_i \mu_i f(\vec{e}_i) = \left(\sum_{i=1}^n x_i \mu_i \lambda_i\right) \vec{e}_i = \\ &= \left(\sum_{i=1}^n x_i \lambda_i \mu_i\right) \vec{e}_i = \sum_{i=1}^n x_i \lambda_i g(\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n x_i g(\lambda_i \vec{e}_i) = g\left(\sum_{i=1}^n x_i \lambda_i \vec{e}_i\right) = g(f(\vec{x})) = (g \circ f)(\vec{x}) \end{aligned}$$

Επομένως: $f \circ g = g \circ f$. □

Άσκηση 14. Έστω A και B δύο συμμετρικοί $n \times n$ πίνακες πραγματικών αριθμών. Ναδειχθεί ότι:

$$A \cdot B = B \cdot A \iff \text{υπάρχει ορθογώνιος πίνακας } P \text{ έτσι ώστε: } {}^t P \cdot A \cdot P = \Delta \text{ και } {}^t P \cdot B \cdot P = \Gamma$$

όπου οι πίνακες Δ και Γ είναι διαγώνιοι.

Λύση. Θεωρούμε τους ενδομορφισμούς

$$f_A: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X$$

$$f_B: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_B(X) = B \cdot X$$

Οι ενδομορφισμοί f_A f_B είναι αυτοπροσαρτημένοι, διότι οι πίνακές τους στη συνήθη βάση του \mathbb{R}_n , η οποία είναι ορθοκανονική, είναι οι συμμετρικοί πίνακες A και B . Επειδή προφανώς:

$$f_A \circ f_B = f_B \circ f_A \iff A \cdot B = B \cdot A$$

από την Άσκηση 13 έπεται ότι $A \cdot B = B \cdot A$ αν και μόνον αν υπάρχει μια ορθοκανονική βάση $\mathcal{B} = \{F_1, F_2, \dots, F_n\}$ του \mathbb{R}_n η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του f_A και του f_B , δηλαδή από ιδιοδιανύσματα του A και του B . Έτσι αν $A \cdot B = B \cdot A$, τότε θέτοντας

$$P = \begin{pmatrix} F_1 & F_2 & \dots & F_n \end{pmatrix}$$

αποκτούμε έναν ορθογώνιο πίνακα P έτσι ώστε:

$${}^t P \cdot A \cdot P = \Delta \quad \text{και} \quad {}^t P \cdot B \cdot P = \Gamma$$

όπου οι πίνακες Δ και Γ είναι διαγώνιοι. Αντίστροφα, αν υπάρχει ορθογώνιος πίνακας P έτσι ώστε οι παραπάνω σχέσεις να ικανοποιούνται, τότε θα έχουμε

$$A = P \cdot \Delta \cdot {}^t P \quad \text{και} \quad B = P \cdot \Gamma \cdot {}^t P$$

και τότε, επειδή $P \cdot {}^t P = I_n = {}^t P \cdot P$ και επειδή² $\Gamma \cdot \Delta = \Delta \cdot \Gamma$, θα έχουμε:

$$A \cdot B = P \cdot \Delta \cdot {}^t P \cdot P \cdot \Gamma \cdot {}^t P = P \cdot \Delta \cdot \Gamma \cdot {}^t P = P \cdot \Gamma \cdot \Delta \cdot {}^t P = P \cdot \Gamma \cdot {}^t P \cdot P \cdot \Delta \cdot {}^t P = B \cdot A \quad \square$$

²Διαγώνιοι πίνακες μετατίθενται.

Άσκηση 15 (Πολική Ανάλυση Ενδομορφισμού). Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης και έστω

$$f: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Να δειχθεί ότι υπάρχει μια ισομετρία $h: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$ του \mathcal{E} και ένας μη-αρνητικός (αυτοπροσαρτημένος) ενδομορφισμός $g: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$ του \mathcal{E} έτσι ώστε:

$$f = h \circ g, \quad \text{δηλαδή } h^* \circ h = \text{Id}_{\mathcal{E}} \quad \text{και } g^* = g \geq 0$$

Επιπλέον ο f είναι ισομορφισμός αν και μόνον αν ο g είναι θετικός: $\text{Det}(f) \neq 0 \iff g > 0$.

Λύση. Θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f^* \circ f: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

ο οποίος είναι αυτοπροσαρτημένος, διότι:

$$(f^* \circ f)^* = f^* \circ (f^*)^* = f^* \circ f$$

και μη-αρνητικός, διότι:

$$\langle (f^* \circ f)(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle \vec{x}, f^* \circ f(\vec{x}) \rangle = \langle \vec{x}, f^*(f(\vec{x})) \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle = \|f(\vec{x})\|^2 \geq 0$$

Επειδή ο ενδομορφισμός $f^* \circ f$ είναι αυτοπροσαρτημένος και μη-αρνητικός, υπάρχει μια τετραγωνική ρίζα $\sqrt{f^* \circ f}$ του $f^* \circ f$, δηλαδή ο ενδομορφισμός

$$\sqrt{f^* \circ f}: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E} \quad \text{είναι αυτοπροσαρτημένος, μη-αρνητικός και } (\sqrt{f^* \circ f})^2 = f^* \circ f$$

Έστω $\vec{x} \in \mathcal{E}$. Τότε:

$$\begin{aligned} \|\sqrt{f^* \circ f}(\vec{x})\|^2 &= \langle \sqrt{f^* \circ f}(\vec{x}), \sqrt{f^* \circ f}(\vec{x}) \rangle = \langle \sqrt{f^* \circ f}^*(\sqrt{f^* \circ f}(\vec{x})), \vec{x} \rangle = \langle (\sqrt{f^* \circ f} \circ \sqrt{f^* \circ f})(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \\ &= \langle (\sqrt{f^* \circ f})^2(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle (f^* \circ f)(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle f^*(f(\vec{x})), \vec{x} \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle = \|f(\vec{x})\|^2 \end{aligned}$$

Άρα, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$\|\sqrt{f^* \circ f}(\vec{x})\| = \|f(\vec{x})\|$$

Αν $\vec{x} \in \mathcal{E}$, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \vec{x} \in \text{Ker}(f) &\iff f(\vec{x}) = \vec{0} \iff \|f(\vec{x})\| = 0 \iff \|\sqrt{f^* \circ f}(\vec{x})\| = 0 \iff \sqrt{f^* \circ f}(\vec{x}) = \vec{0} \\ &\iff \vec{x} \in \text{Ker}(\sqrt{f^* \circ f}) \end{aligned}$$

Άρα θα έχουμε:

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(\sqrt{f^* \circ f})$$

Ορίζουμε απεικόνιση

$$h_1: \text{Im}(\sqrt{f^* \circ f}) \longrightarrow \text{Im}(f), \quad h_1((\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x})) = f(\vec{x})$$

Η παραπάνω απεικόνιση είναι καλά ορισμένη διότι αν $(\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x}) = (\sqrt{f^* \circ f})(\vec{y})$, τότε $(\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{0}$, δηλαδή $\vec{x} - \vec{y} \in \text{Ker}(\sqrt{f^* \circ f}) = \text{Ker}(f)$, και επομένως $f(\vec{x} - \vec{y}) = \vec{0}$. Άρα $(\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x}) = f(\vec{x}) = f(\vec{y}) = (\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x})(\vec{y})$. Άρα η απεικόνιση h_1 είναι καλά ορισμένη και εύκολα βλέπουμε ότι είναι γραμμική. Αν $f(\vec{x}) \in \text{Im}(f)$, τότε $h_1((\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x})) = f(\vec{x})$ και επομένως η απεικόνιση h_1 είναι επιμορφισμός. Επιπλέον, $\forall \vec{y} = (\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x})$, θα έχουμε:

$$\|h_1(\vec{y})\| = \|h_1((\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x}))\| = \|f(\vec{x})\| = \|\sqrt{f^* \circ f}(\vec{x})\|$$

και επομένως ο ενδομορφισμός h_1 είναι μια ισομετρία. Θα επεκτείνουμε την ισομετρία h_1 σε μια ισομετρία

$$h: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

ως εξής. Έστω $\mathcal{B}_1 = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k\}$ μια ορθοκανονική βάση του $\text{Im}(\sqrt{f^* \circ f})$ την οποία επεκτείνουμε σε μια ορθοκανονική βάση $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k, \vec{e}_{k+1}, \dots, \vec{e}_n\}$ του \mathcal{E} . Επειδή η γραμμική απεικόνιση h_1 είναι ισομετρία, έπεται ότι το σύνολο $\mathcal{C}_1 = \{\vec{e}_1 = h_1(\vec{e}_1), \vec{e}_2 = h_1(\vec{e}_2), \dots, \vec{e}_k = h_1(\vec{e}_k)\}$ είναι μια ορθοκανονική βάση του $\text{Im}(f)$ την οποία συμπληρώνουμε σε μια ορθοκανονική βάση $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k, \vec{e}_{k+1}, \dots, \vec{e}_n\}$ του \mathcal{E} . Ορίζουμε τότε $h: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$ να είναι ο μοναδικός ενδομορφισμός h έτσι ώστε $h(\vec{e}_i) = \vec{e}_i$, $1 \leq i \leq n$. Επειδή ο h στέλνει ορθοκανονική βάση σε ορθοκανονική βάση, έπεται ότι ο h είναι ισομετρία.

Θεωρούμε τη σύνθεση ενδομορφισμών

$$\mathcal{E} \xrightarrow{\sqrt{f^* \circ f}} \mathcal{E} \xrightarrow{h} \mathcal{E}$$

Τότε, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$\left(h \circ (\sqrt{f^* \circ f}) \right) (\vec{x}) = h(\sqrt{f^* \circ f}(\vec{x})) = h_1((\sqrt{f^* \circ f})(\vec{x})) = f(\vec{x})$$

Επομένως

$$f = h \circ (\sqrt{f^* \circ f})$$

όπου ο ενδομορφισμός h είναι ισομετρία και ο ενδομορφισμός $g = \sqrt{f^* \circ f}$ είναι αυτοπροσαρτημένος και μη-αρνητικός.

Αν ο ενδομορφισμός f είναι ισομορφισμός, τότε και ο ενδομορφισμός $f^* \circ f$ είναι θετικός διότι αν

$$\langle (f^* \circ f)(\vec{x}), \vec{x} \rangle = 0 \implies \|f(\vec{x})\|^2 = 0 \implies f(\vec{x}) = \vec{0} \implies \vec{x} = \vec{0}$$

Άρα $f^* \circ f > 0$. Επειδή γνωρίζουμε ότι η τετραγωνική ρίζα θετικού ενδομορφισμού είναι θετικός ενδομορφισμός, έπεται ότι ο ενδομορφισμός $\sqrt{f^* \circ f}$ είναι θετικός.

Αντίστροφα, αν ο ενδομορφισμός ο ενδομορφισμός $\sqrt{f^* \circ f}$ είναι θετικός, τότε ιδιαίτερα είναι ισομορφισμός. Επειδή ο ενδομορφισμός h είναι ισομετρία, και άρα ισομορφισμός, και επειδή $f = h \circ (\sqrt{f^* \circ f})$, έπεται ότι ο ενδομορφισμός f είναι ισομορφισμός. \square

Παρατήρηση. Αν $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} , τότε εργαζόμενοι με τον ενδομορφισμό $f \circ f^*: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$, προκύπτει ότι υπάρχει ισομετρία v του \mathcal{E} και μη-αρνητικός ενδομορφισμός u του \mathcal{E} έτσι ώστε:

$$f = v \circ u, \quad \text{δηλαδή } v^* \circ v = \text{Id}_{\mathcal{E}} \text{ και } u^* = u \geq 0$$

Επιπλέον: ο f είναι ισομορφισμός αν και μόνον αν ο u είναι θετικός: $\text{Det}(f) \neq 0 \iff u > 0$. \blacksquare

Άσκηση 16. Για κάθε πίνακα $A \in M_n(\mathbb{R})$, υπάρχει ορθογώνιος πίνακας P και μη-αρνητικός συμμετρικός πίνακας U έτσι ώστε:

$$A = P \cdot U$$

Επιπλέον ο πίνακας A είναι αντιστρέψιμος αν και μόνον αν ο πίνακας U είναι συμμετρικός και θετικός.

Λύση. Θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f_A: \mathbb{R}_n \rightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X$$

Τότε από την Άσκηση 15, έπεται ότι υπάρχει ισομετρία h του \mathbb{R}_n και μη-αρνητικός αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός g του \mathbb{R}_n έτσι ώστε:

$$f_A = h \circ g$$

Ο πίνακας του ενδομορφισμού f_A στην κανονική βάση \mathcal{B} του \mathbb{R}_n , η οποία είναι ορθοκανονική, είναι ο A , ο πίνακας της ισομετρίας h στην ορθοκανονική βάση \mathcal{B} είναι ένας ορθογώνιος πίνακας P , και ο πίνακας του μη-αρνητικού αυτοπροσαρτημένου ενδομορφισμού g στην ορθοκανονική βάση \mathcal{B} είναι ένας μη-αρνητικός συμμετρικός πίνακας U . Επομένως θα έχουμε:

$$A = P \cdot U, \quad \text{όπου: } {}^t P \cdot P = I_n \text{ και } {}^t U = U \geq 0 \quad \square$$

Παρατήρηση. Για κάθε πίνακα $A \in M_n(\mathbb{R})$, υπάρχει ορθογώνιος πίνακας Q και μη-αρνητικός συμμετρικός πίνακας V έτσι ώστε:

$$A = V \cdot Q$$

Επιπλέον ο πίνακας A είναι αντιστρέψιμος αν και μόνον αν ο πίνακας V είναι συμμετρικός και θετικός. \blacksquare

Άσκηση 17 (Νόμος Αδραναίας του Sylvester). Έστω $(\mathcal{E}, \langle, \rangle)$ ένας Ευκλιδείδιος χώρος πεπερασμένης διάστασης $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} = n$, και

$$q: \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}$$

για τετραγωνική μορφή επί του \mathcal{E} . Να δειχθεί ότι υπάρχει βάση $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ του \mathcal{E} έτσι ώστε

$$q(x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n) = x_1^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - \dots - x_r^2$$

και οι θετικοί ακέραιοι s και r , άρα και το ζεύγος (s, r) , εξαρτώνται μόνο από την τετραγωνική μορφή q .

Λύση. Από τον ορισμό της τετραγωνικής μορφής q , υπάρχει ορθοκανονική βάση $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ του \mathcal{E} , και συμμετρικός $n \times n$ πίνακας πραγματικών αριθμών $A = (a_{ij})$, έτσι ώστε:

Για κάθε $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n \in \mathcal{E}$:

$$q(\vec{x}) = {}^t X \cdot A \cdot X, \quad \text{όπου } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Έστω $\mathcal{D} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ οι κύριοι άξονες της q , δηλαδή το σύνολο \mathcal{D} είναι μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} και, αν $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ είναι οι ιδιοτιμές του συμμετρικού πίνακα A , τότε, $\forall \vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n \in \mathcal{E}$:

$$q(\vec{x}) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \dots + \lambda_n x_n^2$$

Υπενθυμίζουμε ότι επειδή ο πίνακας A είναι συμμετρικός από το Φασματικό Θεώρημα, υπάρχει ορθογώνιος πίνακας P έτσι ώστε ο πίνακας ${}^t P \cdot A \cdot P$ να είναι ένας διαγώνιος πίνακας Δ και στη διαγώνιο είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα A . Τότε οι συνιστώσες των κυρίων αξόνων στην ορθοκανονική βάση \mathcal{B} δίνονται από τις στήλες του ορθογώνιου πίνακα P .

Χωρίς βλάβη της γενικότητας, διαφορετικά αναδιατάσσουμε τα διανύσματα της βάσης \mathcal{B} , μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι ιδιοτιμές $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ είναι θετικές, οι ιδιοτιμές $\lambda_{s+1}, \lambda_{s+2}, \dots, \lambda_r$ είναι αρνητικές, και οι υπολοιπες ιδιοτιμές $\lambda_{r+1}, \lambda_{r+2}, \dots, \lambda_n$ είναι ίσες με μηδέν. Προφανώς ο αριθμός r συμπίπτει με τη βαθμίδα του πίνακα A , διότι $\mathbf{r}(A) = \mathbf{r}(\Delta) = r$. Θεωρούμε το σύνολο διανυσμάτων:

$$\begin{aligned} \vec{e}_1 &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}} \vec{e}_1, & \vec{e}_2 &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}} \vec{e}_2, & \dots, & & \vec{e}_s &= \frac{1}{\sqrt{\lambda_s}} \vec{e}_s \\ \vec{e}_{s+1} &= \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{s+1}}} \vec{e}_{s+1}, & \vec{e}_{s+2} &= \frac{1}{\sqrt{-\lambda_{s+2}}} \vec{e}_{s+2}, & \dots, & & \vec{e}_r &= \frac{1}{\sqrt{-\lambda_r}} \vec{e}_r \\ \vec{e}_{r+1} &= \vec{e}_{r+1}, & \vec{e}_{r+2} &= \vec{e}_{r+2}, & \dots, & & \vec{e}_n &= \vec{e}_n \end{aligned}$$

Τότε προφανώς το σύνολο διανυσμάτων

$$\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$$

είναι μια βάση του \mathcal{E} και ο πίνακας της τετραγωνικής μορφής q στη βάση \mathcal{C} είναι διαγώνιος, και τα πρώτα s διαγώνια στοιχεία είναι ίσα με 1, τα επόμενα $r - s$ διαγώνια στοιχεία είναι ίσα με -1 , και τα υπόλοιπα $n - r$ στοιχεία της διαγώνιου είναι ίσα με 0. Άρα το πλήθος των μη-μηδενικών στοιχείων του διαγώνιου πίνακα είναι ίσο με r . Άρα $\mathbf{r}(A) = r$.

Τότε, για κάθε διάνυσμα $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n \in \mathcal{E}$:

$$q(\vec{x}) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_s^2 - x_{s+1}^2 - x_{s+2}^2 - \dots - x_r^2$$

Έστω

$$\mathcal{C}' = \{\vec{e}'_1, \vec{e}'_2, \dots, \vec{e}'_n\}$$

για άλλη βάση στην οποία ο πίνακας της q είναι, $\forall \vec{x} = x_1\vec{e}'_1 + x_2\vec{e}'_2 + \dots + x_n\vec{e}'_n \in \mathcal{E}$:

$$q(\vec{x}) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_{s'}^2 - x_{s'+1}^2 - x_{s'+2}^2 - \dots - x_{r'}^2$$

Τότε ο πίνακας της q στη βάση \mathcal{B} είναι διαγώνιος και τα πρώτα s' διαγώνια στοιχεία είναι ίσα με 1, τα επόμενα $r' - s'$ διαγώνια στοιχεία είναι ίσα με -1 , και τα υπόλοιπα $n - r'$ στοιχεία της διαγώνιου είναι ίσα με 0. Άρα

το πλήθος των μη-μηδενικών στοιχείων του διαγώνιου πίνακα είναι ίσο με r' . Άρα $\mathbf{r}(A) = r'$. Επομένως $r' = \mathbf{r}(A) = r$. Έστω

$$\mathcal{U} = \mathcal{L}(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_s)$$

ο υπόχωρος του \mathcal{E} ο οποίος παραγεται από τα διανύσματα $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_s\}$, και

$$\mathcal{V} = \mathcal{L}(\vec{e}'_{s'+1}, \vec{e}'_{s'+2}, \dots, \vec{e}'_n)$$

ο υπόχωρος του \mathcal{E} ο οποίος παραγεται από τα διανύσματα $\{\vec{e}'_{s'+1}, \vec{e}'_{s'+2}, \dots, \vec{e}'_n\}$.

Προφανώς θα έχουμε:

$$\forall \vec{x} \in \mathcal{U} : \mathbf{q}(\vec{x}) \geq 0 \quad \text{και} \quad \forall \vec{x} \in \mathcal{V} : \mathbf{q}(\vec{x}) \leq 0$$

Επειδή $\forall \vec{x} \in \mathcal{U}$ έχουμε $\mathbf{q}(\vec{x}) = 0$ αν και μόνον αν $\vec{x} = \vec{0}$ και $\forall \vec{x} \in \mathcal{V}$ έχουμε $\mathbf{q}(\vec{x}) = 0$ αν και μόνον αν $\vec{x} = \vec{0}$, έπεται ότι Επομένως:

$$\forall \vec{x} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V} : \mathbf{q}(\vec{x}) = 0 \quad \text{και} \quad \text{άρα} : \quad \vec{x} = \vec{0}$$

Άρα το άθροισμα υπόχωρων $\mathcal{U} + \mathcal{V}$ είναι ευθύ, δηλαδή $\mathcal{U} + \mathcal{V} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{V}$, και επομένως

$$s + n - s' = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{U} + \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = \dim_{\mathbb{R}} (\mathcal{U} \oplus \mathcal{V}) = \dim_{\mathbb{R}} (\mathcal{U} + \mathcal{V}) \leq n \quad \implies \quad s \leq s'$$

Παρόμοια δείχνουμε, εναλλάσσοντας τους ρόλους των βάσεων \mathcal{C} και \mathcal{C}' ότι $s' \leq s$. Επομένως:

$$s = s' \quad \square$$

Το ζεύγος θετικών ακεραίων το ζεύγος (s, r) στην παράπανω Άσκηση καλείται ο **δείκτης** της τετραγωνικής μορφής \mathbf{q} . Με άλλα λόγια, ο δείκτης (s, r) της τετραγωνικής μορφής \mathbf{q} είναι το ζεύγος

$$(s, r) = (\text{πλήθος θετικών ιδιοτιμών της } \mathbf{q}, \text{ βαθμίδα της } \mathbf{q})$$

Άσκηση 18. Να βρεθεί ο δείκτης της τετραγωνικής μορφής

$$\mathbf{q}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \mathbf{q}(x, y, z) = xy + xz + yz$$

Λύση. Ο πίνακας της \mathbf{q} είναι ο

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

Υπολογίζουμε εύκολα ότι

$$P_A(t) = -(t-1) \left(t + \frac{1}{2} \right)^2$$

και άρα οι ιδιοτιμές του A είναι οι εξής

$$\lambda = 1, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2} \quad (\text{διπλή})$$

Ιδιαίτερα έπεται ότι ο πίνακας A είναι αντιστρέψιμος διότι δεν έχει το 0 ως ιδιοτιμή. Αυτό σημαίνει ότι $\mathbf{r}(A) = r = 3$. Επειδή ο A έχει ακριβώς μια θετική ιδιοτιμή, έπεται ότι $s = 1$ και επομένως ο δείκτης της \mathbf{q} είναι ίσος με

$$\text{δείκτης της } \mathbf{q} = (1, 3)$$

Η τετραγωνική μορφή στους κύριους άξονες της γράφεται

$$\mathbf{q}(x', y', z') = (x')^2 - \frac{1}{2}(y')^2 - \frac{1}{2}(z')^2$$

και στη βάση \mathcal{C}' της Άσκησης 17 τετραγωνική μορφή γράφεται

$$\mathbf{q}(x'', y'', z'') = (x'')^2 - (y'')^2 - (z'')^2 \quad \square$$