

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ Β'

(Αρχικό γράμμα επωνύμου: Λ - Ω)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Μπεληγιάννης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

<http://users.uoi.gr/abeligia/LinearAlgebraII/LAI12020/LAI12020.html>

Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Άσκηση 1. Να εξετασθεί αν οι ακόλουθες γραμμικές απεικονίσεις μεταξύ Ευκλείδειων χώρων είναι ισομετρίες.

- (1) $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y) = (x, y, 0)$.
- (2) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y, z) = (x, y)$.
- (3) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (x - y, y - z, z - x)$.
- (4) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x, y, z) = (ay, bz, cx)$, όπου $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Άσκηση 2. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος και θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}, f(\vec{x}) = \lambda \vec{x}$$

όπου $\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$. Να δείξετε ότι η f είναι ισομορφισμός, αλλά γενικά όχι ισομετρία. Να βρεθεί αναγκαία και ικανή συνθήκη έτσι ώστε η f να είναι ισομετρία.

Άσκηση 3. (1) Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος και υποθέτουμε ότι $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$ είναι μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} .

Έστω $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ο μοναδικός ενδομορφισμός του \mathcal{E} έτσι ώστε:

$$f(\vec{e}_1) = -\vec{e}_2, \quad f(\vec{e}_2) = -\vec{e}_3, \quad f(\vec{e}_3) = -\vec{e}_4, \quad f(\vec{e}_4) = \vec{e}_1$$

Να εξετασθεί αν ο ενδομορφισμός f είναι ισομετρία.

(2) Να εξετασθεί αν το άθροισμα $f + g$ δύο ισομετριών $f, g: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι ισομετρία.

(3) Να εξετασθεί αν το άθροισμα $A + B$ ή $A + B^2$, όπου A και B είναι δύο $n \times n$ ορθογώνιοι πίνακες, είναι ορθογώνιος πίνακας.

Άσκηση 4. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος. Αν $\kappa \in \mathbb{R}$ και $\vec{v} \in \mathcal{E}$, να εξεταστεί αν ο ενδομορφισμός

$$f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}, f(\vec{x}) = \begin{cases} \vec{x}, & \text{αν } \vec{v} = \vec{0} \\ \vec{x} + \kappa \frac{\langle \vec{x}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v}, & \text{αν } \vec{v} \neq \vec{0} \end{cases}$$

είναι ισομετρία.

Έστω \mathcal{E} ένας \mathbb{R} -διανυσματικός χώρος διάστασης $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} = n$. Ένας υπόχωρος \mathcal{V} του \mathcal{E} καλείται **υπερεπίπεδο** του \mathcal{E} , αν έχει διάσταση $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V} = n - 1$. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης.

Ένας ενδομορφισμός $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ καλείται **ανάκλαση**, αν υπάρχει ένα υπερεπίπεδο \mathcal{V} του \mathcal{E} έτσι ώστε:

$$f(\vec{x}) = \begin{cases} \vec{x}, & \text{αν } \vec{x} \in \mathcal{V} \\ -\vec{x}, & \text{αν } \vec{x} \notin \mathcal{V} \end{cases}$$

και τότε ο υπόχωρος \mathcal{V} καλείται **υπερεπίπεδο ανάκλασης** για τον f .

Άσκηση 5. Έστω $(\mathcal{E}, \langle, \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} , όπου $f \neq \text{Id}_{\mathcal{E}}$. Να δειχθεί ότι ο f είναι μια ανάκλαση αν και μόνον αν υπάρχει ένα μη-μηδενικό διάνυσμα $\vec{v} \in \mathcal{E}$ έτσι ώστε, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$f(\vec{x}) = \vec{x} - 2 \frac{\langle \vec{x}, \vec{v} \rangle}{\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle} \vec{v} \quad (*)$$

Άσκηση 6. Έστω $(\mathcal{E}, \langle, \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης.

- (1) Αν \vec{x}, \vec{y} είναι δύο διανύσματα του \mathcal{E} έτσι ώστε $\|\vec{x}\| = \|\vec{y}\|$, να δείξετε ότι υπάρχει μια ισομετρία $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$, έτσι ώστε: $f(\vec{x}) = \vec{y}$.
- (2) Αν $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{w}$ είναι τέσσερα διανύσματα του \mathcal{E} έτσι ώστε

$$\|\vec{x}\| = \|\vec{y}\| \quad \text{και} \quad \|\vec{z}\| = \|\vec{w}\|$$

να εξετασθεί αν υπάρχει ισομετρία $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$, έτσι ώστε:

$$f(\vec{x}) = \vec{y} \quad \text{και} \quad f(\vec{z}) = \vec{w}$$

Άσκηση 7. Έστω $(\mathcal{E}, \langle, \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης. Αν $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \vec{w}$ είναι τέσσερα διανύσματα του \mathcal{E} , να δειχθεί ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

- (1) Υπάρχει μια ισομετρία $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ έτσι ώστε:

$$f(\vec{x}) = \vec{y} \quad \text{και} \quad f(\vec{z}) = \vec{w}$$

- (2) Ισχύουν τα εξής:

$$\|\vec{x}\| = \|\vec{y}\|, \quad \|\vec{z}\| = \|\vec{w}\|, \quad \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{w} \rangle \quad (*)$$

Άσκηση 8. Έστω $(\mathcal{E}, \langle, \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$$

μια ισομετρία. Να δειχθεί ότι αν \mathcal{V} είναι ένας υπόχωρος του \mathcal{E} , τότε:

$$f(\mathcal{V}) \subseteq \mathcal{V} \quad \implies \quad f(\mathcal{V}^\perp) \subseteq \mathcal{V}^\perp$$

Ισχύει η αντίστροφη συνεπαγωγή;

Άσκηση 9. (1) Θεωρούμε τον Ευκλείδειο χώρο \mathbb{R}^4 εφοδιασμένο με το συνηθισμένο εσωτερικό γινόμενο και τους υποχώρους του

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid 2x + 3y + z = 0\} \\ \mathcal{W} &= \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x - y + w = 0\} \end{aligned}$$

Να βρεθεί μια ισομετρία $f: (\mathcal{V}, \langle, \rangle) \rightarrow (\mathbb{R}_2[t], \langle, \rangle)$ και μια ισομετρία $g: (\mathcal{W}, \langle, \rangle) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \langle, \rangle)$.

- (2) Να εξετασθεί αν υπάρχει ισομετρία $h: (\mathcal{V} \cap \mathcal{W}, \langle, \rangle) \rightarrow (M_n(\mathbb{R}), \langle, \rangle)$, για κατάλληλο $n \geq 1$.

Άσκηση 10. Έστω $A = (a_{ij}) \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ ένας $m \times n$ πίνακας πραγματικών αριθμών. Έστω¹ $\sigma(A)$ η βαθμίδα γραμμών του A και $\gamma(A)$ η βαθμίδα στηλών του A . Ναδειχθεί ότι αν $\Lambda(\Sigma)$ είναι ο χώρος λύσεων του ομογενούς συστήματος

$$(\Sigma) \quad A \cdot X = O$$

τότε:

(1)

$$\Lambda(\Sigma) = \mathcal{L}(\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_m)^\perp$$

όπου $\mathcal{L}(\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_m)$ είναι ο υπόχωρος του \mathbb{R}^n ο οποίος παράγεται από τις γραμμές $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_m$ του πίνακα A .

(2) $\sigma(A) = \gamma(A)$.

(3) Υπάρχει μια ισομετρία:

$$\Lambda(\Sigma) \longrightarrow \mathbb{R}^{n-r(A)}$$

Άσκηση 11. Έστω $A \in M_2(\mathbb{R})$ ένας 2×2 ορθογώνιος πίνακας.

(1) Αν $|A| = 1$, ναδειχθεί ότι ο πίνακας A έχει τουλάχιστον μια πραγματική ιδιοτιμή αν και μόνον αν

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{ή} \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

(2) Αν $|A| = -1$, ναδειχθεί ότι ο πίνακας A έχει πάντα πραγματικές ιδιοτιμές $\lambda_1 = 1$ και $\lambda_2 = -1$, και επομένως ο A είναι διαγωνοποιήσιμος και είναι όμοιος με τον πίνακα

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Άσκηση 12. Έστω A ένας ορθογώνιος 2×2 πίνακας πραγματικών αριθμών με ορίζουσα $|A| = -1$. Ναδειχθεί ότι τα διανύσματα στήλης

$$F_1 = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) \end{pmatrix} \quad \text{και} \quad F_2 = \begin{pmatrix} -\sin(\theta/2) \\ \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

είναι ιδιοδιανύσματα του A τα οποία αντιστοιχούν στις ιδιοτιμές 1 και -1 αντίστοιχα. Επιπλέον, ναδειχθεί ότι θέτοντας

$$P = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

αποκτούμε έναν ορθογώνιο πίνακα για τον οποίο ισχύει ότι:

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Άσκηση 13. Ναδειχθεί ότι ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & 2/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} & -1/\sqrt{5} \end{pmatrix}$$

είναι ορθογώνιος και γεωμετρικά παριστάνει συμμετρία ως προς άξονα (ϵ) , ο οποίος και να βρεθεί. Ποιά είναι η γωνία την οποία σχηματίζει ο άξονας με τον άξονα των x ;

¹Υπενθυμίζουμε ότι $\sigma(A)$ ορίζεται να είναι το μέγιστο πλήθος γραμμικά ανεξάρτητων στηλών του πίνακα A και $\gamma(A)$ είναι το μέγιστο πλήθος γραμμικά ανεξάρτητων γραμμών του πίνακα A . Ισοδύναμα:

$$\sigma(A) = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{L}(\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_n) \quad \text{και} \quad \gamma(A) = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{L}(\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_m)$$

όπου $\mathcal{L}(\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_n)$ είναι ο υπόχωρος του \mathbb{R}_m ο οποίος παράγεται από τις στήλες $\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_n$ του πίνακα A και $\mathcal{L}(\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_m)$ είναι ο υπόχωρος του \mathbb{R}^n ο οποίος παράγεται από τις γραμμές $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_m$ του πίνακα A .

Από τη Γραμμική Άλγεβρα I γνωρίζουμε ότι $\sigma(A) = \gamma(A)$ και η κοινή αυτή τιμή καλείται βαθμίδα του πίνακα A και συμβολίζεται με $r(A)$. Στην παρούσα Άσκηση δείχνουμε την ισότητα $\sigma(A) = \gamma(A)$ με έναν διαφορετικό απλούστερο τρόπο.

Άσκηση 14. Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} -3/5 & -4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$$

Να δειχθεί ότι ο πίνακας A είναι ορθογώνιος, και ακολούθως:

- (1) Να εξετασθεί αν ο πίνακας A παριστάνει γεωμετρικά περιστροφή (σε αυτή την περίπτωση να βρεθεί η γωνία περιστροφής) ή συμμετρία ως προς άξονα (σε αυτή την περίπτωση να βρεθεί ο άξονας συμμετρίας).
- (2) Αν ο πίνακας A παριστάνει συμμετρία ως προς άξονα, να βρεθεί ορθογώνιος πίνακας P έτσι ώστε:

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Άσκηση 15. «Στροφές Επιπέδου μετατίθενται»

- (1) Αν A και B είναι δύο ορθογώνιοι 2×2 πίνακες με ορίζουσα $|A| = 1 = |B|$, να δειχθεί ότι:

$$A \cdot B = B \cdot A$$

- (2) Αν $f, g: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι δύο ισομετρίες επί ενός Ευκλείδειου χώρου $(\mathcal{E}, \langle, \rangle)$, έτσι ώστε $\text{Det}(f) = 1 = \text{Det}(g)$, να δειχθεί ότι:

$$f \circ g = g \circ f$$

Άσκηση 16. Θεωρούμε τον πίνακα

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{14}} & * & * \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{14}} & * & * \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-3}{\sqrt{14}} & * & * \\ 0 & 0 & * & * \end{pmatrix}$$

Να συμπληρωθεί ο πίνακας A έτσι ώστε να είναι ορθογώνιος.

Άσκηση 17. Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\langle, \rangle' : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle (x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3) \rangle' = 4x_1y_1 + 2x_2y_2 + 8x_3y_3$$

- (1) Να δειχθεί ότι η απεικόνιση \langle, \rangle' ορίζει ένα εσωτερικό γινόμενο στον \mathbb{R}^3 .
- (2) Να δείξετε ότι ο ενδομορφισμός

$$f : (\mathbb{R}^3, \langle, \rangle) \rightarrow (\mathbb{R}^3, \langle, \rangle'), \quad f(x, y, z) = \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{\sqrt{2}}, \frac{z}{2\sqrt{2}} \right)$$

είναι μια ισομετρία, όπου \langle, \rangle είναι το συνηθισμένο εσωτερικό γινόμενο του \mathbb{R}^3 .

Άσκηση 18. Να δειχθεί ότι ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

παριστάνει στροφή επιπέδου περί άξονα κάθετο σ' αυτό και να προσδιορισθεί ο άξονας και η γωνία στροφής. Με ποιόν πίνακα είναι ορθογώνια όμοιος ο πίνακας A ;

Άσκηση 19. Στον Ευκλείδειο χώρο \mathbb{R}^3 , εφοδιασμένο με το συνηθισμένο εσωτερικό γινόμενο, θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = \left(\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}y + az, \frac{2}{3}x - \frac{1}{3}y + bz, -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}y + cz \right)$$

- (1) Να υπολογισούν οι τιμές των πραγματικών αριθμών a, b και c έτσι ώστε ο f να είναι ισομετρία η οποία παριστά στροφή επιπέδου γύρω από άξονα κάθετο σ' αυτό.
- (2) Αν ο f είναι ισομετρία,
 (α') να υπολογισθεί η γωνία των διανυσμάτων $f(1, 0, 0)$ και $f(0, 1, 0)$.
 (β') να βρεθεί το επίπεδο και ο άξονας περιστροφής του ερωτήματος (1).

Άσκηση 20. Θεωρούμε τον 3×3 πίνακα πραγματικών αριθμών

$$A = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 8 & 1 & -4 \\ -4 & 4 & -7 \\ 1 & 8 & 4 \end{pmatrix}$$

- (1) Να δειχθεί ότι ο πίνακας A είναι ορθογώνιος και γεωμετρικά παριστάνει στροφή επιπέδου (Π) γύρω από άξονα (ϵ) κάθετο στο επίπεδο (Π) κατά γωνία θ . Να βρεθεί το επίπεδο (Π), άξονας περιστροφής (ϵ) και η γωνία περιστροφής θ .
- (2) Να βρεθεί ορθογώνιος πίνακας P έτσι ώστε

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Άσκηση 21. Να προσδιορισθούν οι τιμές των πραγματικών αριθμών a, b, c έτσι ώστε ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \\ a & b & c \end{pmatrix}$$

να είναι ορθογώνιος. Για ποιές τιμές των a, b, c , ο πίνακας A γεωμετρικά παριστάνει στροφή επιπέδου (Π) γύρω από άξονα (ϵ) κάθετο στο επίπεδο (Π) κατά γωνία θ ; Στην περίπτωση αυτή, να βρεθεί η γωνία περιστροφής θ .

Οι επόμενες ασκήσεις **22 - 27** είναι αφιερωμένες στην περιγραφή των ιδιοτιμών και των κλάσεων ομοιότητας ορθογώνιων 2×2 και 3×3 πινάκων.

Άσκηση 22. Έστω A ένας 2×2 ορθογώνιος πίνακας πραγματικών αριθμών. Τότε $|A| = \pm 1$, και οι πραγματικές ιδιοτιμές του πίνακα A είναι οι εξής:

- (1) Αν $|A| = 1$, τότε οι πραγματικές ιδιοτιμές του A είναι:
 (α') $\lambda_1 = 1$ (διπλή). Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν $A = I_2$.
 (β') $\lambda_1 = -1$ (διπλή). Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν $A = -I_2$.
- (2) Αν $|A| = -1$, τότε οι πραγματικές ιδιοτιμές του A είναι: $\lambda_1 = 1$ και $\lambda_2 = -1$. Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

για μια μοναδική γωνία $\theta \in [0, 2\pi)$.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ο πίνακας A είναι της μορφής

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \text{όπου } \theta \neq 0, \pi$$

και ο A δεν έχει πραγματικές ιδιοτιμές.

Άσκηση 23. Κάθε 2×2 ορθογώνιος πίνακας πραγματικών αριθμών είναι ορθογώνια όμοιος με έναν και μόνον έναν από τους ακόλουθους πίνακες:

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (\text{στροφή επιπέδου κατά γωνία ίση με } 0) \\ & \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (\text{στροφή επιπέδου κατά γωνία ίση με } \pi) \\ & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (\text{συμμετρία ως προς τον άξονα των } x) \\ & \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad \text{όπου } \theta \in [0, 2\pi) \quad (\text{στροφή επιπέδου κατά γωνία } \theta \neq 0, \pi) \end{aligned}$$

Άσκηση 24. Έστω $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ μια ισομετρία του Ευκλείδειου χώρου $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, όπου $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} = 3$, και υποθέτουμε ότι η ορίζουσα της f είναι ίση με 1, δηλαδή η ορίζουσα του πίνακα της f σε μια τυχούσα βάση του \mathcal{E} είναι ίση με 1. Γνωρίζουμε τότε, από το Θεώρημα του Euler, ότι ο αριθμός $\lambda = 1$ είναι ιδιοτιμή του f . Να δειχθεί ότι:

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{V}(1) = 1 \iff f \neq \text{Id}_{\mathcal{E}}$$

Αν $f \neq \text{Id}_{\mathcal{E}}$, να δειχθεί ότι η f έχει όλες τις ιδιοτιμές της πραγματικές αν και μόνον αν υπάρχει ορθοκανονική βάση $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ του \mathcal{E} , έτσι ώστε:

$$f(\vec{e}_1) = \vec{e}_1, \quad f(\vec{e}_2) = -\vec{e}_2, \quad f(\vec{e}_3) = -\vec{e}_3$$

Άσκηση 25. Να δειχθεί ότι κάθε ορθογώνιος πίνακας $A \in M_3(\mathbb{R})$ με ορίζουσα $|A| = 1$ είναι όμοιος με ακριβώς έναν από τους παρακάτω ορθογώνιους πίνακες

(1)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν $A = I_3$ ή ισοδύναμα η μόνη ιδιοτιμή του A είναι η $\lambda = 1$ με πολλαπλότητα ίση με 3.

(2)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν ο πίνακας A έχει τουλάχιστον μια ιδιοτιμή διαφορετική της $\lambda = 1$.

(3)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

για μια μοναδική γωνία $\theta \in [0, 2\pi)$, με: $\theta \neq 0, \pi$.

Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν η μόνη ιδιοτιμή του A είναι η $\lambda = 1$.

Έστω $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ μια ισομετρία του Ευκλείδειου χώρου \mathcal{E} , όπου $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} = 3$, και υποθέτουμε ότι $\text{Det}(f) = 1$, δηλαδή ο f παριστάνει γεωμετρικά στροφή επιπέδου (Π) κατά γωνία θ ως προς άξονα (ϵ) κάθετο στο επίπεδο. Η ισομετρία A καλείται **γνήσια ισομετρία** αν $\theta \neq 0, \pi$. Ισοδύναμα ισομετρία f με $\text{Det}(f) = 1$, είναι γνήσια, αν $f \neq \text{Id}_{\mathcal{E}}$ και η f δεν έχει πραγματικές ιδιοτιμές, εκτός της $\lambda = 1$.

Παρόμοια αν A είναι ένας ορθογώνιος 3×3 πίνακας με ορίζουσα $|A| = 1$, δηλαδή ο A παριστάνει γεωμετρικά στροφή επιπέδου (Π) κατά γωνία θ ως προς άξονα (ϵ) κάθετο στο επίπεδο. Ο A καλείται **γνήσια ορθογώνιος** αν $\theta \neq 0, \pi$. Ισοδύναμα ο ορθογώνιος πίνακας A με $|A| = 1$, είναι γνήσια ορθογώνιος, αν $A \neq I_3$ και ο A δεν έχει πραγματικές ιδιοτιμές, εκτός της $\lambda = 1$.

Άσκηση 26. «Γνήσιες Στροφές Επιπέδου στον χώρο μεταίθενται αν και μόνον αν έχουν κοινό άξονα στροφής»

(1) Έστω A και B δύο γνήσια ορθογώνιοι 3×3 πίνακες.

Να δειχθεί ότι $A \cdot B = B \cdot A$ αν και μόνον αν οι A και B έχουν κοινό ιδιοδιάνυσμα το οποίο αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή 1, δηλαδή αν και μόνον αν οι A και B έχουν κοινό άξονα στροφής.

(2) Έστω $f, g: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ δύο γνήσιες ισομετρίες του Ευκλείδειου χώρου $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, όπου $\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} = 3$.

Να δειχθεί ότι $f \circ g = g \circ f$ αν και μόνον αν οι f και g έχουν κοινό ιδιοδιάνυσμα το οποίο αντιστοιχεί στην ιδιοτιμή 1, δηλαδή αν και μόνον αν οι A και B έχουν κοινό άξονα στροφής.

Άσκηση 27. Να δειχθεί ότι κάθε ορθογώνιος πίνακας $A \in M_3(\mathbb{R})$ με ορίζουσα $|A| = -1$ είναι όμοιος με ακριβώς έναν από τους παρακάτω ορθογώνιους πίνακες

(1)

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν $A = -I_3$ ή ισοδύναμα η μόνη ιδιοτιμή του A είναι η $\lambda = -1$ με πολλαπλότητα ίση με 3.

(2)

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν ο πίνακας A έχει τουλάχιστον μια ιδιοτιμή διαφορετική της $\lambda = -1$.

(3)

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \quad (\dagger)$$

για μια μοναδική γωνία $\theta \in [0, 2\pi)$, με: $\theta \neq 0, \pi$.

Αυτό συμβαίνει αν και μόνον αν η μόνη πραγματική ιδιοτιμή του A είναι η $\lambda = -1$.