

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ Β'

(Αρχικό γράμμα επωνύμου: Λ - Ω)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΦΥΛΛΑΔΙΟ 7

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Α. Μπεληγιάννης

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

<http://users.uoi.gr/abeligia/LinearAlgebraII/LAII2020/LAII2020.html>

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Άσκηση 1. Αν $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι ένας ενδομορφισμός του Ευκλείδειου χώρου $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ πεπερασμένης διάστασης, τότε:

$$\text{ο ενδομορφισμός } f \text{ είναι ισομετρία} \iff f^* \circ f = \text{Id}_{\mathcal{E}}$$

δηλαδή ο f είναι ισομετρία αν και μόνον αν ο f είναι ισομορφισμός και $f^* = f^{-1}$.

Λύση. « \implies » Έστω ότι ο ενδομορφισμός f είναι ισομετρία. Τότε γνωρίζουμε ότι ο f είναι ισομορφισμός και, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, \text{Id}_{\mathcal{E}}(\vec{y}) \rangle &= \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, f^*(f(\vec{y})) \rangle = \langle \vec{x}, (f^* \circ f)(\vec{y}) \rangle \implies \\ &\implies \text{Id}_{\mathcal{E}}(\vec{y}) = (f^* \circ f)(\vec{y}) \implies f^* \circ f = \text{Id}_{\mathcal{E}} \end{aligned}$$

Γνωρίζουμε τότε ότι $f^* = f^{-1}$.

« \impliedby » Έστω ότι για τον ενδομορφισμό f ισχύει ότι $f^* \circ f = \text{Id}_{\mathcal{E}}$. Η τελευταία σχέση δείχνει άμεσα ότι ο f είναι μονομορφισμός και άρα ο f είναι ισομορφισμός διότι ο χώρος \mathcal{E} έχει πεπερασμένη διάσταση. Προφανώς τότε $f^* = f^{-1}$, και θα έχουμε $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x}), f(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, f^*(f(\vec{y})) \rangle = \langle \vec{x}, (f^* \circ f)(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, (f^{-1} \circ f)(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, \text{Id}(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

Επομένως ο ενδομορφισμός f είναι ισομετρία. ■

Άσκηση 2. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος και $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Να δειχθεί ότι:

$$\langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle = 0, \quad \forall \vec{x} \in \mathcal{E} \iff f^* = -f$$

Αν $f^* = -f$, ποιές είναι οι πραγματικές ιδιοτιμές της f ;

Λύση. Έστω $f^* = -f$ και $\vec{x} \in \mathcal{E}$. Τότε:

$$\begin{aligned} \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle &= \langle \vec{x}, f^*(\vec{x}) \rangle = \langle \vec{x}, -f(\vec{x}) \rangle = -\langle \vec{x}, f(\vec{x}) \rangle = -\langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle \\ &\implies 2 \cdot \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle = 0 \implies \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle = 0 \end{aligned}$$

Αντίστροφα έστω $\langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle = 0, \forall \vec{x} \in \mathcal{E}$. Τότε για κάθε $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$ έχουμε:

$$\begin{aligned}
\langle f(\vec{x} + \vec{y}), \vec{x} + \vec{y} \rangle = 0 &\implies \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{y} \rangle = 0 \\
&\implies \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{x} \rangle = 0 \\
&\implies \langle \vec{x}, f^*(\vec{y}) \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{x} \rangle = 0 \\
&\implies \langle f^*(\vec{y}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{x} \rangle = 0 \\
&\implies \langle f^*(\vec{y}) + f(\vec{y}), \vec{x} \rangle = 0, \forall \vec{x} \in \mathcal{E} \\
&\implies f^*(\vec{y}) = -f(\vec{y}), \forall \vec{y} \in \mathcal{E} \\
&\implies f^* = -f
\end{aligned}$$

Υποθέτουμε ότι $f^* = -f$ και έστω $\lambda \in \mathbb{R}$ μια ιδιοτιμή του f . Συνεπώς υπάρχει ένα μη-μηδενικό διάνυσμα $\vec{x} \in \mathcal{E}$ έτσι ώστε $f(\vec{x}) = \lambda\vec{x}$. Τότε:

$$0 = \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle \lambda\vec{x}, \vec{x} \rangle \implies \begin{cases} \lambda \cdot \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = 0 \\ \vec{x} \neq \vec{0} \end{cases} \implies \lambda = 0$$

Επομένως αν $f^* = -f$ τότε η μόνη πραγματική ιδιοτιμή του f είναι: $\lambda = 0$. ■

Ένας ενδομορφισμός $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ του Ευκλείδειου χώρου $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ καλείται **αντισυμμετρικός** αν και μόνον αν ισχύει ότι: $f^* = -f$.

Άσκηση 3. Να δείχθει ότι ένας ενδομορφισμός $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ του Ευκλείδειου χώρου πεπερασμένης διάστασης $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ είναι αντισυμμετρικός αν και μόνον αν ο πίνακας του f σε μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} είναι αντισυμμετρικός.

Λύση. Έστω $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} . Έστω $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = A = (a_{ij})$ ο πίνακας του f στην \mathcal{B} . Γνωρίζουμε τότε ότι

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*) = {}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = {}^t A$$

Θα χρησιμοποιήσουμε το γνωστό αποτέλεσμα από τη Γραμμική Άλγεβρα I ότι η απεικόνιση

$$\Phi: \mathcal{L}(\mathcal{E}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), \quad f \mapsto \Phi(f) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

είναι ισομορφισμός, όπου $\mathcal{L}(\mathcal{E})$ συμβολίζει τον \mathbb{R} -διανυσματικό χώρο των ενδομορφισμών του \mathcal{E} .

« \implies » Έστω ότι ο ενδομορφισμός f είναι αντισυμμετρικός, δηλαδή $f^* = -f$. Τότε θα έχουμε:

$${}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(-f) = -M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) \implies {}^t A = -A$$

δηλαδή ο πίνακας $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ είναι αντισυμμετρικός.

« \impliedby » Έστω ότι ο πίνακας $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ του ενδομορφισμού f στην ορθοκανονική βάση \mathcal{B} είναι αντισυμμετρικός, δηλαδή ${}^t A = -A$. Τότε θα έχουμε:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*) = {}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = {}^t A = -A = -M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(-f) \implies f^* = -f$$

δηλαδή ο ενδομορφισμός f είναι αντισυμμετρικός. ■

Άσκηση 4. Θεωρούμε τον Ευκλείδειο χώρο \mathbb{R}^3 εφοδιασμένο με το συνηθισμένο εσωτερικό γινόμενο. Έστω $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ο μοναδικός ενδομορφισμός του οποίου ο πίνακας στην κανονική βάση του \mathbb{R}^3 είναι ο πίνακας

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 \\ 3 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Να προσδιορισθεί ο προσαρτημένος ενδομορφισμός $f^*: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ του f .

Λύση. Γνωρίζουμε ότι ο πίνακας της f^* σε μια ορθοκανονική βάση \mathcal{B} είναι ο ανάστροφος του πίνακα της f στην \mathcal{B} , δηλαδή

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*) = {}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

Επειδή η κανονική βάση $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ του \mathbb{R}^3 είναι ορθοκανονική έπεται ότι

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*) = {}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = {}^t A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Έστω $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$. Τότε γνωρίζουμε ότι $f(x, y, z) = (x', y', z')$, όπου:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 3y + 4z \\ x + 2z \\ 4x + 3y + z \end{pmatrix} \quad f^*(x, y, z) = (2x + 3y + 4z, x + 2z, 4x + 3y + z)$$

Επομένως

$$f^*(x, y, z) = (2x + 3y + 4z, x + 2z, 4x + 3y + z)$$

Δεύτερος Τρόπος: Από το πίνακα A έχουμε ότι ο ενδομορφισμός f ορίζεται ως εξής, $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$f(x, y, z) = (2x + y + 4z, 3x + 3z, 4x + 2y + z)$$

Έστω $(x, y, z), (x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3$. Τότε έχουμε:

$$\begin{aligned} \langle (x_1, y_1, z_1), f^*(x, y, z) \rangle &= \langle f(x_1, y_1, z_1), (x, y, z) \rangle \\ &= \langle (2x_1 + y_1 + 4z_1, 3x_1 + 3z_1, 4x_1 + 2y_1 + z_1), (x, y, z) \rangle \\ &= 2x_1x + y_1x + 4z_1x + 3x_1y + 3z_1y + 4x_1z + 2y_1z + z_1z \\ &= x_1(2x + 3y + 4z) + y_1(x + 2z) + z_1(4x + 3y + z) \\ &= \langle (x_1, y_1, z_1), (2x + 3y + 4z, x + 2z, 4x + 3y + z) \rangle \end{aligned}$$

για κάθε $(x_1, y_1, z_1) \in \mathbb{R}^3$. Άρα ο προσαρτημένος ενδομορφισμός $f^*: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ του f ορίζεται ως εξής, $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$f^*(x, y, z) = (2x + 3y + 4z, x + 2z, 4x + 3y + z) \quad \blacksquare$$

Άσκηση 5. Θεωρούμε τον Ευκλείδειο χώρο \mathbb{R}^3 εφοδιασμένο με το συνηθισμένο εσωτερικό γινόμενο. Έστω $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ ένας ενδομορφισμός για τον οποίο ισχύει ότι:

$$f(1, 0, 1) = (1, 4, 1), \quad f(1, 0, -1) = (-3, 0, 3), \quad f(0, 1, 0) = (2, -1, 2)$$

Να προσδιορισθεί ο προσαρτημένος ενδομορφισμός $f^*: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ του f .

Λύση. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε εύκολα, το σύνολο $\mathcal{C} = \{(1, 0, 1), (1, 0, -1), (0, 1, 0)\}$ αποτελεί βάση του \mathbb{R}^3 η οποία όμως δεν είναι ορθοκανονική. Άρα επειδή γνωρίζουμε τη τιμή της f στα διανύσματα της βάσης \mathcal{C} , μπορούμε να προσδιορίσουμε τον πίνακα του f στη κανονική βάση $\mathcal{B} = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ του \mathbb{R}^3 . Έχουμε:

$$\begin{cases} (1, 0, 0) = \frac{1}{2} \cdot (1, 0, 1) + \frac{1}{2} \cdot (1, 0, -1) + 0 \cdot (0, 1, 0) \\ (0, 1, 0) = 0 \cdot (1, 0, 1) + 0 \cdot (1, 0, -1) + 1 \cdot (0, 1, 0) \\ (0, 0, 1) = \frac{1}{2} \cdot (1, 0, 1) + (-\frac{1}{2}) \cdot (1, 0, -1) + 0 \cdot (0, 1, 0) \end{cases}$$

και άρα

$$\begin{cases} f(1, 0, 0) = \frac{1}{2} \cdot f(1, 0, 1) + \frac{1}{2} \cdot f(1, 0, -1) = (\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}) + (-\frac{3}{2}, 0, \frac{3}{2}) = (-1, 2, 2) \\ f(0, 1, 0) = 1 \cdot f(0, 1, 0) = (2, -1, 2) \\ f(0, 0, 1) = \frac{1}{2} \cdot f(1, 0, 1) + (-\frac{1}{2}) \cdot f(1, 0, -1) = (\frac{1}{2}, 2, \frac{1}{2}) + (\frac{3}{2}, 0, -\frac{3}{2}) = (2, 2, -1) \end{cases}$$

Επομένως ο πίνακας του f στην κανονική βάση \mathcal{B} του \mathbb{R}^3 είναι

$$A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

Υπενθυμίζουμε ότι

Θεωρία: Ένας ενδομορφισμός $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ μεταξύ Ευκλείδειων χώρων πεπερασμένης διάστασης είναι αυτοπροσαρτημένος αν και μόνο αν ο πίνακας του f σε μια ορθοκανονική βάση \mathcal{B} του \mathcal{E} είναι συμμετρικός, δηλαδή:

$$f = f^* \iff M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = {}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

Επομένως επειδή ο πίνακας A είναι συμμετρικός έπεται ότι $f = f^*$ και άρα ο προσαρτημένος ενδομορφισμός f^* του f συμπίπτει με τον f : $f^* = f$.

Δεύτερος Τρόπος: Παρατηρούμε ότι η βάση \mathcal{C} είναι ορθογώνια αλλά όχι ορθοκανονική. Για να κάνουμε την \mathcal{C} ορθοκανονική διαιρούμε κάθε διάνυσμα της βάσης \mathcal{C} με το μήκος του και έτσι αποκτούμε την ορθοκανονική βάση

$$\mathcal{D} = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1), (0, 1, 0) \right\}$$

Υπολογίζουμε τον ενδομορφισμό f στην ορθοκανονική βάση \mathcal{D} :

$$\begin{cases} f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}f(1, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 4, 1) \\ f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}f(1, 0, -1) = \frac{1}{\sqrt{2}}(3, 0, -3) \\ f(0, 1, 0) = (2, -1, 2) \end{cases}$$

και κατόπιν εκφράζουμε τα διανύσματα αυτά ως γραμμικό συνδυασμό της ορθοκανονικής βάσης \mathcal{D} :

$$\begin{cases} f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 4, 1) = 1 \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) + 0 \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1) + 2\sqrt{2}(0, 1, 0) \\ f\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(3, 0, -3) = 0 \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) - 3 \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1) + 0\sqrt{2}(0, 1, 0) \\ f(0, 1, 0) = (2, -1, 2) = 2\sqrt{2} \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) + 0 \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1) - 1\sqrt{2}(0, 1, 0) \end{cases}$$

Επομένως ο πίνακας της f στην ορθοκανονική βάση \mathcal{D} είναι:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2\sqrt{2} \\ 0 & -3 & 0 \\ 2\sqrt{2} & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

ο οποίος είναι συμμετρικός. Επομένως θα έχουμε $f^* = f$. ■

Άσκηση 6. Στον Ευκλείδειο χώρο $M_2(\mathbb{R})$ εφοδιασμένο με το συνηθισμένο εσωτερικό γινόμενο

$$\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A \cdot {}^t B)$$

θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f: M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R}), \quad f \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & z \\ y & w \end{pmatrix}$$

Να εξετάσετε αν ο f είναι: (α) ισομετρία, και (β) αυτοπροσαρτημένος.

Λύση. Έχουμε:

$$\|f \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix}\| = \left\| \begin{pmatrix} x & z \\ y & w \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\text{Tr} \left[\begin{pmatrix} x & z \\ y & w \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \right]} = \sqrt{\text{Tr} \left[\begin{pmatrix} x^2+z^2 & xy+zw \\ yx+wz & y^2+w^2 \end{pmatrix} \right]} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$$

και

$$\left\| \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\text{Tr} \left[\begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & z \\ y & w \end{pmatrix} \right]} = \sqrt{\text{Tr} \left[\begin{pmatrix} x^2+y^2 & xz+yw \\ zx+wy & z^2+w^2 \end{pmatrix} \right]} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + w^2}$$

Επομένως ο f είναι ισομετρία.

Η κανονική βάση

$$\mathcal{B} = \left\{ E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

του Ευκλείδειου χώρου $M_2(\mathbb{R})$ είναι προφανώς ορθοκανονική. Τότε ο πίνακας της f στη βάση \mathcal{B} είναι

$$\left\{ \begin{array}{l} f \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot E_1 + 0 \cdot E_2 + 0 \cdot E_3 + 0 \cdot E_4 \\ f \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot E_1 + 0 \cdot E_2 + 1 \cdot E_3 + 0 \cdot E_4 \\ f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot E_1 + 1 \cdot E_2 + 0 \cdot E_3 + 0 \cdot E_4 \\ f \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot E_1 + 0 \cdot E_2 + 0 \cdot E_3 + 1 \cdot E_4 \end{array} \right. \implies A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Παρατηρούμε ότι ο πίνακας A είναι

$$\left\{ \begin{array}{l} A : \text{ορθογώνιος} \implies f : \text{ισομετρία} \\ A : \text{συμμετρικός} \implies f : \text{αυτοπροσαρτημένος} \end{array} \right.$$

Άρα ο f είναι ισομετρία και $f^* = f$. ■

Η προηγούμενη Άσκηση είναι ειδική περίπτωση της ακόλουθης Άσκησης.

Άσκηση 7. Έστω ο Ευκλείδειος χώρος $M_n(\mathbb{R})$ ο οποίος είναι εφοδιασμένος με το συνηθισμένο εσωτερικό γινόμενο

$$\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A \cdot {}^t B)$$

θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f: M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow M_n(\mathbb{R}), \quad f(A) = {}^t A$$

Τότε ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος και ισομετρία.

Λύση. Για κάθε $n \times n$ πίνακα A θα έχουμε:

$$\langle f(A), f(A) \rangle = \langle {}^t A, {}^t A \rangle = \text{Tr}({}^t A \cdot {}^t({}^t A)) = \text{Tr}({}^t A \cdot A)$$

Γνωρίζουμε ότι για την απεικόνιση ίχνους

$$\text{Tr}: M_n(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad A \longmapsto \text{Tr}(A), \quad \text{ισχύει ότι: } \text{Tr}(A \cdot B) = \text{Tr}(B \cdot A)$$

Επομένως η προηγούμενη σχέση γράφεται:

$$\langle f(A), f(A) \rangle = \text{Tr}({}^t A \cdot A) = \text{Tr}(A \cdot {}^t A) = \langle A, A \rangle$$

και άρα ο ενδομορφισμός f είναι ισομετρία. Ιδιαίτερα θα έχουμε ότι (βλέπε την Άσκηση 1):

$$f^{-1} = f^* \quad (*)$$

Παρατηρούμε ότι, επειδή, $\forall A \in M_n(\mathbb{R}): f^2(A) = f(f(A)) = f({}^t A) = {}^t({}^t A) = A$, θα έχουμε:

$$f^2 = \text{Id}_{M_n(\mathbb{R})}$$

απ' όπου έπεται ότι

$$f^{-1} = f \quad (**)$$

Από τις σχέσεις (*) και (**) έπεται ότι:

$$f^* = f$$

και άρα ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος. ■

Άσκηση 8. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης και

$$f, g: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

δύο ενδομορφισμοί του \mathcal{E} . Αν $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, να δειχθούν τα εξής:

(1)

$$0^* = 0 \quad \text{και} \quad \text{Id}_{\mathcal{E}}^* = \text{Id}_{\mathcal{E}}$$

(2)

$$(\lambda f + \mu g)^* = \lambda f^* + \mu g^*$$

(3)

$$(f^*)^* = f$$

Λύση. (1) Θα έχουμε:

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}: \langle \vec{x}, \text{Id}_{\mathcal{E}}^*(\vec{y}) \rangle = \langle \text{Id}_{\mathcal{E}}(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle \implies \forall \vec{y} \in \mathcal{E}: \text{Id}_{\mathcal{E}}^*(\vec{y}) = \vec{y} \implies \text{Id}_{\mathcal{E}}^* = \text{Id}_{\mathcal{E}}$$

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}: \langle \vec{x}, 0_{\mathcal{E}}^*(\vec{y}) \rangle = \langle 0_{\mathcal{E}}(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \vec{0}, \vec{y} \rangle = 0 \implies \forall \vec{y} \in \mathcal{E}: 0_{\mathcal{E}}^*(\vec{y}) \in \mathcal{E}^{\perp} = \{\vec{0}\} \implies 0_{\mathcal{E}}^* = 0_{\mathcal{E}}$$

(2) Έστω $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$. Τότε:

$$\begin{aligned}
 \langle \vec{x}, (\lambda f + \mu g)^*(\vec{y}) \rangle &= \langle (\lambda f + \mu g)(\vec{x}), \vec{y} \rangle \\
 &= \langle \lambda f(\vec{x}) + \mu g(\vec{x}), \vec{y} \rangle \\
 &= \langle \lambda f(\vec{x}), \vec{y} \rangle + \langle \mu g(\vec{x}), \vec{y} \rangle \\
 &= \lambda \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle + \mu \langle g(\vec{x}), \vec{y} \rangle \\
 &= \lambda \langle \vec{x}, f^*(\vec{y}) \rangle + \mu \langle \vec{x}, g^*(\vec{y}) \rangle \\
 &= \langle \vec{x}, \lambda f^*(\vec{y}) \rangle + \langle \vec{x}, \mu g^*(\vec{y}) \rangle \\
 &= \langle \vec{x}, \lambda f^*(\vec{y}) + \mu g^*(\vec{y}) \rangle \\
 &= \langle \vec{x}, (\lambda f^* + \mu g^*)(\vec{y}) \rangle
 \end{aligned}$$

Εφόσον η παραπάνω ισότητα ισχύει για κάθε $\vec{x} \in \mathcal{E}$ τότε προκύπτει ότι

$$(\lambda f + \mu g)^*(\vec{y}) = (\lambda f^* + \mu g^*)(\vec{y}), \quad \forall \vec{y} \in \mathcal{E} \implies (\lambda f + \mu g)^* = \lambda f^* + \mu g^*$$

(3) Για το δεύτερο ερώτημα έχουμε:

$$\langle \vec{x}, (f^*)^*(\vec{y}) \rangle = \langle f^*(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, f(\vec{y}) \rangle, \quad \forall \vec{x} \in \mathcal{E}$$

και άρα $(f^*)^*(\vec{y}) = f(\vec{y})$ για κάθε $\vec{y} \in \mathcal{E}$. Επομένως: $(f^*)^* = f$. ■

Άσκηση 9. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης και

$$f, g : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

δύο ενδομορφισμοί του \mathcal{E} . Ναδειχθούν τα εξής:

(1)

$$(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$$

(2) Ο ενδομορφισμός f είναι ισομορφισμός αν και μόνον ο ενδομορφισμός f^* είναι ισομορφισμός, και τότε:

$$(f^*)^{-1} = (f^{-1})^*$$

Λύση. (1) Για τυχόντα διανύσματα $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$, θα έχουμε:

$$\langle \vec{x}, (f \circ g)^*(\vec{y}) \rangle = \langle (f \circ g)(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle f(g(\vec{x})), \vec{y} \rangle = \langle g(\vec{x}), f^*(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, g^*(f^*(\vec{y})) \rangle = \langle \vec{x}, (g^* \circ f^*)(\vec{y}) \rangle$$

Επειδή η παραπάνω σχέση ισχύει για κάθε $\vec{x} \in \mathcal{E}$, έπεται ότι: $(f \circ g)^*(\vec{y}) = g^*(f^*(\vec{y})) = (g^* \circ f^*)(\vec{y})$, $\forall \vec{y} \in \mathcal{E}$. Επομένως:

$$(f \circ g)^* = g^* \circ f^*$$

(2) Αν ο f είναι ισομορφισμός, τότε επειδή $f \circ f^{-1} = \text{Id}_{\mathcal{E}} = f^{-1} \circ f$, από το μέρος (1) και λαμβάνοντας υπ όψιν ότι $\text{Id}_{\mathcal{E}}^* = \text{Id}_{\mathcal{E}}$, θα έχουμε:

$$(f \circ f^{-1})^* = \text{Id}_{\mathcal{E}}^* = (f^{-1} \circ f)^* \implies (f^{-1})^* \circ f^* = \text{Id}_{\mathcal{E}} = f^* \circ (f^{-1})^*$$

Η παραπάνω σχέση δείχνει ότι η f^* είναι ισομορφισμός και

$$(f^*)^{-1} = (f^{-1})^*$$

Αντίστροφα αν η f^* είναι ισομορφισμός, τότε υπάρχει ενδομορφισμός $g: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ έτσι ώστε:

$$f^* \circ g = \text{Id}_{\mathcal{E}} = g \circ f^*$$

δηλαδή $g = f^{-1}$. Τότε όπως παραπάνω θα έχουμε:

$$(f^* \circ g)^* = \text{Id}_{\mathcal{E}}^* = (g \circ f^*)^* \implies g^* \circ (f^*)^* = \text{Id}_{\mathcal{E}} = (f^*)^* \circ g^*$$

Από την Άσκηση 8, έχουμε $(f^*)^* = f$ και άρα η παραπάνω σχέση γράφεται:

$$g^* \circ f = \text{Id}_{\mathcal{E}} = f \circ g^*$$

Τότε προφανώς η f είναι ισομορφισμός, με αντίστροφη την $g^* = (f^{-1})^*$. ■

Άσκηση 10. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Ναδειχθεί ότι δύο από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες συνεπάγονται την τρίτη συνθήκη:

- (1) Ο ενδομορφισμός f είναι ισομετρία.
- (2) Ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος.
- (3) $f^2 = \text{Id}_{\mathcal{E}}$.

Ιδιαίτερα, για έναν πίνακα $A \in M_n(\mathbb{R})$, δύο από τις ακόλουθες τρεις συνθήκες συνεπάγονται την τρίτη συνθήκη:

- (1) Ο πίνακας A είναι ορθογώνιος.
- (2) Ο πίνακας A είναι συμμετρικός.
- (3) $A^2 = I_n$.

Λύση. • (1) + (2) \implies (3) Έστω ότι ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος, δηλαδή $f^* = f$, και ισομετρία. Από την Άσκηση 1 τότε θα έχουμε $f^* \circ f = \text{Id}_{\mathcal{E}}$ και επομένως $f \circ f = f^2 = \text{Id}_{\mathcal{E}}$.

• (2) + (3) \implies (1) Έστω ότι ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος, δηλαδή $f^* = f$, και ισχύει ότι $f^2 = \text{Id}_{\mathcal{E}}$. Τότε $\text{Id}_{\mathcal{E}} = f \circ f = f^* \circ f$ και τότε από την Άσκηση 1 έπεται ότι ο ενδομορφισμός f είναι ισομετρία.

• (1) + (3) \implies (2) Έστω ότι ο ενδομορφισμός f είναι ισομετρία, δηλαδή σύμφωνα με την Άσκηση 1 έχουμε $f^* \circ f = \text{Id}_{\mathcal{E}}$, και ισχύει ότι $f^2 = \text{Id}_{\mathcal{E}}$, δηλαδή $f \circ f = \text{Id}_{\mathcal{E}}$. Από την τελευταία σχέση τότε έπεται ότι ο ενδομορφισμός f είναι ισομορφισμός και $f^{-1} = f$, και από τη σχέση $f^* \circ f = \text{Id}_{\mathcal{E}}$ έπεται ότι ο ενδομορφισμός f είναι ισομορφισμός και $f^{-1} = f^*$. Άρα $f^* = f^{-1} = f$, δηλαδή ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος.

Αν $A \in M_n(\mathbb{R})$, θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f_A: \mathbb{R}_n \rightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X$$

του οποίου ο πίνακας στην κανονική βάση του \mathbb{R}_n , η οποία είναι ορθοκανονική, είναι ο A . Εργαζόμενοι με τον ενδομορφισμό f_A , ο ισχυρισμός του δεύτερου μέρους της Άσκησης προκύπτει από το πρώτο μέρος, χρησιμοποιώντας ότι: (α) ένας ενδομορφισμός f ενός Ευκλείδειου χώρου πεπερασμένης διάστασης \mathcal{E} είναι αυτοπροσαρτημένος αν και μόνον αν ο πίνακας του A σε μια ορθοκανονική βάση \mathcal{B} είναι συμμετρικός, (β) ο ενδομορφισμός είναι ισομετρία αν και μόνον αν ο πίνακας του A σε μια ορθοκανονική βάση \mathcal{B} είναι ορθογώνιος, και (γ) $f^2 = \text{Id}_{\mathcal{E}}$ αν και μόνον αν $A^2 = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)^2 = I_n$. ■

Άσκηση 11. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και έστω ο \mathbb{R} -διανυσματικός χώρος

$$\mathcal{L}(\mathcal{E}) = \{f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E} \mid f: \text{ενδομορφισμός του } \mathcal{E}\}$$

των ενδομορφισμών του \mathcal{E} . Ναδειχθεί ότι ορίζοντας¹

$$\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle: \mathcal{L}(\mathcal{E}) \times \mathcal{L}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle\langle f, g \rangle\rangle = \text{Tr}(f \circ g^*)$$

¹Το ίχνος $\text{Tr}(h)$ ενός ενδομορφισμού $h: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ορίζεται να είναι το ίχνος $\text{Tr}(A)$ του πίνακα A του h σε μια βάση \mathcal{B} του \mathcal{E} . Επειδή, όπως γνωρίζουμε από τη Γραμμική Άλγεβρα I, όμοιοι πίνακες έχουν το ίδιο ίχνος, αν \mathcal{C} είναι μια άλλη βάση του \mathcal{E} και αν B είναι ο πίνακας του h στην \mathcal{C} , τότε $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B)$.

αποκτούμε ένα εσωτερικό γινόμενο στον \mathbb{R} -διανυσματικό χώρο $\mathcal{L}(\mathcal{E})$ και άρα το ζεύγος $(\mathcal{L}(\mathcal{E}), \langle \langle \cdot, \cdot \rangle \rangle)$ είναι ένας Ευκλείδειος χώρος. Επιπλέον να δειχθεί ότι οι Ευκλείδειοι χώροι $(\mathcal{L}(\mathcal{E}), \langle \langle \cdot, \cdot \rangle \rangle)$ και $(M_n(\mathbb{R}), \langle \cdot, \cdot \rangle)$, όπου $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(A \cdot {}^t B)$, είναι ισομετρικά ισόμορφοι.

Λύση. Έστω $f, g, h: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ και $k \in \mathbb{R}$.

(1) Θεωρούμε την απεικόνιση

$$\text{Tr}: \mathcal{L}(\mathcal{E}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \mapsto \text{Tr}(f) = \text{Tr}(A)$$

όπου $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ είναι ο πίνακας του f σε μια βάση \mathcal{B} του \mathcal{E} . Γνωρίζουμε ότι η απεικόνιση Tr είναι γραμμική. Έστω \mathcal{B} μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} και έστω:

$$A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f), \quad B = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(g), \quad C = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(h)$$

Τότε γνωρίζουμε ότι:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f+g) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) + M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(g) = A + B, \quad M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(kf) = kM_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = kA, \quad M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f \circ g) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(g) = A \cdot B$$

και τότε:

$$\text{Tr}(f \circ g) = \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f \circ g)) = \text{Tr}(A \cdot B) = \text{Tr}(B \cdot A) = \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(g \circ f)) = \text{Tr}(g \circ f)$$

Τέλος επειδή $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*) = {}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$, θα έχουμε:

$$\text{Tr}(f^*) = \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*)) = \text{Tr}({}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)) = \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)) = \text{Tr}(f)$$

όπου χρησιμοποιήσαμε ότι για κάθε πίνακα A : $\text{Tr}({}^t A) = \text{Tr}(A)$.

Με βάση τα παραπάνω, θα έχουμε:

$$\langle \langle f+g, h \rangle \rangle = \text{Tr}(f+g \circ h^*) = \text{Tr}(f \circ h^* + g \circ h^*) = \text{Tr}(f \circ h^*) + \text{Tr}(g \circ h^*) = \langle \langle f, h \rangle \rangle + \langle \langle g, h \rangle \rangle$$

$$\langle \langle kf, g \rangle \rangle = \text{Tr}((kf) \circ g^*) = \text{Tr}(k(f \circ g^*)) = k \text{Tr}(f \circ g^*) = k \langle \langle f, g \rangle \rangle$$

$$\langle \langle f, g \rangle \rangle = \text{Tr}(f \circ g^*) = \text{Tr}((f \circ g^*)^*) = \text{Tr}((g^*)^* \circ f^*) = \text{Tr}(g \circ f^*) = \langle \langle g, f \rangle \rangle$$

$$\langle \langle f, f \rangle \rangle = \text{Tr}(f \circ f^*) = \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f \circ f^*)) = \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*)) = \text{Tr}(A \cdot {}^t A)$$

Όμως αν $A = (a_{ij})$, τότε βλέπουμε εύκολα ότι:

$$\text{Tr}(A \cdot {}^t A) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 \geq 0 \quad \text{και}$$

και άρα:

$$\text{Tr}(A \cdot {}^t A) = 0 \iff \sum_{i,j=1}^n a_{ij}^2 = 0 \iff a_{ij} = 0, 1 \leq i, j \leq n \iff A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = O \iff f = 0$$

Επομένως:

$$\langle \langle f, f \rangle \rangle \geq 0, \quad \text{και} \quad \langle \langle f, f \rangle \rangle = 0 \iff f = 0$$

Οι παραπάνω σχέσεις δείχνουν ότι η απεικόνιση $\langle \langle \cdot, \cdot \rangle \rangle$ είναι ένα εσωτερικό γινόμενο στον \mathbb{R} -διανυσματικό χώρο $\mathcal{L}(\mathcal{E})$.

Γνωρίζουμε ότι η απεικόνιση

$$\Phi: \mathcal{L}(\mathcal{E}) \rightarrow M_n(\mathbb{R}), \quad \Phi(f) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

είναι ένας ισομορφισμός, όπου $n = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E}$, και \mathcal{B} είναι τυχούσα βάση του \mathcal{E} . Υποθέτοντας ότι η βάση \mathcal{B} είναι ορθοκανονική, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \langle \Phi(f), \Phi(f) \rangle &= \langle M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f), M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) \rangle = \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot {}^t M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)) = \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f^*)) = \\ &= \text{Tr}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f \circ f^*)) = \langle \langle f, f \rangle \rangle \end{aligned}$$

Επομένως ο ισομορφισμός Φ είναι ισομετρία. ■

Άσκηση 12. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης. Έστω

$$\mathcal{U} = \{f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E} \mid f^* = f\} \quad \text{και} \quad \mathcal{V} = \{f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E} \mid f^* = -f\}$$

τα υποσύνολα του $\mathcal{L}(\mathcal{E})$ τα οποία αποτελούνται από τους αυτοπροσαρτημένους και αντισυμμετρικούς ενδομορφισμούς αντίστοιχα.

(1) Να δειχθεί ότι τα υποσύνολα \mathcal{U} και \mathcal{V} είναι υπόχωροι του $\mathcal{L}(\mathcal{E})$.

(2) Να δειχθεί ότι

$$\mathcal{L}(\mathcal{E}) = \mathcal{U} \oplus \mathcal{V} \quad \text{και} \quad \mathcal{U} \perp \mathcal{V}$$

(3) Να δειχθεί ότι $\mathcal{U}^\perp = \mathcal{V}$ και $\mathcal{V}^\perp = \mathcal{U}$.

Λύση. (1) Έστω $f_1, f_2 \in \mathcal{U}$, και $g_1, g_2 \in \mathcal{V}$, και $\kappa \in \mathbb{R}$. Τότε θα έχουμε:

$$f_1^* = f_1, \quad f_2^* = f_2 \quad \text{και} \quad g_1^* = -g_1, \quad g_2^* = -g_2$$

Χρησιμοποιώντας την Άσκηση 8 θα έχουμε:

$$0_{\mathcal{E}}^* = 0_{\mathcal{E}} = -0_{\mathcal{E}} \implies 0_{\mathcal{E}} \in \mathcal{U} \quad \text{και} \quad 0_{\mathcal{E}} \in \mathcal{V}$$

$$(f_1 - f_2)^* = f_1^* - f_2^* = f_1 - f_2 \implies f_1 - f_2 \in \mathcal{U}$$

$$(g_1 - g_2)^* = g_1^* - g_2^* = -g_1 - (-g_2) = -g_1 + g_2 = -(g_1 - g_2) \implies g_1 - g_2 \in \mathcal{V}$$

$$(kf_1)^* = kf_1^* = \kappa f_1 \implies kf_1 \in \mathcal{U} \quad \text{και} \quad (kg_1)^* = kg_1^* = \kappa(-g_1) = -(kg_1) \implies kg_1 \in \mathcal{V}$$

Επομένως τα υποσύνολα \mathcal{U} και \mathcal{V} είναι υπόχωροι του $\mathcal{L}(\mathcal{E})$.

(2) Έστω $f \in \mathcal{L}(\mathcal{E})$. Θεωρούμε τους ενδομορφισμούς

$$g = \frac{f + f^*}{2} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}, \quad g(\vec{x}) = \frac{f(\vec{x}) + f^*(\vec{x})}{2}$$

$$h = \frac{f - f^*}{2} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}, \quad h(\vec{x}) = \frac{f(\vec{x}) - f^*(\vec{x})}{2}$$

Χρησιμοποιώντας την Άσκηση 8 θα έχουμε:

$$g^* = \left(\frac{f + f^*}{2} \right)^* = \frac{f^* + (f^*)^*}{2} = \frac{f^* + f}{2} = \frac{f + f^*}{2} = g \implies g \in \mathcal{U}$$

$$h^* = \left(\frac{f - f^*}{2} \right)^* = \frac{f^* - (f^*)^*}{2} = \frac{f^* - f}{2} = -\frac{f - f^*}{2} = -h \implies h \in \mathcal{V}$$

Επειδή

$$g + h = \frac{f + f^*}{2} + \frac{f - f^*}{2} = f$$

έπεται ότι: $\mathcal{L}(\mathcal{E}) = \mathcal{U} + \mathcal{V}$. Έστω $f \in \mathcal{U} \cap \mathcal{V}$. Τότε $f^* = f$ και $f^* = -f$ και επομένως $f = -f$, δηλαδή $2f = 0$. Τότε, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$: $2f(\vec{x}) = \vec{0}$ και άρα $f(\vec{x}) = \vec{0}$, δηλαδή $f = 0$. Επομένως $\mathcal{U} \cap \mathcal{V} = \{0\}$. Συνοψίζοντας δείξαμε ότι:

$$\mathcal{L}(\mathcal{E}) = \mathcal{U} \oplus \mathcal{V}$$

(3) Έστω $f \in \mathcal{U}$ και $g \in \mathcal{V}$. Τότε θα έχουμε:

$$f^* = f \quad \text{και} \quad g^* = -g$$

Θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \langle\langle f, g \rangle\rangle &= \text{Tr}(f \circ g^*) = \text{Tr}(f \circ (-g)) = \text{Tr}(-(f \circ g)) = -\text{Tr}(f \circ g) = -\text{Tr}(g \circ f) = -\text{Tr}(g \circ f^*) = \\ &= -\langle\langle g, f \rangle\rangle = -\langle\langle f, g \rangle\rangle \implies 2\langle\langle f, g \rangle\rangle = 0 \implies \langle\langle f, g \rangle\rangle = 0 \end{aligned}$$

Επομένως:

$$\mathcal{U} \perp \mathcal{V}$$

και το ευθύ άθροισμα $\mathcal{L}(\mathcal{E}) = \mathcal{U} \oplus \mathcal{V}$ είναι ορθογώνιο ευθύ άθροισμα.

(4) Γνωρίζουμε ότι αν ένας Ευκλείδειος χώρος είναι το ορθογώνιο ευθύ άθροισμα δύο υπόχωρών του, τότε ο ένας υπόχωρος είναι το ορθογώνιο συμπλήρωμα του άλλου. Επομένως, επειδή $\mathcal{L}(\mathcal{E}) = \mathcal{U} \oplus \mathcal{V}$, θα έχουμε $\mathcal{U} = \mathcal{V}^\perp$ και $\mathcal{V} = \mathcal{U}^\perp$. ■

Άσκηση 13. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και έστω ο \mathbb{R} -διανυσματικός χώρος

$$\mathcal{L}(\mathcal{E}) = \{f: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E} \mid f: \text{ενδομορφισμός του } \mathcal{E}\}$$

των ενδομορφισμών του \mathcal{E} . Να δειχθεί ότι ο ενδομορφισμός

$$\Phi: \mathcal{L}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{L}(\mathcal{E}), \quad \Phi(f) = f^*$$

είναι αυτοπροσαρτημένος και ισομετρία, όπου ο Ευκλείδειος χώρος $\mathcal{L}(\mathcal{E})$ είναι εφοδιασμένος με το εσωτερικό γινόμενο της Άσκησης 11.

Λύση. Έστω $f, g \in \mathcal{L}(\mathcal{E})$ και $k \in \mathbb{R}$. Χρησιμοποιώντας την Άσκηση 8, θα έχουμε:

$$\Phi(f + g) = (f + g)^* = f^* + g^* = \Phi(f) + \Phi(g)$$

$$\Phi(kf) = (kf)^* = kf^* = k\Phi(f)$$

και επομένως η απεικόνιση Φ είναι ένας ενδομορφισμός του $\mathcal{L}(\mathcal{E})$. Για κάθε $f, g \in \mathcal{L}(\mathcal{E})$, θα έχουμε

$$\langle \Phi(f), \Phi(g) \rangle = \langle f^*, g^* \rangle = \text{Tr}(f^* \circ (g^*)^*) = \text{Tr}(f^* \circ g) = \text{Tr}(g \circ f^*) = \langle g, f \rangle = \langle f, g \rangle$$

και επομένως ο ενδομορφισμός Φ είναι ισομετρία.

Χρησιμοποιώντας την Άσκηση 8, θα έχουμε $\forall f \in \mathcal{L}(\mathcal{E})$:

$$\Phi^2(f) = \Phi(\Phi(f)) = \Phi(f^*) = (f^*)^* = f \implies \Phi^2 = \text{Id}_{\mathcal{L}(\mathcal{E})}$$

Επομένως η ισομετρία Φ ικανοποιεί τη σχέση $\Phi^2 = \text{Id}_{\mathcal{L}(\mathcal{E})}$ και τότε από την Άσκηση 10 προκύπτει ότι ο ενδομορφισμός Φ είναι αυτοπροσαρτημένος. ■

Άσκηση 14. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης. Θεωρούμε τον \mathbb{R} -διανυσματικό χώρο

$$\mathcal{E}^* = \{\phi: \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R} \mid \phi: \text{γραμμική}\}$$

(1) Να δειχθεί ότι η απεικόνιση

$$\Phi: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}^*, \quad \Phi(\vec{x}) = \langle \vec{x}, - \rangle, \quad \text{όπου} \quad \langle \vec{x}, - \rangle(\vec{y}) = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

είναι ισομορφισμός.

(2) Να ορισθεί επί του \mathcal{E}^* κατάλληλο εσωτερικό γινόμενο έτσι ώστε ο ισομορφισμός Φ να είναι ισομετρία.

Λύση. (1) Χρησιμοποιώντας τις βασικές ιδιότητες του εσωτερικού γινομένου, θα έχουμε, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}, \forall k \in \mathbb{R}$:

$$\Phi(\vec{x} + \vec{y}) = \langle \vec{x} + \vec{y}, - \rangle = \langle \vec{x}, - \rangle + \langle \vec{y}, - \rangle = \Phi(\vec{x}) + \Phi(\vec{y})$$

όπου η δεύτερη ισότητα προέκυψε διότι, $\forall \vec{z} \in \mathcal{E}$: $\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$, και άρα $\langle \vec{x} + \vec{y}, - \rangle = \langle \vec{x}, - \rangle + \langle \vec{y}, - \rangle$. Επίσης, $\forall k \in \mathbb{R}$:

$$\Phi(k\vec{x}) = \langle k\vec{x}, - \rangle = k\langle \vec{x}, - \rangle = k\Phi(\vec{x})$$

όπου η δεύτερη ισότητα προέκυψε διότι, $\forall \vec{z} \in \mathcal{E}$: $\langle k\vec{x}, \vec{z} \rangle = k\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle$, και άρα $\langle k\vec{x}, - \rangle = k\langle \vec{x}, - \rangle$. Επομένως η απεικόνιση Φ είναι γραμμική.

Έστω $\vec{x} \in \mathcal{E}$ έτσι ώστε $\Phi(\vec{x}) = \vec{0}$. Τότε $\langle \vec{x}, - \rangle = 0$, δηλαδή $\forall \vec{z} \in \mathcal{E}$: $\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle = 0$. Επιλέγοντας $\vec{z} = \vec{x}$, έχουμε $\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle = \|\vec{x}\|^2 = 0$ και επομένως $\vec{x} = \vec{0}$. Αυτό δείχνει ότι η γραμμική απεικόνιση Φ είναι μονομορφισμός. Από το Λήμμα του Riesz, έπεται ότι για κάθε στοιχείο $\phi \in \mathcal{E}^*$, δηλαδή για κάθε γραμμική απεικόνιση $\phi: \mathcal{E} \longrightarrow \mathbb{R}$, υπάρχει (μοναδικό) διάνυσμα $\vec{x} \in \mathcal{E}$ έτσι ώστε $\phi(\vec{z}) = \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle, \forall \vec{z} \in \mathcal{E}$. Δηλαδή $\Phi(\vec{x}) = \phi$ και η γραμμική απεικόνιση Φ είναι επιμορφισμός. Συνοψίζοντας δείξαμε ότι η γραμμική απεικόνιση Φ είναι ισομορφισμός.

(2) Έστω $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} . Ορίζουμε απεικόνιση

$$\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle : \mathcal{E}^* \times \mathcal{E}^* \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \langle\langle \phi, \psi \rangle\rangle = \sum_{i=1}^n \phi(\vec{e}_i)\psi(\vec{e}_i) = \phi(\vec{e}_1)\psi(\vec{e}_1) + \phi(\vec{e}_2)\psi(\vec{e}_2) + \dots + \phi(\vec{e}_n)\psi(\vec{e}_n)$$

Δείχνουμε ότι η απεικόνιση $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle$ είναι ένα εσωτερικό γινόμενο επί του \mathcal{E}^* . Για κάθε $\phi, \psi, \chi \in \mathcal{E}$ και για κάθε $k \in \mathbb{R}$, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \langle\langle \phi + \psi, \chi \rangle\rangle &= \sum_{i=1}^n (\phi + \psi)(\vec{e}_i)\chi(\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n (\phi(\vec{e}_i) + \psi(\vec{e}_i))\chi(\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n (\phi(\vec{e}_i)\chi(\vec{e}_i) + \psi(\vec{e}_i)\chi(\vec{e}_i)) = \\ &= \sum_{i=1}^n \phi(\vec{e}_i)\chi(\vec{e}_i) + \sum_{i=1}^n \psi(\vec{e}_i)\chi(\vec{e}_i) = \langle\langle \phi, \chi \rangle\rangle + \langle\langle \psi, \chi \rangle\rangle \\ \langle\langle k\phi, \psi \rangle\rangle &= \sum_{i=1}^n (k\phi)(\vec{e}_i)\psi(\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n k\phi(\vec{e}_i)\psi(\vec{e}_i) = k \left(\sum_{i=1}^n \phi(\vec{e}_i)\psi(\vec{e}_i) \right) = k \langle\langle \phi, \psi \rangle\rangle \\ \langle\langle \phi, \psi \rangle\rangle &= \sum_{i=1}^n \phi(\vec{e}_i)\psi(\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n \psi(\vec{e}_i)\phi(\vec{e}_i) = \langle\langle \psi, \phi \rangle\rangle \\ \langle\langle \phi, \phi \rangle\rangle &= \sum_{i=1}^n \phi(\vec{e}_i)\phi(\vec{e}_i) = \sum_{i=1}^n \phi(\vec{e}_i)^2 \geq 0 \end{aligned}$$

και

$$\langle\langle \phi, \phi \rangle\rangle = 0 \implies \sum_{i=1}^n \phi(\vec{e}_i)^2 = 0 \implies \phi(\vec{e}_i)^2 = 0, \quad 1 \leq i \leq n, \implies \phi(\vec{e}_i) = 0, \quad 1 \leq i \leq n$$

Τότε όμως $\phi = 0$, διότι για κάθε διάνυσμα $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + \dots + x_n\vec{e}_n \in \mathcal{E}$, θα έχουμε: $\phi(\vec{x}) = x_1\phi(\vec{e}_1) + \dots + x_n\phi(\vec{e}_n) = 0$. Επομένως η απεικόνιση $\langle\langle \cdot, \cdot \rangle\rangle$ είναι ένα εσωτερικό γινόμενο επί του \mathcal{E}^* .

Τέλος θα έχουμε, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\langle\langle \Phi(\vec{x}), \Phi(\vec{y}) \rangle\rangle = \langle\langle \langle \vec{x}, - \rangle, \langle \vec{y}, - \rangle \rangle\rangle = \sum_{i=1}^n \langle \vec{x}, \vec{e}_i \rangle \langle \vec{y}, \vec{e}_i \rangle$$

Γνωρίζουμε όμως ότι αν $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_n\vec{e}_n$ είναι η μοναδική γραφή του \vec{x} ως γραμμικός συνδυασμός των διανυσμάτων της ορθοκανονική βάσης \mathcal{B} , τότε $x_i = \langle \vec{x}, \vec{e}_i \rangle$, $1 \leq i \leq n$, και τότε:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \langle \vec{x}, \vec{e}_i \rangle \vec{e}_i, \sum_{i=1}^n \langle \vec{y}, \vec{e}_i \rangle \vec{e}_i \right\rangle = \sum_{i=1}^n \langle \vec{x}, \vec{e}_i \rangle \langle \vec{y}, \vec{e}_i \rangle$$

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι

$$\langle\langle \Phi(\vec{x}), \Phi(\vec{y}) \rangle\rangle = \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

και επομένως ο ισομορφισμός Φ είναι μια ισομετρία. ■

Άσκηση 15. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης και $f: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$ ένας αντισυμμετρικός ενδομορφισμός ενδομορφισμός του \mathcal{E} , δηλαδή: $f^* = -f$.

(1) Να δειχθεί ότι ο ενδομορφισμός

$$\text{Id}_{\mathcal{E}} + f: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}, \quad (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)(\vec{x}) = \vec{x} + f(\vec{x})$$

είναι ισομορφισμός.

(2) Να δειχθεί ότι ο ενδομορφισμός

$$(\text{Id}_{\mathcal{E}} - f) \circ (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)^{-1}: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

είναι ισομετρία.

Λύση. Επειδή $f^* = -f$ από την Άσκηση 2 γνωρίζουμε ότι $\langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle = 0, \forall \vec{x} \in \mathcal{E}$, και η μοναδική πραγματική ιδιοτιμή του f είναι η $\lambda = 0$.

- (1) Υποθέτουμε αντίθετα ότι ο ενδομορφισμός $\text{Id}_{\mathcal{E}} + f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ δεν είναι ισομορφισμός. Τότε ο πυρήνας της $\text{Id}_{\mathcal{E}} + f$ δεν είναι ο τετριμένος, δηλαδή $\text{Ker}(\text{Id}_{\mathcal{E}} + f) \neq \{\vec{0}\}$ και άρα υπάρχει ένα μη-μηδενικό διάνυσμα $\vec{u} \in \mathcal{E}$ έτσι ώστε

$$(\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)(\vec{u}) = 0 \implies \vec{u} + f(\vec{u}) = 0 \implies f(\vec{u}) = -\vec{u}$$

Συνεπώς: $\lambda = -1$ αποτελεί ιδιοτιμή της f . Αυτό όμως είναι άτοπο διότι η μοναδική πραγματική ιδιοτιμή του f είναι η $\lambda = 0$. Επομένως ο ενδομορφισμός $\text{Id}_{\mathcal{E}} + f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι ισομορφισμός.

- (2) Επειδή από το μέρος (1), ο ενδομορφισμός $\text{Id}_{\mathcal{E}} + f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι ισομορφισμός, έπεται ότι ορίζεται ο ενδομορφισμός $(\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)^{-1} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$.

Έστω $\vec{x} \in \mathcal{E}$. Θα δείξουμε ότι

$$\|\vec{x}\|^2 = \|((\text{Id}_{\mathcal{E}} - f) \circ (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)^{-1})(\vec{x})\|^2$$

Επειδή ο ενδομορφισμός $\text{Id}_{\mathcal{E}} + f : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι ισομορφισμός έχουμε: $\vec{x} = (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)(\vec{y})$ για κάποιο $\vec{y} \in \mathcal{E}$. Επομένως από τη παραπάνω σχέση αρκεί να δείξουμε ότι

$$\|(\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)(\vec{y})\|^2 = \|((\text{Id}_{\mathcal{E}} - f) \circ (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)^{-1} \circ (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f))(\vec{y})\|^2 = \|(\text{Id}_{\mathcal{E}} - f)(\vec{y})\|^2$$

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \|(\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)(\vec{y})\|^2 &= \langle (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)(\vec{y}), (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)(\vec{y}) \rangle \\ &= \langle \vec{y} + f(\vec{y}), \vec{y} + f(\vec{y}) \rangle \\ &= \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{y}), f(\vec{y}) \rangle + 2\langle \vec{y}, f(\vec{y}) \rangle \\ &= \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{y}), f(\vec{y}) \rangle \end{aligned}$$

διότι $\langle \vec{y}, f(\vec{y}) \rangle = 0$, για κάθε $\vec{y} \in \mathcal{E}$, από την Άσκηση 2. Παρόμοια υπολογίζουμε:

$$\begin{aligned} \|(\text{Id}_{\mathcal{E}} - f)(\vec{y})\|^2 &= \langle (\text{Id}_{\mathcal{E}} - f)(\vec{y}), (\text{Id}_{\mathcal{E}} - f)(\vec{y}) \rangle \\ &= \langle \vec{y} - f(\vec{y}), \vec{y} - f(\vec{y}) \rangle \\ &= \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{y}), f(\vec{y}) \rangle - 2\langle \vec{y}, f(\vec{y}) \rangle \\ &= \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{y}), f(\vec{y}) \rangle \end{aligned}$$

Συνεπώς καταλήγουμε ότι:

$$\|(\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)(\vec{y})\|^2 = \|(\text{Id}_{\mathcal{E}} - f)(\vec{y})\|^2$$

και άρα ο ενδομορφισμός $(\text{Id}_{\mathcal{E}} - f) \circ (\text{Id}_{\mathcal{E}} + f)^{-1} : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι ισομετρία. ■

Άσκηση 16. Έστω A ένας αντισυμμετρικός $n \times n$ πίνακας πραγματικών αριθμών.

- (1) Ναδειχθεί ότι ο πίνακας $I_n + A$ είναι αντιστρέψιμος.
 (2) Ναδειχθεί ότι ο πίνακας $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ είναι ορθογώνιος.

Λύση. Θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f_A: \mathbb{R}_n \rightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X$$

του οποίου ο πίνακας στην κανονική βάση \mathcal{B} του \mathbb{R}_n , η οποία είναι ορθοκανονική, είναι ο A . Επειδή ο πίνακας A είναι αντισυμμετρικός, από την Άσκηση 3, έπεται ότι ο ενδομορφισμός f_A είναι αντισυμμετρικός: $f_A = -f_A$.

Από την Άσκηση 15 έπεται ότι ο ενδομορφισμός $\text{Id}_{\mathbb{R}_n} + f_A$ είναι ισομορφισμός και ο ενδομορφισμός $(\text{Id}_{\mathbb{R}_n} - f_A) \circ (\text{Id}_{\mathbb{R}_n} + f_A)^{-1}$ είναι ισομετρία. Τότε όμως θα έχουμε ότι ο πίνακας $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_{\mathbb{R}_n} + f_A)$ είναι αντιστρέψιμος και ο πίνακας $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}((\text{Id}_{\mathbb{R}_n} - f_A) \circ (\text{Id}_{\mathbb{R}_n} + f_A)^{-1})$ είναι ορθογώνιος. Επειδή

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_{\mathbb{R}_n} + f_A) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_{\mathbb{R}_n}) + M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A) = I_n + A$$

και

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}((\text{Id}_{\mathbb{R}_n} - f_A) \circ (\text{Id}_{\mathbb{R}_n} + f_A)^{-1}) &= M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_{\mathbb{R}_n} - f_A) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}((\text{Id}_{\mathbb{R}_n} + f_A)^{-1}) = \\ &= (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(\text{Id}_{\mathbb{R}_n}) - M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A)) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}((\text{Id}_{\mathbb{R}_n} + f_A))^{-1} = (I_n - A) \cdot (I_n + A)^{-1} \end{aligned}$$

έπεται ότι ο πίνακας $I_n + A$ είναι αντιστρέψιμος και ο πίνακας $(I_n - A)(I_n + A)^{-1}$ είναι ορθογώνιος. ■

Άσκηση 17 (Μηδενοδύναμος + Συμμετρικός = Μηδενικός). (1) Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης και $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ένας αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός. Ναδειχθεί ότι αν $f^m = 0$, τότε $f = 0$.

(2) Αν $A \in M_n(\mathbb{R})$ είναι ένας συμμετρικός πίνακας και $A^m = O$, ναδειχθεί ότι $A = O$.

Λύση. (1) Έστω $A = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ ο πίνακας του f σε μια ορθοκανονική βάση \mathcal{B} του \mathcal{E} . Τότε ο πίνακας A είναι συμμετρικός και από το Φασματικό Θεώρημα γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας ορθογώνιος πίνακας P έτσι ώστε

$${}^t P \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

όπου $\lambda_i \in \mathbb{R}$ είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα A , ισοδύναμα του f . Τότε

$$({}^t P \cdot A \cdot P)^m = {}^t P \cdot A^m \cdot P = \begin{pmatrix} \lambda_1^m & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n^m \end{pmatrix}$$

όπου λ_i^m είναι οι ιδιοτιμές του πίνακα A^m . Επειδή $f^m = 0$ έπεται προφανώς ότι $A^m = 0$ και άρα $\lambda_i^m = 0$ για κάθε $1 \leq i \leq n$. Τότε $\lambda_i = 0$ και άρα $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = A = 0$. Επομένως έχουμε: $f = 0$.

Δεύτερος Τρόπος: Από το Φασματικό Θεώρημα υπάρχει ορθοκανονική βάση $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ του \mathcal{E} η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του f :

$$f(\vec{e}_i) = \lambda_i \cdot \vec{e}_i, \quad 1 \leq i \leq n$$

Τότε προφανώς, $\forall k \geq 1$: $f^k(\vec{e}_i) = \lambda_i^k \cdot \vec{e}_i$. Επομένως $\vec{0} = f^m(\vec{e}_i) = \lambda_i^m \cdot \vec{e}_i$, $1 \leq i \leq n$, και άρα $\lambda_i^m = 0$ ή ισοδύναμα $\lambda_i = 0$, $1 \leq i \leq n$, διότι $\vec{e}_i \neq \vec{0}$. Επομένως, $1 \leq i \leq n$: $f(\vec{e}_i) = \vec{0}$. Τότε προφανώς $f = 0$ διότι η f μηδενίζει κάθε διάνυσμα της βάσης \mathcal{B} .

(2) Θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f_A: \mathbb{R}_n \rightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X$$

ο οποίος είναι αυτοπροσαρτημένος διότι ο πίνακας A του f_A στην κανονική βάση του \mathbb{R}_n , η οποία είναι ορθοκανονική, είναι συμμετρικός. Επειδή $A^m = O$, θα έχουμε $f_A^m = f_{A^m} = 0$, και τότε από το μέρος (1) τότε προκύπτει ότι $f_A = 0$ και αυτό σημαίνει ότι $A = O$. ■

Άσκηση 18. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Να δειχθούν τα εξής:

$$(1) \quad \text{Ker}(f^*) = \text{Im}(f)^\perp$$

$$(2) \quad \text{Ker}(f) = \text{Im}(f^*)^\perp$$

$$(3) \quad \text{Im}(f^*) = \text{Ker}(f)^\perp$$

$$(4) \quad \text{Im}(f) = \text{Ker}(f^*)^\perp$$

(5) Αν \mathcal{V} είναι ένας υπόχωρος του \mathcal{E} , τότε:

$$f(\mathcal{V}) \subseteq \mathcal{V} \iff f^*(\mathcal{V}^\perp) \subseteq \mathcal{V}^\perp$$

Λύση. (1) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{Im}(f)^\perp &= \{ \vec{x} \in \mathcal{E} \mid \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle = 0 \text{ για κάθε } \vec{y} \in \text{Im}(f) \} \\ &= \{ \vec{x} \in \mathcal{E} \mid \langle f(\vec{z}), \vec{x} \rangle = 0 \text{ για κάθε } \vec{z} \in \mathcal{E} \} \\ &= \{ \vec{x} \in \mathcal{E} \mid \langle \vec{z}, f^*(\vec{x}) \rangle = 0 \text{ για κάθε } \vec{z} \in \mathcal{E} \} \\ &= \{ \vec{x} \in \mathcal{E} \mid f^*(\vec{x}) = \vec{0} \} \\ &= \text{Ker}(f^*) \end{aligned}$$

(2) Έχουμε:

$$\begin{aligned} \text{Im}(f^*)^\perp &= \{ \vec{x} \in \mathcal{E} \mid \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = 0 \text{ για κάθε } \vec{y} \in \text{Im}(f^*) \} \\ &= \{ \vec{x} \in \mathcal{E} \mid \langle \vec{x}, f^*(\vec{z}) \rangle = 0 \text{ για κάθε } \vec{z} \in \mathcal{E} \} \\ &= \{ \vec{x} \in \mathcal{E} \mid \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle = 0 \text{ για κάθε } \vec{z} \in \mathcal{E} \} \\ &= \{ \vec{x} \in \mathcal{E} \mid f(\vec{x}) = \vec{0} \} \\ &= \text{Ker}(f) \end{aligned}$$

(3) Από το μέρος (2) έπεται ότι:

$$\text{Im}(f^*) = (\text{Im}(f^*)^\perp)^\perp = \text{Ker}(f)^\perp$$

(4) Χρησιμοποιώντας το μέρος (1) έχουμε:

$$\text{Im}(f) = (\text{Im}(f)^\perp)^\perp = \text{Ker}(f^*)^\perp$$

(5) Υποθέτουμε ότι $f(\mathcal{V}) \subseteq \mathcal{V}$ και έστω $\vec{x} \in \mathcal{V}^\perp$. Θα δείξουμε ότι $f^*(\vec{x}) \in \mathcal{V}^\perp$. Έστω $\vec{v} \in \mathcal{V}$. Τότε

$$\langle \vec{v}, f^*(\vec{x}) \rangle = \langle f(\vec{v}), \vec{x} \rangle = 0$$

διότι $\vec{x} \in \mathcal{V}^\perp$ και $f(\vec{v}) \in \mathcal{V}$. Συνεπώς:

$$f^*(\mathcal{V}^\perp) \subseteq \mathcal{V}^\perp$$

Υποθέτουμε αντίστροφα ότι $f^*(\mathcal{V}^\perp) \subseteq \mathcal{V}^\perp$, δηλαδή $\langle \vec{v}, f^*(\vec{x}) \rangle = 0$ για κάθε $\vec{v} \in \mathcal{V}$ και $\vec{x} \in \mathcal{V}^\perp$. Τότε:

$$\langle \vec{v}, f^*(\vec{x}) \rangle = 0, \forall \vec{x} \in \mathcal{V}^\perp \implies \langle f(\vec{v}), \vec{x} \rangle = 0, \forall \vec{x} \in \mathcal{V}^\perp \implies f(\vec{v}) \in (\mathcal{V}^\perp)^\perp = \mathcal{V}$$

και άρα

$$f(\mathcal{V}) \subseteq \mathcal{V} \quad \blacksquare$$

Άσκηση 19. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Να δειχθούν τα εξής:

(1)

$$\mathbf{r}(f) = \mathbf{r}(f^*)$$

(2)

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^* \circ f) \quad \text{και} \quad \text{Ker}(f^*) = \text{Ker}(f \circ f^*)$$

(3)

$$\mathbf{r}(f^* \circ f) = \mathbf{r}(f) = \mathbf{r}(f^*) = \mathbf{r}(f \circ f^*)$$

Λύση. (1) Έχουμε: $\mathbf{r}(f) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f)$ και $\mathbf{r}(f^*) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f^*)$. Από την Άσκηση 18 έχουμε ότι: $\text{Im}(f^*) = \text{Ker}(f)^\perp$, και τότε:

$$\mathbf{r}(f^*) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f^*) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(f)^\perp = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} - \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(f) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f) = \mathbf{r}(f)$$

(2) Έστω $\vec{x} \in \text{Ker}(f)$, δηλαδή $f(\vec{x}) = \vec{0}$. Τότε $f^*(f(\vec{x})) = (f^* \circ f)(\vec{0}) = \vec{0}$ και επομένως $\vec{x} \in \text{Ker}(f^* \circ f)$. Άρα $\text{Ker}(f) \subseteq \text{Ker}(f^* \circ f)$. Αντίστροφα, έστω $\vec{x} \in \text{Ker}(f^* \circ f)$, δηλαδή $(f^* \circ f)(\vec{0}) = \vec{0}$. Τότε:

$$0 = \langle \vec{x}, (f^* \circ f)(\vec{0}) \rangle = \langle \vec{x}, f^*(f(\vec{0})) \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle = \|f(\vec{x})\|^2 \implies f(\vec{x}) = \vec{0}$$

δηλαδή $\vec{x} \in \text{Ker}(f)$ και επομένως $\text{Ker}(f^* \circ f) \subseteq \text{Ker}(f)$. Αππο τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι:

$$\text{Ker}(f) = \text{Ker}(f^* \circ f)$$

Απο την τελευταία σχέση, χρησιμοποιώντας ότι $f^{**} = f$, θα έχουμε:

$$\text{Ker}(f^*) = \text{Ker}(f^{**} \circ f^*) = \text{Ker}(f \circ f^*)$$

(3) Χρησιμοποιώντας το μέρος (2), Θα έχουμε:

$$\mathbf{r}(f^* \circ f) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f^* \circ f) = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} - \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(f^* \circ f) = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} - \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(f) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f) = \mathbf{r}(f)$$

$$\mathbf{r}(f \circ f^*) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f \circ f^*) = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} - \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(f \circ f^*) = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} - \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(f^*) = \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f^*) = \mathbf{r}(f^*)$$

και ο ισχυρισμός του μέρους (3) προκύπτει από το μέρος (1). ■

Άσκηση 20. Έστω $A \in M_n(\mathbb{R})$. Να δειχθεί ότι:

$$\mathbf{r}(A \cdot {}^t A) = \mathbf{r}({}^t A \cdot A) = \mathbf{r}(A) = \mathbf{r}({}^t A)$$

Λύση. Θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f_A : \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X$$

Γνωρίζουμε τότε ότι $f_A^* = f_{{}^t A}$, και

$$\mathbf{r}(f_A) = \mathbf{r}(A) \quad \text{και} \quad \mathbf{r}(f_A^*) = \mathbf{r}(f_{{}^t A}) = \mathbf{r}({}^t A)$$

Άρα από την Άσκηση 19, έπεται ότι $\mathbf{r}(A) = \mathbf{r}({}^t A)$. Έστω \mathcal{B} η κανονική βάση του \mathbb{R}_n . Τότε:

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A^* \circ f_A) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A^*) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A) = {}^t A \cdot A \quad \text{και} \quad M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A \circ f_A^*) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A) \cdot M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A^*) = A \cdot {}^t A$$

Επειδή $\mathbf{r}(f_A) = \mathbf{r}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A))$ και $\mathbf{r}(f_A^*) = \mathbf{r}(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_A^*))$, από τις παραπάνω σχέσεις, και την Άσκηση 19, θα έχουμε:

$$\mathbf{r}(A \cdot {}^t A) = \mathbf{r}(A) = \mathbf{r}({}^t A) = \mathbf{r}({}^t A \cdot A) \quad \blacksquare$$

Άσκηση 21. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$ ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Να δειχθεί ότι για κάθε $k, m \in \mathbb{N}$:

$$(f^* \circ f)^k = 0 \iff f = 0 \iff (f \circ f^*)^m = 0$$

Λύση. Προφανώς αν $f = 0$, τότε $f^* \circ f = 0 = f \circ f^*$ και επομένως, $\forall k, m \in \mathbb{N}: (f^* \circ f)^k = 0 = (f \circ f^*)^m$.

Έστω $(f^* \circ f)^k = 0$, για κάποιο $k \geq 1$. Ο ενδομορφισμός $f^* \circ f$ είναι αυτοπροσαρτημένος, διότι: $(f^* \circ f)^* = f^* \circ (f^*)^* = f^* \circ f$. Επομένως από την Άσκηση 17, έπεται ότι

$$f^* \circ f = 0$$

Τότε για κάθε διάνυσμα $\vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$0 = \langle \vec{x}, (f^* \circ f)(\vec{x}) \rangle = \langle \vec{x}, f^*(f(\vec{x})) \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle = \|f(\vec{x})\|^2 \implies f(\vec{x}) = \vec{0}$$

Επομένως $f = 0$.

Παρόμοια, έστω $(f \circ f^*)^m = 0$, για κάποιο $m \geq 1$. Ο ενδομορφισμός $f \circ f^*$ είναι αυτοπροσαρτημένος, διότι: $(f \circ f^*)^* = (f^*)^* \circ f^* = f \circ f^*$. Επομένως από την Άσκηση 17, έπεται ότι

$$f \circ f^* = 0$$

Τότε για κάθε διάνυσμα $\vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$0 = \langle (f \circ f^*)(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle f(f^*(\vec{x})), \vec{x} \rangle = \langle f^*(\vec{x}), f^*(\vec{x}) \rangle = \|f^*(\vec{x})\|^2 \implies f^*(\vec{x}) = \vec{0}$$

Επομένως $f^* = 0$. Τότε όμως $f = (f^*)^* = 0$. ■

Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης. Ένας ενδομορφισμός $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ καλείται **κανονικός**, αν:

$$f \circ f^* = f^* \circ f$$

Για παράδειγμα κάθε αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός του \mathcal{E} είναι προφανώς κανονικός.

Άσκηση 22. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ένας κανονικός ενδομορφισμός του \mathcal{E} .

(1) Να δειχθεί ότι: $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$\|f^*(\vec{x})\| = \|f(\vec{x})\|$$

(2) Να δειχθεί ότι αν $P(t) \in \mathbb{R}[t]$ είναι ένα πολυώνυμο, τότε ο πολυωνυμικός ενδομορφισμός $P(f)$ είναι κανονικός.

(3) Να δειχθεί ότι:

$$\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{\vec{0}\}$$

(4) Αν ο f είναι μηδενοδύναμος, δηλαδή $f^m = 0$, για κάποιο $m \in \mathbb{N}$, τότε: $f = 0$.

Λύση. (1) Χρησιμοποιώντας ότι $(f^*)^* = f$, για κάθε $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \|f^*(\vec{x})\|^2 &= \langle f^*(\vec{x}), f^*(\vec{x}) \rangle = \langle \vec{x}, (f^*)^*(f^*(\vec{x})) \rangle = \langle \vec{x}, f(f^*(\vec{x})) \rangle = \langle \vec{x}, (f \circ f^*)(\vec{x}) \rangle = \langle \vec{x}, (f^* \circ f)(\vec{x}) \rangle = \\ &= \langle \vec{x}, f^*(f(\vec{x})) \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle = \|f(\vec{x})\|^2 \implies \|f^*(\vec{x})\| = \|f(\vec{x})\| \end{aligned}$$

(2) Έστω $P(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_k t^k \in \mathbb{R}[t]$ ένα πολυώνυμο, και θεωρούμε τον πολυωνυμικό ενδομορφισμό

$$P(f) = a_0 \text{Id}_{\mathcal{E}} + a_1 f + a_2 f^2 + \dots + a_k f^k : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}, \quad P(f)(\vec{x}) = a_0 \vec{x} + a_1 f(\vec{x}) + a_2 f^2(\vec{x}) + \dots + a_k f^k(\vec{x})$$

Χρησιμοποιώντας την Άσκηση 8, προκύπτει άμεσα ότι:

$$P(f)^* = P(f^*)$$

και τότε θα έχουμε:

$$P(f) \circ P(f)^* = P(f) \circ P(f^*) = P(f \circ f^*) = P(f^* \circ f) = P(f^*) \circ P(f) = P(f)^* \circ P(f)$$

Επομένως ο πολυωνυμικός ενδομορφισμός $P(f)$ είναι κανονικός.

(3) Έστω $\vec{x} \in \text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f)$. Τότε $f(\vec{x}) = \vec{0}$ και υπάρχει $\vec{y} \in \mathcal{E}$ έτσι ώστε: $f(\vec{y}) = \vec{x}$. Τότε από το μέρος (1), θα έχουμε:

$$0 = \|f(\vec{x})\| = \|f^*(\vec{x})\| \implies f^*(\vec{y}) = \vec{0} \implies 0 = \langle \vec{x}, f^*(\vec{y}) \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle = \|\vec{y}\|^2 \implies \vec{y} = \vec{0}$$

Τότε θα έχουμε $\vec{x} = f(\vec{y}) = f(\vec{0}) = \vec{0}$, και επομένως $\text{Ker}(f) \cap \text{Im}(f) = \{\vec{0}\}$.

(4) Έστω ότι $f^m = 0$.

Τότε, χρησιμοποιώντας ότι $f \circ f^* = f^* \circ f$, θα έχουμε

$$(f \circ f^*)^2 = f \circ f^* \circ f \circ f^* = f \circ f \circ f^* \circ f^* = f^2 \circ (f^*)^2$$

και επαγωγικά, εύκολα προκύπτει ότι:

$$(f \circ f^*)^k = f^k \circ (f^*)^k$$

Επομένως για $k = m$, έχουμε:

$$(f \circ f^*)^m = f^m \circ (f^*)^m = 0$$

Άρα ο ενδομορφισμός $f \circ f^*$ είναι μηδενοδύναμος. Παρόμοια εργαζόμενοι βλέπουμε ότι ο ενδομορφισμός $f^* \circ f$ είναι μηδενοδύναμος. Τότε από την Άσκηση 21 έπεται ότι $f = 0$. ■

Άσκηση 23. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

έναν ενδομορφισμό του \mathcal{E} .

(1) Ναδειχθεί ότι οι ενδομορφισμοί

$$f \circ f^*, f^* \circ f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

είναι αυτοπροσαρτημένοι.

(2) Ναδειχθεί ότι οι ενδομορφισμοί $f \circ f^*$ και $f^* \circ f$ είναι μη-αρνητικοί.

(3) Ναδειχθεί ότι ο ενδομορφισμός $f \circ f^*$ είναι θετικός αν και μόνον αν ο ενδομορφισμός f είναι ισομορφισμός.

(4) Ναδειχθεί ότι ο ενδομορφισμός $f^* \circ f$ είναι θετικός αν και μόνον αν ο ενδομορφισμός f είναι ισομορφισμός.

Λύση. (1) Χρησιμοποιώντας τις Άσκησεις 8 και 9, Θα έχουμε:

$$(f \circ f^*)^* = (f^*)^* \circ f^* = f \circ f^* \quad \text{και} \quad (f^* \circ f)^* = (f^* \circ (f^*)^*) = f^* \circ f$$

Άρα οι ενδομορφισμοί $f \circ f^*$ και $f^* \circ f$ είναι αυτοπροσαρτημένοι.

(2) Για κάθε $\vec{x} \in \mathcal{E}$, θα έχουμε:

$$\langle (f \circ f^*)(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle f(f^*(\vec{x})), \vec{x} \rangle = \langle f^*(\vec{x}), f^*(\vec{x}) \rangle = \|f^*(\vec{x})\|^2 \geq 0$$

και επομένως ο ενδομορφισμός $f \circ f^*$ είναι μη-αρνητικός.

(3) Παρόμοια, για κάθε $\vec{x} \in \mathcal{E}$, θα έχουμε:

$$\langle (f^* \circ f)(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle \vec{x}, (f^* \circ f)(\vec{x}) \rangle = \langle \vec{x}, (f^*(f(\vec{x}))) \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle = \|f(\vec{x})\|^2 \geq 0$$

και επομένως ο ενδομορφισμός $f^* \circ f$ είναι μη-αρνητικός.

(4) Έστω ότι ο ενδομορφισμός $f \circ f^*$ είναι θετικός, δηλαδή $\langle (f \circ f^*)(\vec{x}), \vec{x} \rangle > 0$, για κάθε $\vec{x} \in \mathcal{E}$ με $\vec{x} \neq \vec{0}$.

Έστω $\vec{x} \in \mathcal{E}$ έτσι ώστε $f^*(\vec{x}) = \vec{0}$. Τότε:

$$0 = \langle f^*(\vec{x}), f^*(\vec{x}) \rangle = \langle f(f^*(\vec{x})), \vec{x} \rangle = \langle (f \circ f^*)(\vec{x}), \vec{x} \rangle$$

και επομένως θα έχουμε αναγκαστικά $\vec{x} = \vec{0}$. Άρα $\text{Ker}(f^*) = \{\vec{0}\}$, δηλαδή ο f^* είναι μονομορφισμός και επομένως ισομορφισμός διότι ο \mathcal{E} έχει πεπερασμένη διάσταση. Από την Άσκηση 9 τότε και ο f είναι ισομορφισμός.

Αντίστροφα, αν ο f είναι ισομορφισμός, τότε από την Άσκηση 9 και ο f^* είναι ισομορφισμός. Αν $\vec{x} \in \mathcal{E}$ με $\vec{x} \neq \vec{0}$, τότε:

$$\langle (f \circ f^*)(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \|f^*(\vec{x})\|^2 > 0$$

διότι αν $\|f^*(\vec{x})\|^2 = 0$, τότε $\|f^*(\vec{x})\| = 0$, δηλαδή $f^*(\vec{x}) = \vec{0}$, και αυτό είναι άτοπο διότι ο f^* είναι ισομορφισμός και $\vec{x} \neq \vec{0}$. Άρα ο ενδομορφισμός $f \circ f^*$ είναι θετικός.

- (5) Έστω ότι ο ενδομορφισμός $f^* \circ f$ είναι θετικός, δηλαδή $\langle (f^* \circ f)(\vec{x}), \vec{x} \rangle > 0$, για κάθε $\vec{x} \in \mathcal{E}$ με $\vec{x} \neq \vec{0}$. Έστω $\vec{x} \in \mathcal{E}$ έτσι ώστε $f(\vec{x}) = \vec{0}$. Τότε:

$$0 = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle = \langle \vec{x}, f^*(f(\vec{x})) \rangle = \langle \vec{x}, (f^* \circ f)(\vec{x}) \rangle = \langle (f^* \circ f)(\vec{x}), \vec{x} \rangle$$

και επομένως θα έχουμε αναγκαστικά $\vec{x} = \vec{0}$. Άρα $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$, δηλαδή ο f είναι μονομορφισμός και επομένως ισομορφισμός διότι ο \mathcal{E} έχει πεπερασμένη διάσταση.

Αντίστροφα, αν ο f είναι ισομορφισμός, και $\vec{x} \in \mathcal{E}$ με $\vec{x} \neq \vec{0}$, τότε:

$$\langle (f^* \circ f)(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \|f(\vec{x})\|^2 > 0$$

διότι αν $\|f(\vec{x})\|^2 = 0$, τότε $\|f(\vec{x})\| = 0$, δηλαδή $f(\vec{x}) = \vec{0}$, και αυτό είναι άτοπο διότι ο f είναι ισομορφισμός και $\vec{x} \neq \vec{0}$. ■

Άσκηση 24. Για κάθε πίνακα $A \in M_n(\mathbb{R})$ υπάρχουν ορθογώνιοι πίνακες P και Q και διαγώνιοι πίνακες Δ και Γ , έτσι ώστε:

$${}^tP \cdot A \cdot {}^tA \cdot P = \Delta \quad \text{και} \quad {}^tQ \cdot {}^tA \cdot A \cdot Q = \Gamma$$

Επιπλέον οι πίνακες $A \cdot {}^tA$ και ${}^tA \cdot A$ είναι μη-αρνητικοί, και:

$$A \cdot {}^tA > 0 \iff |A| \neq 0 \iff {}^tA \cdot A > 0$$

Λύση. Οι πίνακες $A \cdot {}^tA$ και ${}^tA \cdot A$ είναι συμμετρικοί διότι

$${}^t(A \cdot {}^tA) = {}^t({}^tA) \cdot {}^tA = A \cdot {}^tA \quad \text{και} \quad {}^t({}^tA \cdot A) = {}^tA \cdot {}^t({}^tA) = {}^tA \cdot A$$

Από το Φασματικό Θεώρημα, υπάρχουν ορθογώνιοι πίνακες P και Q και διαγώνιοι πίνακες Δ και Γ , έτσι ώστε:

$${}^tP \cdot A \cdot {}^tA \cdot P = \Delta \quad \text{και} \quad {}^tQ \cdot {}^tA \cdot A \cdot Q = \Gamma$$

Επιπλέον, $\forall X \in \mathbb{R}_n$:

$$\begin{aligned} \langle A \cdot {}^tA \cdot X, X \rangle &= \langle {}^tA \cdot X, {}^tA \cdot X \rangle = \|{}^tA \cdot X\|^2 \geq 0 \\ \langle {}^tA \cdot A \cdot X, X \rangle &= \langle X, {}^tA \cdot A \cdot X \rangle = \langle A \cdot X, A \cdot X \rangle = \|A \cdot X\|^2 \geq 0 \end{aligned}$$

Επειδή, όπως γνωρίζουμε, $f_A^* = f_{tA}$, θεωρούμε τους ενδομορφισμούς

$$f_A: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X \quad \text{και} \quad f_A^*: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A^*(X) = f_{tA}(X) = {}^tA \cdot X$$

Από την προηγούμενη Άσκηση 23, οι ενδομορφισμοί $f_A \circ f_A^*$ και $f_A^* \circ f_A$ είναι αυτοπροσαρτημένοι και μη-αρνητικοί. Επιπλέον:

$$f_A \circ f_A^* > 0 \iff f_A: \text{ισομορφισμός} \iff f_A^* \circ f_A > 0 \quad (\dagger)$$

Τότε θα έχουμε:

$$\begin{aligned} f_A \circ f_A^* > 0 &\iff \forall 0 \neq X \in \mathbb{R}_n: \langle f_A \circ f_A^*(X), X \rangle > 0 \iff \forall 0 \neq X \in \mathbb{R}_n: \langle f_A(f_A^*(X)), X \rangle > 0 \iff \\ &\iff \forall 0 \neq X \in \mathbb{R}_n: \langle f_A({}^tA \cdot X), X \rangle > 0 \iff \forall 0 \neq X \in \mathbb{R}_n: \langle A \cdot {}^tA \cdot X, X \rangle > 0 \iff A \cdot {}^tA > 0 \end{aligned}$$

και παρόμοια

$$\begin{aligned} f_A^* \circ f_A > 0 &\iff \forall 0 \neq X \in \mathbb{R}_n: \langle f_A^* \circ f_A(X), X \rangle > 0 \iff \forall 0 \neq X \in \mathbb{R}_n: \langle f_A^*(f_A(X)), X \rangle > 0 \iff \\ &\iff \forall 0 \neq X \in \mathbb{R}_n: \langle f_A^*(A \cdot X), X \rangle > 0 \iff \forall 0 \neq X \in \mathbb{R}_n: \langle {}^tA \cdot A \cdot X, X \rangle > 0 \iff {}^tA \cdot A > 0 \end{aligned}$$

Από τη σχέση (\dagger) προκύπτει ότι:

$$A \cdot {}^tA > 0 \iff |A| \neq 0 \iff {}^tA \cdot A > 0 \quad \blacksquare$$

Άσκηση 25. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

έναν ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Αν ο πίνακας του f σε μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} είναι αντισυμμετρικός, να δειχθεί ότι ο πίνακας του f σε κάθε ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} είναι αντισυμμετρικός.

Λύση. Έστω $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} στην οποία ο πίνακας A του f είναι αντισυμμετρικός, δηλαδή ${}^tA = -A$. Έστω $\mathcal{C} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ μια άλλη ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} και έστω B ο πίνακας του f στη βάση \mathcal{C} . Γνωρίζουμε τότε ότι οι πίνακες A και B είναι όμοιοι, και επομένως υπάρχει αντιστρέψιμος πίνακας P έτσι ώστε $P^{-1} \cdot A \cdot P = B$. Ο πίνακας P είναι τότε ορθογώνιος διότι είναι ο πίνακας μετάβασης από την ορθοκανονική βάση \mathcal{B} στην ορθοκανονική βάση \mathcal{C} . Επομένως: ${}^tP = P^{-1}$, και θα έχουμε: $B = P^{-1} \cdot A \cdot P \implies B = {}^tP \cdot A \cdot P \implies {}^tB = {}^t({}^tP \cdot A \cdot P) = {}^tP \cdot {}^tA \cdot {}^t({}^tP) = {}^tP \cdot (-A) \cdot P = -{}^tP \cdot A \cdot P = -B$. Επομένως ${}^tB = -B$, δηλαδή ο πίνακας B είναι αντισυμμετρικός. ■

Άσκηση 26. Έστω $A \in M_n(\mathbb{R})$ ένας αντισυμμετρικός πίνακας. Ναδειχθεί ότι υπάρχει ορθογώνιος πίνακας P και πίνακας B με την ιδιότητα ο πίνακας B^2 να είναι διαγώνιος, έτσι ώστε:

$${}^tP \cdot B \cdot P = A$$

Λύση. Έστω $A \in M_n(\mathbb{R})$ ένας αντισυμμετρικός πίνακας, δηλαδή ${}^tA = -A$. Τότε ο πίνακας A^2 είναι συμμετρικός διότι

$${}^t(A^2) = {}^t(A \cdot A) = {}^tA \cdot {}^tA = (-A) \cdot (-A) = A^2$$

Συνεπώς από το Φασματικό Θεώρημα υπάρχει ορθογώνιος πίνακας Q έτσι ώστε

$${}^tQ \cdot A^2 \cdot Q = \Delta \implies A^2 = Q \cdot \Delta \cdot {}^tQ$$

όπου Δ είναι ένας διαγώνιος πίνακας.

Θέτοντας $P = Q^{-1} = {}^tQ$, θα έχουμε $P^{-1} = {}^tP$ και

$$P \cdot A^2 \cdot {}^tP = \Delta$$

Επομένως θέτοντας

$$B = P \cdot A \cdot {}^tP$$

θα έχουμε:

$${}^tP \cdot B \cdot P = {}^tP \cdot (P \cdot A \cdot {}^tP) \cdot P = ({}^tP \cdot P) \cdot A \cdot ({}^tP \cdot P) = A$$

και

$$B^2 = (P \cdot A \cdot {}^tP) \cdot (P \cdot A \cdot {}^tP) = P \cdot A^2 \cdot {}^tP = \Delta$$

Άσκηση 27. (1) Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f, g: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

δύο αυτοπροσαρτημένοι ενδομορφισμοί του \mathcal{E} . Ναδειχθεί ότι:

$$f \circ g: \text{αυτοπροσαρτημένος} \iff f \circ g = g \circ f$$

(2) Έστω A και B δύο συμμετρικοί $n \times n$ πίνακες πραγματικών αριθμών. Ναδειχθεί ότι:

$$A \cdot B: \text{συμμετρικός} \iff A \cdot B = B \cdot A$$

Λύση. (1) Αν $f \circ g = g \circ f$, τότε θα έχουμε:

$$(f \circ g)^* = g^* \circ f^* = g \circ f = f \circ g \implies f \circ g: \text{αυτοπροσαρτημένος}$$

Αντίστροφα, έστω ότι ο ενδομορφισμός $f \circ g$ είναι αυτοπροσαρτημένος. Τότε: $(f \circ g)^* = f \circ g$. Επειδή $(f \circ g)^* = g^* \circ f^* = g \circ f$, θα έχουμε: $f \circ g = f \circ f$.

(2) Θεωρούμε τους ενδομορφισμούς

$$f_A: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X \quad \text{και} \quad f_B: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_B(X) = B \cdot X$$

Προφανώς, $\forall X \in \mathbb{R}_n$:

$$f_A(f_B(X)) = f_A(B \cdot X) = A \cdot (B \cdot X) = (A \cdot B) \cdot X = f_{A \cdot B}(X) \implies f_A \circ f_B = f_{A \cdot B}$$

και παρόμοια: $f_B \circ f_A = f_{B \cdot A}$. Άρα $A \cdot B = B \cdot A$ αν και μόνον αν $f_A \circ f_B = f_B \circ f_A$.

Υποθέτουμε τώρα ότι οι πίνακες A και B είναι συμμετρικοί. Τότε οι ενδομορφισμοί f_A και f_B είναι αυτοπροσαρτημένοι, και άρα από το μέρος (1) έπεται ότι: ο ενδομορφισμός $f_A \circ f_B$ είναι αυτοπροσαρτημένος αν και μόνον αν $f_A \circ f_B = f_B \circ f_A$, δηλαδή αν και μόνον αν $A \cdot B = B \cdot A$. Όμως ο ενδομορφισμός $f_A \circ f_B$ είναι αυτοπροσαρτημένος αν και μόνον αν ο πίνακας του σε μια ορθοκανονική βάση του $\mathbb{R}_n E$ είναι συμμετρικός. Επειδή $M_B^B(f_A \circ f_B) = M_B^B(f_A) \cdot M_B^B(f_B) = A \cdot B$, όπου B είναι η συνήθης (ορθοκανονική βάση του \mathbb{R}_n , έπεται ότι ο ενδομορφισμός $f_A \circ f_B$ είναι αυτοπροσαρτημένος αν και μόνον αν ο πίνακας $A \cdot B$ είναι συμμετρικός αν και μόνον αν $A \cdot B = B \cdot A$. ■

Άσκηση 28. Έστω \mathcal{E} ένας \mathbb{R} -διανυσματικός χώρος πεπερασμένης διάστασης, και $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Ναδειχθεί ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

- (1) Ο ενδομορφισμός f είναι διαγωνοποιήσιμος.
- (2) Υπάρχει ένα εσωτερικό γινόμενο $\langle \cdot, \cdot \rangle$ επί του \mathcal{E} έτσι ώστε ο f είναι ένας αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός του Ευκλείδειου χώρου $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Λύση. « \Leftarrow » Αν ο f είναι ένας αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός του Ευκλείδειου χώρου $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, τότε από το Φασματικό Θεώρημα έπεται ότι ο f είναι διαγωνοποιήσιμος.

« \Rightarrow » Έστω ότι ο ενδομορφισμός f είναι διαγωνοποιήσιμος. Τότε υπάρχει μια ορθοκανονική βάση $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ του \mathcal{E} η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του f :

$$f(\vec{e}_i) = \lambda_i \vec{e}_i, \quad 1 \leq i \leq n$$

Ορίζουμε απεικόνιση

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{αν } i = j \\ 0, & \text{αν } i \neq j \end{cases}$$

και αν $\vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n$ και $\vec{y} = y_1 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + \dots + y_n \vec{e}_n$, τότε:

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

Εύκολα βλέπουμε ότι η παραπάνω απεικόνιση είναι ένα εσωτερικό γινόμενο επί του \mathcal{E} και τότε:

$$\begin{aligned} \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle &= \langle f(x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n), y_1 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + \dots + y_n \vec{e}_n \rangle = \\ &= \langle x_1 f(\vec{e}_1) + x_2 f(\vec{e}_2) + \dots + x_n f(\vec{e}_n), y_1 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + \dots + y_n \vec{e}_n \rangle = \\ &= \langle x_1 \lambda_1 \vec{e}_1 + x_2 \lambda_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \lambda_n \vec{e}_n, y_1 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + \dots + y_n \vec{e}_n \rangle = \\ &= x_1 \lambda_1 y_1 + x_2 \lambda_2 y_2 + \dots + x_n \lambda_n y_n \end{aligned}$$

Παρόμοια θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \langle \vec{x}, f(\vec{y}) \rangle &= \langle x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n, f(y_1 \vec{e}_1 + y_2 \vec{e}_2 + \dots + y_n \vec{e}_n) \rangle = \\ &= \langle x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n, y_1 f(\vec{e}_1) + y_2 f(\vec{e}_2) + \dots + y_n f(\vec{e}_n) \rangle = \\ &= \langle x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + \dots + x_n \vec{e}_n, y_1 \lambda_1 \vec{e}_1 + y_2 \lambda_2 \vec{e}_2 + \dots + y_n \lambda_n \vec{e}_n \rangle = \\ &= x_1 \lambda_1 y_1 + x_2 \lambda_2 y_2 + \dots + x_n \lambda_n y_n \end{aligned}$$

Από τις παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, f(\vec{y}) \rangle$$

Λόγω μοναδικότητας του προσαρτημένου ενός ενδομορφισμού, έπεται ότι $f = f^*$ και ο f είναι αυτοπροσαρτημένος. ■

Άσκηση 29. Έστω A ένας $n \times n$ πίνακας πραγματικών αριθμών. Ναδειχθεί ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα:

- (1) Ο πίνακας A είναι διαγωνοποιήσιμος.

(2) Υπάρχει ένα εσωτερικό γινόμενο $\langle\langle, \rangle\rangle$ επί του \mathbb{R}_n έτσι ώστε, $\forall X \in \mathbb{R}_n$:

$$\langle\langle A \cdot X, Y \rangle\rangle = \langle\langle X, A \cdot Y \rangle\rangle$$

Λύση. Θεωρούμε τον ενδομορφισμό

$$f_A: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X$$

Γνωρίζουμε ότι ο ενδομορφισμός f_A είναι διαγωνοποιήσιμος αν και μόνον αν ο πίνακας A είναι διαγωνοποιήσιμος. Επομένως σύμφωνα με την Άσκηση 28, ο πίνακας A είναι διαγωνοποιήσιμος αν και μόνον αν υπάρχει ένα εσωτερικό $\langle\langle, \rangle\rangle$ γινόμενο στον \mathbb{R}_n έτσι ώστε, $\forall X \in \mathbb{R}_n$:

$$\langle\langle f_A(X), Y \rangle\rangle = \langle\langle X, f_A(Y) \rangle\rangle \iff \langle\langle A \cdot X, Y \rangle\rangle = \langle\langle X, A \cdot Y \rangle\rangle \quad \blacksquare$$

Άσκηση 30. Έστω $(\mathcal{E}, \langle, \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f, g: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

δύο ενδομορφισμοί του \mathcal{E} . Υποθέτουμε ότι ο f είναι αυτοπροσαρτημένος ισομορφισμός, ο g είναι αντισυμμετρικός, και ισχύει ότι:

$$f \circ g = g \circ f$$

(1) Να δειχθεί ότι, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x}), g(\vec{y}) \rangle = -\langle g(\vec{x}), f(\vec{y}) \rangle$$

και επομένως, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = 0$$

(2) Για κάθε $\vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$\|(f + g)(\vec{x})\| = \|(f - g)(\vec{x})\|$$

(3) Οι ενδομορφισμοί $f + g$ και $f - g$ είναι αντιστρέψιμοι.

(4) Ο ενδομορφισμός

$$(f + g) \circ (f - g)^{-1}: \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

είναι ισομετρία.

Λύση. (1) Για κάθε $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \langle f(\vec{x}), g(\vec{y}) \rangle &= \langle \vec{x}, f^*(g(\vec{y})) \rangle = \langle \vec{x}, f(g(\vec{y})) \rangle = \langle \vec{x}, (f \circ g)(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, (g \circ f)(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, g(f(\vec{y})) \rangle = \\ &= -\langle \vec{x}, -g(f(\vec{y})) \rangle = -\langle \vec{x}, (-g)(f(\vec{y})) \rangle = -\langle \vec{x}, -g^*(f(\vec{y})) \rangle = -\langle g(\vec{x}), f(\vec{y}) \rangle \end{aligned}$$

Ιδιαίτερα, για κάθε $\vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = -\langle g(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle = -\langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle \implies 2\langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = 0 \implies \langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = 0$$

(2) Για κάθε διάνυσμα $\vec{x} \in \mathcal{E}$, θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \|(f + g)(\vec{x})\|^2 &= \langle (f + g)(\vec{x}), (f + g)(\vec{x}) \rangle = \langle f(\vec{x}) + g(\vec{x}), f(\vec{x}) + g(\vec{x}) \rangle = \\ &= \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle + \langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle + \langle g(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle + \langle g(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle + 2\langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle + \langle g(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = \\ &= \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle + \langle g(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle - 2\langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle + \langle g(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = \\ &= \langle f(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle - \langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle - \langle g(\vec{x}), f(\vec{x}) \rangle + \langle g(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = \langle f(\vec{x}) - g(\vec{x}), f(\vec{x}) - g(\vec{x}) \rangle = \\ &= \langle (f - g)(\vec{x}), (f - g)(\vec{x}) \rangle = \|(f - g)(\vec{x})\|^2 \end{aligned}$$

Επομένως, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$\|(f + g)(\vec{x})\| = \|(f - g)(\vec{x})\|$$

- (3) Έστω $\vec{x} \in \text{Ker}(f + g)$. Τότε $(f + g)(\vec{x}) = \vec{0}$, δηλαδή $f(\vec{x}) + g(\vec{x}) = \vec{0}$ και άρα $f(\vec{x}) = -g(\vec{x})$. Τότε, από το μέρος (1):

$$0 = \langle f(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = \langle -g(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = -\langle g(\vec{x}), g(\vec{x}) \rangle = -\|g(\vec{x})\|^2 \implies \\ \implies g(\vec{x}) = \vec{0} \implies f(\vec{x}) = -g(\vec{x}) = \vec{0}$$

Επειδή ο f είναι ισομορφισμός, έπεται ότι $\vec{x} = \vec{0}$, δηλαδή $\text{Ker}(f + g) = \{\vec{0}\}$ και ο ενδομορφισμός $f + g$ είναι μονομορφισμός. Επειδή ο Ευκλείδειος χώρος \mathcal{E} έχει πεπερασμένη διάσταση, έπεται ότι ο ενδομορφισμός $f + g$ είναι ισομορφισμός.

Έστω $\vec{x} \in \text{Ker}(f - g)$. Τότε $(f - g)(\vec{x}) = \vec{0}$, ισοδύναμα $\|(f - g)(\vec{x})\| = 0$ και άρα από το μέρος (2) έχουμε $\|(f + g)(\vec{x})\| = 0$, ισοδύναμα: $(f + g)(\vec{x}) = \vec{0}$. Επειδή ο ενδομορφισμός $f + g$ είναι ισομορφισμός, έπεται ότι $\vec{x} = \vec{0}$ και επομένως $\text{Ker}(f - g) = \{\vec{0}\}$. Τότε ο ενδομορφισμός $f - g$ είναι μονομορφισμός, και άρα είναι ισομορφισμός διότι ο Ευκλείδειος χώρος \mathcal{E} έχει πεπερασμένη διάσταση.

- (4) Θέτουμε:

$$h = (f + g) \circ (f - g)^{-1} \quad \text{και τότε} \quad h \circ (f - g) = f + g$$

Τότε χρησιμοποιώντας το μέρος (2), θα έχουμε, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$:

$$\|h((f - g)(\vec{x}))\| = \|(h \circ (f - g))(\vec{x})\| = \|(f + g)(\vec{x})\| = \|(f - g)(\vec{x})\|$$

Επειδή ο ενδομορφισμός $f - g$ είναι ισομορφισμός, έπεται ότι $\text{Im}(f - g) = \mathcal{E}$ και άρα κάθε διάνυσμα του \mathcal{E} είναι της μορφής $(f - g)(\vec{x})$. Επομένως, για κάθε διάνυσμα $\vec{y} \in \mathcal{E}$ έχουμε $\vec{y} = (f - g)(\vec{x})$ για κάποιο διάνυσμα $\vec{x} \in \mathcal{E}$ και τότε η παραπάνω σχέση δείχνει ότι:

$$\|h(\vec{y})\| = \|h((f - g)(\vec{x}))\| = \|(f - g)(\vec{x})\| = \|\vec{y}\|$$

Η τελευταία σχέση δείχνει ότι ο ενδομορφισμός h είναι ισομετρία. ■

Η επόμενη Άσκηση αποτελεί γενίκευση της Άσκησης 16 (η τελευταία προκύπτει θέτοντας $A = I_n$ στην παρακάτω Άσκηση).

Άσκηση 31. Έστω $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ και υποθέτουμε ότι:

$${}^t A = A, \quad |A| \neq 0, \quad {}^t B = -B, \quad A \cdot B = B \cdot A$$

- (1) Να δειχθεί ότι, $\forall X, Y \in \mathbb{R}_n$:

$$\langle A \cdot X, B \cdot Y \rangle = -\langle B \cdot X, A \cdot Y \rangle$$

και επομένως, $\forall X \in \mathbb{R}_n$:

$$\langle A \cdot X, B \cdot X \rangle = 0$$

- (2) Οι πίνακες $A + B$ και $A - B$ είναι αντιστρέψιμοι.
 (3) Για κάθε $X \in \mathbb{R}_n$:

$$\|(A + B) \cdot X\| = \|(A - B) \cdot X\|$$

- (4) Ο πίνακας

$$(A + B) \cdot (A - B)^{-1}$$

είναι ορθογώνιος.

Λύση. Θεωρούμε τους ενδομορφισμούς

$$f_A: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_A(X) = A \cdot X \quad \text{και} \quad f_B: \mathbb{R}_n \longrightarrow \mathbb{R}_n, \quad f_B(X) = B \cdot X$$

Επειδή οι πίνακες A και B είναι οι πίνακες των ενδομορφισμών f_A και f_B στην κανονική βάση \mathcal{B} του \mathbb{R}_n , η οποία είναι ορθοκανονική, και επειδή ο πίνακας A είναι αντιστρέψιμος και συμμετρικός και ο πίνακας B είναι αντισυμμετρικός, έπεται ότι ο ενδομορφισμός f_A είναι αυτοπροσαρτημένος και ισομορφισμός και ο ενδομορφισμός f_B είναι αντισυμμετρικός. Από την Άσκηση 30 τότε προκύπτουν τα εξής:

(1) $\forall X, Y \in \mathbb{R}_n$:

$$\langle f_A(X), f_B(Y) \rangle = -\langle f_B(X), f_A(Y) \rangle \implies \langle A \cdot X, B \cdot Y \rangle = -\langle B \cdot X, A \cdot Y \rangle$$

και επομένως, $\forall X \in \mathbb{R}_n$:

$$\langle A \cdot X, B \cdot X \rangle = 0$$

(2) Οι ενδομορφισμοί $f_A + f_B$ και $f_A - f_B$ είναι ισομορφισμοί. Επειδή:

$$f_A + f_B = f_{A+B} \quad \text{και} \quad f_A - f_B = f_{A-B}$$

έπεται ότι οι πίνακες $A + B$ και $A - B$ είναι αντιστρέψιμοι.

(3) Για κάθε $X \in \mathbb{R}_n$:

$$\|(f_A + f_B)(X)\| = \|(f_A - f_B)(X)\| \implies \|(f_{A+B})(X)\| = \|(f_{A-B})(X)\| \implies \|(A+B) \cdot X\| = \|(A-B) \cdot X\|$$

(4) Ο ενδομορφισμός $(f_A + f_B) \circ (f_A - f_B)^{-1}$ είναι ισομετρία. Επομένως ισοδύναμα ο ενδομορφισμός $(f_{A+B}) \circ (f_{A-B})^{-1}$ είναι ισομετρία. Τότε ο πίνακας της ισομετρίας $(f_{A+B}) \circ (f_{A-B})^{-1}$ στην κανονική ορθοκανονική βάση \mathcal{B} του \mathbb{R}_n είναι ορθογώνιος. Επειδή $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_{A+B}) = A + B$ και $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_{A-B}) = A - B$, και άρα $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f_{A-B})^{-1} = (A - B)^{-1}$, προκύπτει ότι ο πίνακας

$$(A + B) \cdot (A - B)^{-1}$$

είναι ορθογώνιος. ■

Άσκηση 32. στω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f, g : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

δύο αυτοπροσαρτημένοι ενδομορφισμοί του \mathcal{E} . Να δειχθεί ότι:

$$\forall \vec{x} \in \mathcal{E} : \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle g(\vec{x}), \vec{x} \rangle \implies f = g$$

Λύση. Χρησιμοποιώντας ότι ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος, θα έχουμε $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\begin{aligned} \langle f(\vec{x} + \vec{y}), \vec{x} + \vec{y} \rangle &= \langle f(\vec{x}) + f(\vec{y}), \vec{x} + \vec{y} \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{x} \rangle = \\ &= \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle + \langle \vec{x}, f(\vec{y}) \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle + \langle \vec{x}, f^*(\vec{y}) \rangle = \\ &= \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle + \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{y} \rangle + 2\langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle \end{aligned}$$

Επομένως:

$$\langle f(\vec{x} + \vec{y}), \vec{x} + \vec{y} \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{y} \rangle + 2\langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle$$

και παρόμοια, χρησιμοποιώντας ότι ο ενδομορφισμός g είναι αυτοπροσαρτημένος, θα έχουμε, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\langle g(\vec{x} + \vec{y}), \vec{x} + \vec{y} \rangle = \langle g(\vec{x}), \vec{x} \rangle + \langle g(\vec{y}), \vec{y} \rangle + 2\langle g(\vec{x}), \vec{y} \rangle$$

Από τις παραπάνω σχέσεις και την υπόθεση προκύπτει τότε ότι, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle g(\vec{x}), \vec{y} \rangle \quad (\dagger)$$

Θεωρούμε μια ορθοκανονική βάση $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ του \mathcal{E} . Τότε, $\forall j = 1, 2, \dots, n$:

$$f(\vec{e}_j) = \sum_{k=1}^n a_{kj} \vec{e}_k \quad \text{και} \quad g(\vec{e}_j) = \sum_{k=1}^n b_{kj} \vec{e}_k \quad (\ddagger)$$

όπου $A = (a_{ij}) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ και $B = (b_{ij}) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(g)$ είναι οι πίνακες των ενδομορφισμών f και g στη βάση \mathcal{B} αντίστοιχα. Τότε θα έχουμε:

$$\begin{aligned} \langle f(\vec{e}_j), \vec{e}_i \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^n a_{kj} \vec{e}_k, \vec{e}_i \right\rangle = \sum_{k=1}^n a_{kj} \langle \vec{e}_k, \vec{e}_i \rangle = \sum_{k=1}^n a_{kj} \delta_{ki} = a_{ij} \\ \langle g(\vec{e}_j), \vec{e}_i \rangle &= \left\langle \sum_{k=1}^n b_{kj} \vec{e}_k, \vec{e}_i \right\rangle = \sum_{k=1}^n b_{kj} \langle \vec{e}_k, \vec{e}_i \rangle = \sum_{k=1}^n b_{kj} \delta_{ki} = b_{ij} \end{aligned}$$

Επομένως από τη σχέση (†), θα έχουμε, $\forall i, j = 1, 2, \dots, n$:

$$a_{ij} = \langle f(\vec{e}_j), \vec{e}_i \rangle = \langle g(\vec{e}_j), \vec{e}_i \rangle = b_{ij}$$

Τότε από τις σχέσεις (††) προκύπτει ότι, $\forall i = 1, 2, \dots, n$:

$$f(\vec{e}_i) = g(\vec{e}_i)$$

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει άμεσα ότι, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$: $f(\vec{x}) = g(\vec{x})$, και επομένως: $f = g$. ■

Υπενθυμίζουμε ότι αν $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ είναι ένας ενδομορφισμός του Ευκλείδειου χώρου $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, τότε ο f καλείται **ορθογώνια προβολή** αν υπάρχει ένας υπόχωρος \mathcal{V} του \mathcal{E} , έτσι ώστε $f(\vec{v}) = \vec{v}$, $\forall \vec{v} \in \mathcal{V}$ και $f(\vec{u}) = \vec{0}$, $\forall \vec{u} \in \mathcal{V}^\perp$. Τότε ο f καλείται ορθογώνια προβολή στον \mathcal{V} παράλληλα με τον \mathcal{V}^\perp .

Έστω ότι ο ενδομορφισμός f είναι μια ορθογώνια προβολή του υπόχωρου \mathcal{V} παράλληλα με τον \mathcal{V}^\perp . Τότε $f(\vec{v}) = \vec{v}$, $\forall \vec{v} \in \mathcal{V}$ και $f(\vec{u}) = \vec{0}$, $\forall \vec{u} \in \mathcal{V}^\perp$. Προφανώς $\mathcal{V} \subseteq \text{Im}(f)$ και $\mathcal{V}^\perp \subseteq \text{Ker}(f)$. Έστω $\vec{x} \in \text{Im}(f)$, και άρα $f(\vec{y}) = \vec{x}$. Επειδή $\mathcal{E} = \mathcal{V} \oplus \mathcal{V}^\perp$, θα έχουμε $\vec{y} = \vec{z} + \vec{w}$, όπου $\vec{z} \in \mathcal{V}$ και $\vec{w} \in \mathcal{V}^\perp$. Τότε $\vec{x} = f(\vec{y}) = f(\vec{z}) + f(\vec{w})$. Επειδή $\vec{z} \in \mathcal{V}$ θα έχουμε $f(\vec{z}) = \vec{z}$ και επειδή $\vec{w} \in \mathcal{V}^\perp$, θα έχουμε $f(\vec{w}) = \vec{0}$. Άρα $\vec{x} = \vec{z} \in \mathcal{V}$ και επομένως $\mathcal{V} = \text{Im}(f)$. Παρόμοια, αν $\vec{x} \in \text{Ker}(f)$, τότε έστω $\vec{x} = \vec{z} + \vec{w}$, όπου $\vec{z} \in \mathcal{V} = \text{Im}(f)$ και $\vec{w} \in \mathcal{V}^\perp$. Τότε $\vec{z} = f(\vec{y})$ για κάποιο $\vec{y} \in \mathcal{E}$ και $f(\vec{w}) = \vec{0}$ διότι $\mathcal{V}^\perp \subseteq \text{Ker}(f)$. Τότε $\vec{z} = \vec{x} - \vec{w} \in \text{Ker}(f)$ και άρα $f^2(\vec{y}) = f(\vec{z}) = \vec{0}$. Τότε $\vec{z} = f(\vec{y}) = f^2(\vec{y}) = \vec{0}$ και άρα $\vec{x} = \vec{w} \in \mathcal{V}^\perp$. Επομένως $\text{Ker}(f) = \mathcal{V}^\perp = \text{Im}(f)^\perp$. Επομένως δείξαμε ότι: $\mathcal{V} = \text{Im}(f)$, $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f)^\perp$, και επιπλέον:

$$\mathcal{E} = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f) \quad \text{και} \quad \text{Im}(f)^\perp = \text{Ker}(f)$$

Άσκηση 33. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης, και

$$f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$$

έναν ενδομορφισμό του \mathcal{E} . Αν ο f είναι μια προβολή, δηλαδή $f^2 = f$, ναδειχθεί ότι ο f είναι αυτοπροσαρτημένος αν και μόνον αν ο f είναι ορθογώνια προβολή.

Λύση. « \implies » Έστω ότι ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος. Τότε από το Φασματικό Θεώρημα, έπεται ότι υπάρχει μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} η οποία αποτελείται από ιδιοδιανύσματα του f . Σημειώνουμε ότι αν λ είναι μια ιδιοτιμή του f , τότε $\lambda = 0$ ή $\lambda = 1$. Υποθέτουμε ότι η ιδιοτιμή 1 εμφανίζεται k -φορές και η ιδιοτιμή 0 εμφανίζεται $n - k$ φορές, όπου $n = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E}$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορούμε να υποθέσουμε ότι: $f(\vec{e}_i) = \vec{e}_i$, $1 \leq i \leq k$ και $f(\vec{e}_i) = \vec{0}$, $k + 1 \leq i \leq n$. Τότε προφανώς το σύνολο διανυσμάτων $\{\vec{e}_{k+1}, \vec{e}_{k+2}, \dots, \vec{e}_n\}$ αποτελεί μια ορθοκανονική βάση του $\text{Ker}(f)$, και το σύνολο διανυσμάτων $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k\}$ αποτελεί ένα γραμμικά ανεξάρτητο και ορθογώνιο σύνολο διανυσμάτων του $\text{Im}(f)$. Επειδή $\dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(f) = \dim_{\mathbb{R}} \mathcal{E} - \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(f) = n - (n - k) = k$, έπεται ότι το σύνολο $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k\}$ αποτελεί μια ορθοκανονική βάση του $\text{Im}(f)$. Εκ' κατασκευής τότε έχουμε ένα ορθογώνιο ευθύ άθροισμα $\mathcal{E} = \text{Im}(f) \oplus \text{Ker}(f)$ και άρα $\text{Ker}(f) = \text{Im}(f)^\perp$. Αν $\vec{x} \in \text{Im}(f)$, τότε $\vec{x} = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_k\vec{e}_k$ και άρα $f(\vec{x}) = x_1f(\vec{e}_1) + x_2f(\vec{e}_2) + \dots + x_kf(\vec{e}_k) = x_1\vec{e}_1 + x_2\vec{e}_2 + \dots + x_k\vec{e}_k = \vec{x}$. Επειδή $f(\vec{x}) = \vec{0}$, $\forall \vec{x} \in \text{Im}(f)^\perp$, έπεται ότι ο ενδομορφισμός f είναι μια ορθογώνια προβολή του υπόχωρου $\mathcal{V} = \text{Im}(f)$ παράλληλα με τον $\mathcal{V}^\perp = \text{Im}(f)^\perp = \text{Ker}(f)$.

« \impliedby » Έστω $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$. Τότε μπορούμε να γράψουμε μοναδικά:

$$\vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2 \quad \text{όπου} \quad \vec{x}_1 \in \text{Im}(f) \quad \text{και} \quad \vec{x}_2 \in \text{Ker}(f)$$

$$\vec{y} = \vec{y}_1 + \vec{y}_2 \quad \text{όπου} \quad \vec{y}_1 \in \text{Im}(f) \quad \text{και} \quad \vec{y}_2 \in \text{Ker}(f)$$

Τότε: $f(\vec{x}) = f(\vec{x}_1) + f(\vec{x}_2) = f(\vec{x}_1) = \vec{x}_1$ και $f(\vec{y}) = f(\vec{y}_1) + f(\vec{y}_2) = f(\vec{y}_1) = \vec{y}_1$, και επειδή $\text{Im}(f) \perp \text{Ker}(f)$, θα έχουμε:

$$\langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}_1, \vec{y}_1 + \vec{y}_2 \rangle = \langle \vec{x}_1, \vec{y}_1 \rangle + \langle \vec{x}_1, \vec{y}_2 \rangle \langle \vec{x}_1, \vec{y}_1 \rangle$$

και παρόμοια

$$\langle \vec{x}, f(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}_1 + \vec{x}_2, \vec{y}_1 \rangle = \langle \vec{x}_1, \vec{y}_1 \rangle + \langle \vec{x}_2, \vec{y}_1 \rangle \langle \vec{x}_1, \vec{y}_1 \rangle$$

Από τις παραπάνω σχέσεις έπεται ότι, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, f(\vec{y}) \rangle$$

και αυτό σημαίνει, λόγω μοναδικότητας του προσαρτημένου ενδομορφισμού, ότι: $f^* = f$. ■

Άσκηση 34. Έστω $(\mathcal{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης.

Έστω

$$\text{AE}^{>0}(\mathcal{E}) = \{f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E} \mid f: \text{θετικός αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός του } \mathcal{E}\}$$

$$\text{IP}(\mathcal{E}) = \{\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R} \mid \langle \cdot, \cdot \rangle: \text{εσωτερικό γινόμενο επί του } \mathcal{E}\}$$

Να δείχθει ότι η απεικόνιση:

$$\Phi: \text{AE}^{>0}(\mathcal{E}) \rightarrow \text{IP}(\mathcal{E}), \quad \Phi(f) = \langle \cdot, \cdot \rangle_f: \mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle_f = \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle$$

είναι «1-1» και «επί».

Λύση. Έστω $f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}$ ένας θετικός και αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Χρησιμοποιώντας ότι ο f είναι αυτοπροσαρτημένος ($f^* = f$) και θετικός ($\langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle > 0, \forall \vec{0} \neq \vec{x} \in \mathcal{E}$), θα έχουμε, $\forall \vec{x}, \vec{y}, \vec{z} \in \mathcal{E}, \forall k \in \mathbb{R}$:

$$\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{z} \rangle_f = \langle f(\vec{x} + \vec{y}), \vec{z} \rangle = \langle f(\vec{x}) + f(\vec{y}), \vec{z} \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle_f + \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle_f$$

$$\langle \kappa \vec{x}, \vec{y} \rangle_f = \langle f(\kappa \vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \kappa f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \kappa \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \kappa \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle_f$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle_f = \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle = \langle \vec{x}, f^*(\vec{y}) \rangle = \langle \vec{x}, f(\vec{y}) \rangle = \langle f(\vec{y}), \vec{x} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{x} \rangle_f$$

$$\langle \vec{x}, \vec{x} \rangle_f = \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle_f \geq 0 \quad \text{και} \quad \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle_f = 0 \iff \langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle_f = 0 \iff \vec{x} = \vec{0}$$

Επομένως η απεικόνιση $\langle \cdot, \cdot \rangle_f$ είναι ένα εσωτερικό γινόμενο επί του \mathcal{E} .

Αντίστροφα, έστω

$$\langle \cdot, \cdot \rangle: \mathcal{E} \times \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\vec{x}, \vec{y}) \mapsto \langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$$

ένα εσωτερικό γινόμενο επί του \mathcal{E} . Για κάθε διάνυσμα $\vec{x} \in \mathcal{E}$, θεωρούμε τη γραμμική απεικόνιση

$$\langle \vec{x}, - \rangle: \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}, \quad \vec{z} \mapsto \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle$$

Από το Λήμμα του Riesz, έπεται τότε ότι υπάρχει μοναδικό διάνυσμα \vec{y} έτσι ώστε:

$$\langle \vec{x}, - \rangle = \langle \vec{y}, - \rangle, \quad \text{δηλαδή } \forall \vec{z} \in \mathcal{E}: \quad \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle$$

Συμβολίζουμε το μοναδικό αυτό διάνυσμα \vec{y} με $f(\vec{x})$ και επομένως έχουμε ορίσει μια απεικόνιση

$$f: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{E}, \quad \vec{x} \mapsto f(\vec{x}) = \text{το μοναδικό διάνυσμα του } \mathcal{E} \text{ έτσι ώστε } \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle, \forall \vec{z} \in \mathcal{E}$$

Δείχνουμε ότι η απεικόνιση f είναι ενδομορφισμός ο οποίος είναι αυτοπροσαρτημένος και θετικός.

Έστω $\vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$ και $\kappa \in \mathbb{R}$. Τότε $f(\vec{x}), f(\vec{y}), f(\vec{x} + \vec{y})$, και $f(\kappa \vec{x})$, ορίζονται μοναδικά από τις ακόλουθες σχέσεις, $\forall \vec{z} \in \mathcal{E}$:

$$\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle$$

$$\langle \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle f(\vec{y}), \vec{z} \rangle$$

$$\langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle f(\vec{x} + \vec{y}), \vec{z} \rangle$$

$$\langle \kappa \vec{x}, \vec{z} \rangle = \langle f(\kappa \vec{x}), \vec{z} \rangle$$

Προσθέτοντας τις δύο πρώτες και λαμβάνοντας υπόψη την τρίτη από τις παραπάνω σχέσεις, έπεται ότι, $\forall \vec{z} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x} + \vec{y}), \vec{z} \rangle = \langle \vec{x} + \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{z} \rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle + \langle f(\vec{y}), \vec{z} \rangle = \langle f(\vec{x}) + f(\vec{y}), \vec{z} \rangle$$

Επομένως θα έχουμε $f(\vec{x} + \vec{y}) = f(\vec{x}) + f(\vec{y})$. Παρόμοια, πολλαπλασιάζοντας βαθμωτά την πρώτη σχέση με κ και λαμβάνοντας υπόψη την τέταρτη από τις παραπάνω σχέσεις, έπεται ότι, $\forall \vec{z} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\kappa \vec{x}), \vec{z} \rangle = \langle \kappa \vec{x}, \vec{z} \rangle = \kappa \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle = \kappa \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle = \langle \kappa f(\vec{x}), \vec{z} \rangle$$

Επομένως θα έχουμε $f(\kappa \vec{x}) = \kappa f(\vec{x})$. Συμπεραίνουμε ότι η απεικόνιση f είναι ένας ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Επειδή, $\forall \vec{x}, \vec{z} \in \mathcal{E}$:

$$\langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{z} \rangle = \langle \vec{z}, \vec{x} \rangle = \langle f(\vec{z}), \vec{x} \rangle = \langle \vec{x}, f(\vec{z}) \rangle$$

έπεται ότι ο ενδομορφισμός f είναι αυτοπροσαρτημένος. Επιπλέον, $\forall \vec{x} \in \mathcal{E}$ με $\vec{x} \neq \vec{0}$:

$$\langle f(\vec{x}), \vec{x} \rangle = \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle > 0$$

επομένως ο αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός f είναι θετικός.

Με την παραπάνω διαδικασία έχουμε ορίσει μια απεικόνιση

$$\Psi : \text{IP}(\mathcal{E}) \longrightarrow \text{AE}^{>0}(\mathcal{E}), \quad \Psi(\langle\langle -, \rangle\rangle) = \text{ο μοναδικός ενδομορφισμός } f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}, \text{ έτσι ώστε :}$$

$$\langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle, \quad \forall \vec{z} \in \mathcal{E}$$

Θα δείξουμε ότι η απεικόνιση Φ είναι «1-1» και «επί» με αντίστροφη την Ψ , δηλαδή θα δείξουμε ότι:

$$\Psi \circ \Phi = \text{Id}_{\text{AE}^{>0}(\mathcal{E})} \quad \text{και} \quad \Phi \circ \Psi = \text{Id}_{\text{IP}(\mathcal{E})}$$

Έστω $f \in \text{AE}^{>0}(\mathcal{E})$ ένας θετικός αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός του \mathcal{E} . Τότε $\Phi(f) = \langle\langle -, - \rangle\rangle_f$ είναι το εσωτερικό γινόμενο το οποίο ορίζεται μοναδικά από τη σχέση, $\forall \vec{x}, \vec{z} \in \mathcal{E}$: $\langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle_f = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle$. Τότε ο ενδομορφισμός $\Psi(\Phi(f)) = \Psi(\langle\langle -, - \rangle\rangle_f)$ είναι ο μοναδικός θετικός ενδομορφισμός $\tilde{f} : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$ έτσι ώστε: $\langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle_{\tilde{f}} = \langle \tilde{f}(\vec{x}), \vec{z} \rangle$. Τότε, επειδή, $\forall \vec{x}, \vec{z} \in \mathcal{E}$: $\langle \tilde{f}(\vec{x}), \vec{z} \rangle = \langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle_f = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle$, προκύπτει ότι $\tilde{f} = f$ και επομένως

$$\Psi \circ \Phi = \text{Id}_{\text{AE}^{>0}(\mathcal{E})}$$

Έστω $\langle\langle -, \rangle\rangle \in \text{IP}(\mathcal{E})$ ένα εσωτερικό γινόμενο επί του \mathcal{E} . Τότε $\Psi(\langle\langle -, - \rangle\rangle)$ είναι ο μοναδικός θετικός αυτοπροσαρτημένος ενδομορφισμός $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$ έτσι ώστε: $\langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle$. Τότε το εσωτερικό γινόμενο $\Phi(\Psi(\langle\langle -, - \rangle\rangle))$ είναι το μοναδικό εσωτερικό γινόμενο $\langle\langle -, \rangle\rangle_f$ έτσι ώστε $\langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle_f = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle$. Τότε, επειδή, $\forall \vec{x}, \vec{z} \in \mathcal{E}$: $\langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle_f = \langle f(\vec{x}), \vec{z} \rangle = \langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle$, έπεται ότι $\langle\langle -, - \rangle\rangle_f = \langle\langle -, \rangle\rangle$ και επομένως

$$\Phi \circ \Psi = \text{Id}_{\text{IP}(\mathcal{E})} \quad \blacksquare$$

Άσκηση 35. Έστω $(\mathcal{E}, \langle -, \rangle)$ ένας Ευκλείδειος χώρος πεπερασμένης διάστασης n και έστω \mathcal{B} μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} . Θεωρούμε το σύνολο

$$S_n^{>0}(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid {}^t A = A > 0\}$$

των θετικών συμμετρικών $n \times n$ πινάκων.

Να δείχθει ότι η απεικόνιση

$$G : \text{IP}(\mathcal{E}) \longrightarrow S_n^{>0}(\mathbb{R}), \quad G(\langle\langle -, \rangle\rangle) = (\langle\langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle\rangle) = \text{ο πίνακας Gram των διανυσμάτων της βάσης } \mathcal{B}$$

είναι «1-1» και «επί».

Λύση. Αν \mathcal{B} είναι μια ορθοκανονική βάση του \mathcal{E} , τότε προφανώς η απεικόνιση

$$\Omega : \text{AE}^{>0}(\mathcal{E}) \longrightarrow S_n^{>0}(\mathbb{R}), \quad \Omega(f) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

είναι «1-1» και «επί». Επομένως, σύμφωνα με την προηγούμενη Άσκηση, έπεται ότι η απεικόνιση

$$G := \Omega \circ \Psi : \text{IP}(\mathcal{E}) \longrightarrow S_n^{>0}(\mathbb{R}), \quad G(\langle\langle -, \rangle\rangle) = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$$

όπου $f : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$ είναι ο μοναδικός (αυτοπροσαρτημένος και θετικός) ενδομορφισμός του \mathcal{E} έτσι ώστε, $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathcal{E}$:

$$\langle\langle \vec{x}, \vec{z} \rangle\rangle = \langle f(\vec{x}), \vec{y} \rangle$$

είναι «1-1» και «επί». Έστω $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f) = (a_{ij})$. Θα έχουμε τότε, $\forall j = 1, 2, \dots, n$:

$$f(\vec{e}_j) = a_{1j}\vec{e}_1 + a_{2j}\vec{e}_2 + \dots + a_{nj}\vec{e}_n$$

Επειδή η βάση \mathcal{B} είναι ορθοκανονική, έπεται ότι:

$$\langle f(\vec{e}_j), \vec{e}_i \rangle = \langle a_{1j}\vec{e}_1 + a_{2j}\vec{e}_2 + \dots + a_{nj}\vec{e}_n, \vec{e}_i \rangle = a_{ij}$$

Άρα:

$$\langle\langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle\rangle = \langle\langle \vec{e}_j, \vec{e}_i \rangle\rangle = a_{ij}$$

και επομένως ο πίνακας $M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}(f)$ είναι ο πίνακας Gram των διανυσμάτων της ορθοκανονικής βάσης \mathcal{B} ως προς το εσωτερικό γινόμενο $\langle\langle -, \rangle\rangle$. ■