

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #1

1. Θεωρούμε το σύνολο  $S = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  των μη μηδενικών πραγματικών αριθμών. Ορίζουμε την πράξη  $* : S \times S \rightarrow S$  στο  $S$  ως εξής

$$a * b = |a|b.$$

- (α') Να δειχθεί ότι η πράξη  $*$  είναι καλά ορισμένη και προσεταιριστική.
- (β') Να δειχθεί ότι υπάρχει  $e \in S$  ώστε  $e * b = b$  για κάθε  $b \in S$ . Επίσης να δειχθεί ότι αν  $a \in S$  τότε υπάρχει  $b \in S$  με  $a * b = e$ .
- (γ') Έχει η  $S$  ουδέτερο στοιχείο; Είναι η  $S$  ομάδα;

2. Να δειχθεί ότι το ανοικτό διάστημα  $(-1, 1) \subset \mathbb{R}$  αποτελεί αβελιανή ομάδα με πράξη

$$x * y = \frac{x + y}{1 + xy}$$

3. Έστω  $(G, *)$  μια ομάδα με ουδέτερο στοιχείο  $e$ . Αν το σύνολο  $G$  είναι πεπερασμένο με άρτιο πλήθος στοιχείων να δειχθεί ότι υπάρχει στοιχείο  $a \in G$  με  $a \neq e$  τέτοιο ώστε  $a * a = e$ .

4. Έστω  $(G, *)$  μια ομάδα με ουδέτερο στοιχείο  $e$ . Αν ισχύει

$$x * x = e$$

για κάθε  $x \in G$  δείξτε ότι η ομάδα  $G$  είναι αβελιανή.

5. Έστω  $(G, *)$  μια ομάδα με ουδέτερο στοιχείο  $e$  και  $a, b, c \in G$ . Δείξτε ότι τα ακόλουθα είναι ισοδύναμα

- (α')  $a * b * c = e$
- (β')  $b * c * a = e$
- (γ')  $c * a * b = e$

6. Έστω  $\mathbb{C} = \mathbb{R}^2$ . Στο σύνολο  $\mathbb{C}$  ορίζουμε δύο πράξεις  $+, \cdot$  ως εξής:

$$(a_1, b_1) + (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2)$$

$$(a_1, b_1) \cdot (a_2, b_2) = (a_1 a_2 - b_1 b_2, a_1 b_2 + a_2 b_1).$$

- (α') Δείξτε ότι τα ζεύγη  $(\mathbb{C}, +)$  και  $(\mathbb{C} \setminus \{(0, 0)\}, \cdot)$  είναι αβελιανές ομάδες, και ότι η πράξη  $\cdot$  είναι επιμεριστική επί της πράξης  $+$ .
- (β') Θέτουμε  $i = (0, 1) \in \mathbb{C}$  και αν  $a \in \mathbb{R}$  θέτουμε  $\tilde{a} = (a, 0) \in \mathbb{C}$ . Δείξτε ότι αν  $z \in \mathbb{C}$  τότε υπάρχουν μοναδικά  $a, b \in \mathbb{R}$  τέτοια ώστε  $z = \tilde{a} + \tilde{b} \cdot i$ . Επιπλέον δείξτε ότι  $i \cdot i = (-1)$ .

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #2

1. Για κάθε μια από τις παρακάτω ομάδες να βρεθούν τουλάχιστον δύο μη-τετριμμένες γνήσιες υποομάδες

$$(\mathbb{Z}, +), \quad (\mathbb{Q}, +), \quad (S_3, \circ), \quad (8\mathbb{Z}, +), \quad (\mathrm{GL}_2(\mathbb{R}), \cdot).$$

2. Να προσδιορισθεί η κυκλική υποομάδα  $\langle A \rangle$  της γενικής γραμμικής ομάδας  $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$  η οποία παράγεται από τον πίνακα  $A$ , όπου  $A$  είναι ένας εκ των πινάκων

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. Δείξτε ότι αν  $H$  και  $K$  είναι δύο υποομάδες μιας αβελιανής ομάδας  $(G, *)$ , τότε το υποσύνολο

$$H * K = \{h * k : h \in H, k \in K\}$$

είναι υποομάδα της  $G$ . Επίσης να αποδείξετε με την βοήθεια αντιπαραδείγματος ότι ο ισχυρισμός δεν αληθεύει όταν η ομάδα  $G$  δεν είναι αβελιανή.

4. (α') Αν  $H, K$  είναι υποομάδες μιας ομάδας  $G$  δείξτε ότι η ένωση  $H \cup K$  είναι υποομάδα αν και μόνο αν είτε  $H \subseteq K$  είτε  $K \subseteq H$ .

- (β') Δείξτε ότι δεν υπάρχει ομάδα που να είναι ένωση δύο γνησίων υποομάδων της.

- (γ') Δείξτε ότι η ομάδα  $(U(\mathbb{Z}_8), \cdot)$  είναι ένωση τριών γνησίων υποομάδων της.

5. (α') Συμβολίζουμε με  $T$  το σύνολο των μιγαδικών αριθμών με μέτρο ίσο με 1, δηλαδή

$$T = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$$

Να δειχθεί ότι το  $T$  αποτελεί υποομάδα του  $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ .

- (β') Συμβολίζουμε με  $U$  το σύνολο των μιγαδικών αριθμών  $z$  με την ιδιότητα να υπάρχει θετικός ακέραιος  $n$  ώστε  $z^n = 1$ . Δείξτε ότι το  $U$  είναι υποομάδα της  $(T, \cdot)$ .

- (γ') Έστω  $m$  θετικός ακέραιος. Θέτουμε

$$U_m = \{z \in \mathbb{C} : z^m = 1\}.$$

Η  $U_m$  ονομάζεται ομάδα των  $m$ -στων ριζών της μονάδος στο  $\mathbb{C}$ . Δείξτε ότι η  $U_m$  είναι υποομάδα της  $(U, \cdot)$ .

- (δ') Δείξτε ότι  $U = \bigcup_{m=1}^{\infty} U_m$ . Επιπλέον, δείξτε ότι για κάθε θετικό ακέραιο  $m$  η ομάδα  $U_m$  είναι κυκλική και ότι η ομάδα  $U$  δεν είναι κυκλική.

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #3

1. Έστω  $n, m$  δύο θετικοί ακέραιοι, και

$$H_1 = n\mathbb{Z} = \langle n \rangle, \quad H_2 = m\mathbb{Z} = \langle m \rangle$$

οι κυκλικές υποομάδες της ομάδας  $(\mathbb{Z}, +)$  οι οποίες παράγονται από τους φυσικούς αριθμούς  $n, m$  αντίστοιχα. Να προσδιορισθεί η ομάδα  $H_1 \cap H_2$ .

2. Έστω  $G$  πεπερασμένη κυκλική ομάδα με τάξη  $|G| \geq 3$ . Δείξτε ότι το πλήθος των γεννητόρων της  $G$  είναι άρτιο.

3. Έστω ότι  $(G, *)$  είναι μια ομάδα και  $a, b, x \in G$ . Δείξτε ότι

$$\text{ord}(x^{-1} * a * x) = \text{ord}(a) = \text{ord}(x * a * x^{-1}), \quad \text{ord}(a * b) = \text{ord}(b * a).$$

Επίσης δείξτε ότι  $\text{ord}(a^{-1}) = \text{ord}(a)$ .

4. Έστω ότι  $(G, *)$  είναι μια ομάδα,  $H$  μια υποομάδα της  $G$  και  $x \in G$ . Θέτουμε

$$xHx^{-1} = \{xhx^{-1} : h \in H\}.$$

Δείξτε ότι η  $xHx^{-1}$  είναι υποομάδα της  $G$  και ότι  $\#(xHx^{-1}) = \#H$ .

5. Να ευρεθεί η τάξη του στοιχείου  $a$  της ομάδος  $(G, *)$ , όπου

$a = [2]_3, \quad (G, *) = (\mathbb{Z}_3, +),$	$a = [6]_{10}, \quad (G, *) = (\mathbb{Z}_{10}, +),$
$a = i, \quad (G, *) = (\mathbb{C}^*, \cdot),$	$a = -i, \quad (G, *) = (\mathbb{C}^*, \cdot),$
$a = -1 + i\sqrt{3}, \quad (G, *) = (\mathbb{C}^*, \cdot),$	$a = (-1 + i\sqrt{3})/2, \quad (G, *) = (\mathbb{C}^*, \cdot).$

6. Να ευρεθεί η τάξη όλων των στοιχείων της ομάδος  $G = (U(\mathbb{Z}_{14}), \cdot)$  των αντιστρεψίμων ακεραίων modulo 14. Είναι η ομάδα  $G$  κυκλική;

7. Βρείτε το πλήθος των γεννητόρων μιας κυκλικής ομάδας με τάξη  $n$ , όταν  $n = 5$ ,  $n = 8$ ,  $n = 12$ ,  $n = 60$ .

8. Βρείτε όλους τους γεννητορες της ομάδος  $U_m$  των  $m$ -στων ριζών της μονάδας στο  $\mathbb{C}$  όταν  $m = 4$ ,  $m = 17$ ,  $m = 24$ ,  $m = 31$ .

9. Βρείτε όλους τους γεννητορες των ομάδων  $(\mathbb{Z}_{10}, +)$ ,  $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ ,  $(\mathbb{Z}_{15}, +)$ .

10. Ποιές είναι οι δυνατές τάξεις για τις υποομάδες των επόμενων κυκλικών ομάδων

$$(\mathbb{Z}, +), \quad (\mathbb{Z}_6, +), \quad (\mathbb{Z}_8, +), \quad (\mathbb{Z}_{12}, +), \quad (\mathbb{Z}_{60}, +), \quad (\mathbb{Z}_{17}, +);$$

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #4

1. Δείξτε ότι μια ομάδα  $G$  έχει πεπερασμένο πλήθος υποομάδων αν και μόνο αν η ομάδα  $G$  είναι πεπερασμένη.
2. Να δειχθεί ότι μια ομάδα  $G$  έχει ακριβώς δύο υποομάδες αν και μόνο αν η  $G$  είναι κυκλική τάξης  $p$ , όπου  $p$  πρώτος.
3. Έστω ότι η  $G$  είναι κυκλική ομάδα τάξης  $n$ . Έστω  $m$  ένας θετικός διαιρέτης του  $n$ . Δείξτε ότι η  $G$  έχει ακριβώς  $\phi(m)$  στοιχεία τάξης  $m$ , όπου  $\phi$  είναι η συνάρτηση  $\phi$  του Euler.
4. Να βρεθούν οι αριστερές πλευρικές κλάσεις της υποομάδας  $H$  στην ομάδα  $G$  όταν:

$$H = \langle 5 \rangle = 5\mathbb{Z}, G = \mathbb{Z}, \quad H = \langle 9 \rangle = 9\mathbb{Z}, G = \mathbb{Z}$$

5. Να βρεθούν οι αριστερές πλευρικές κλάσεις της υποομάδας  $\langle [6]_{12} \rangle$  στην ομάδα  $(\mathbb{Z}_{12}, +)$  και της  $\langle [6]_{12} \rangle$  στην (υπο)ομάδα  $\langle [2]_{12} \rangle$  της  $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ .
6. Θεωρούμε τις ακόλουθες (κυκλικές) υποομάδες της  $S_3$

$$H = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right\rangle, \quad K = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

Να βρεθούν οι δεξιές και αριστερές πλευρικές κλάσεις (δεξιά και αριστερά σύμπλοκα) των υποομάδων  $H$ ,  $K$  στην  $S_3$ .

7. Θεωρούμε την διεδρική ομάδα  $D_4$  τάξης 8. Για κάθε στοιχείο  $a \in D_4$  να υπολογίσετε την τάξη της κυκλικής ομάδος  $\langle a \rangle$  που παράγετε από το  $a$  και τις δεξιές πλευρικές κλάσεις της υποομάδας  $\langle a \rangle$  στην  $D_4$ .
8. Θεωρούμε την ομάδα  $(\mathbb{Z}_{12}, +)$ , και την ομάδα ευθύ γινόμενο  $G = \mathbb{Z}_{12} \times \mathbb{Z}_{12}$ . Έστω  $H$  το ακόλουθο υποσύνολο της  $G$ :

$$H = \{ ([a]_{12}, [b]_{12}) \in G : 3 \mid a, 3 \mid b \}.$$

Δείξτε ότι το σύνολο  $H$  είναι υποομάδα της  $G$  και υπολογίστε τον δείκτη  $[G : H]$ .

9. Έστω ότι  $(G, *)$  είναι μια ομάδα και ότι  $H \leq G$  είναι μια υποομάδα της  $G$ . Να δειχθεί ότι το πλήθος των αριστερών συμπλόκων (πλευρικών κλάσεων) της  $H$  στην  $G$  ισούται με το πλήθος των δεξιών συμπλόκων (πλευρικών κλάσεων) της  $H$  στην  $G$ .
10. Έστω ότι  $(G, *)$  είναι μια ομάδα,  $H, K$  δύο υποομάδες της  $G$  και  $a, b \in G$ . Αν  $a * H = b * K$  δείξτε ότι  $H = K$ .

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #5

1. Βρείτε τον δείκτη  $[G : H]$  της υποομάδας  $H \leq G$  όταν  $H = n\mathbb{Z}$  και  $G = \mathbb{Z}$ .
2. Βρείτε τον δείκτη  $[G : H]$  της υποομάδας  $H \leq G$  όταν  $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$  και
$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x = y\}.$$
3. Έστω ότι  $(G, *)$  είναι πεπερασμένη ομάδα, και  $H, K$  δύο υποομάδες της  $G$ .
  - (α') Υποθέτουμε ότι η τάξη της  $H$  είναι πρώτος αριθμός  $p$  που δεν διαιρεί την τάξη της  $K$ . Δείξτε ότι  $H \cap K = \{e\}$ .
  - (β') Υποθέτουμε ότι οι ομάδες  $H, K$  έχουν τάξη τον ίδιο πρώτο αριθμό  $p$  και  $H \neq K$ . Δείξτε ότι  $H \cap K = \{e\}$ .
4. Βρείτε υποομάδα  $H$  της πολλαπλασιαστικής ομάδας  $(\mathbb{R}^*, \cdot)$  έτσι ώστε  $[\mathbb{R}^* : H] = 2$ .
5. Έστω  $G$  ομάδα με τάξη  $\#G < 300$  η οποία έχει δύο υποομάδες  $H, K$  με τάξεις  $\#H = 24$  και  $\#K = 54$ . Βρείτε την τάξη της  $G$ .
6. Έστω  $(G, *)$  ομάδα και  $a, b \in G$  στοιχεία πεπερασμένης τάξης με την ιδιότητα  $a * b = b * a$ . Υποθέτουμε ότι ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης των  $\text{ord}(a)$  και  $\text{ord}(b)$  είναι 1. Δείξτε ότι
$$\text{ord}(a * b) = \text{ord}(a) \cdot \text{ord}(b).$$
7. Έστω  $G$  πεπερασμένη αβελιανή ομάδα. Θέτουμε
$$M = \{ \text{ord}(a) : a \in G \}.$$

Έστω  $m$  το μέγιστο στοιχείο του  $M$ . Δείξτε ότι  $a^m = e_G$  για κάθε  $a \in G$ . Επιπλέον, δείξτε ότι το αποτέλεσμα δεν ισχύει αν  $G = S_3$ .
8. Έστω ότι  $p, q$  είναι πρώτοι αριθμοί, και  $(G, *)$  μια ομάδα. Να δειχθεί ότι:
  - (α') Αν η τάξη της  $G$  είναι  $pq$ , τότε κάθε γνήσια υποομάδα  $H$  της  $G$  είναι κυκλική.
  - (β') Αν η  $G$  είναι αβελιανή με τάξη  $pq$  και  $p \neq q$ , τότε η  $G$  είναι κυκλική.
  - (γ') Υπάρχουν αβελιανές ομάδες τάξης  $p^2$  που δεν είναι κυκλικές.
9. Έστω  $G$  μια (όχι απαραίτητα πεπερασμένη) ομάδα και  $H, K$  δύο υποομάδες της  $G$  με  $K \leq H$ . Αν ο δείκτης  $[G : K]$  είναι πεπερασμένος, τότε να δειχθεί ότι οι δείκτες  $[G : H]$  και  $[H : K]$  είναι πεπερασμένοι και ισχύει ότι
$$[G : K] = [G : H] \cdot [H : K]$$

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #6

1. Σε κάθε μια από τις επόμενες περιπτώσεις να εξεταστεί αν η απεικόνιση που ορίζεται είναι ομομορφισμός ομάδων και αν είναι να υπολογιστεί ο πυρήνας της:
  - (1)  $\phi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $\phi(k) = k - 1$ .
  - (2)  $\phi : (\mathbb{R}^*, \cdot) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$ ,  $\phi(a) = |a|$ .
  - (3)  $\phi : S_3 \rightarrow S_3$ ,  $\phi(a) = a^{-1}$ .
  - (4)  $\phi : \mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}_2$ ,  $\phi([a]_6) = [a]_2$ .
2. Έστω  $G$  ομάδα. Να δειχθεί ότι τα επόμενα είναι ισοδύναμα:
  - (1) Η  $G$  είναι αβελιανή.
  - (2) Η απεικόνιση  $f : G \rightarrow G$ ,  $f(a) = a^{-1}$  είναι ομομορφισμός.
  - (3) Η απεικόνιση  $h : G \rightarrow G$ ,  $h(a) = a^2$  είναι ομομορφισμός.
  - (4) Η απεικόνιση  $r : G \times G \rightarrow G$ ,  $r(a, b) = ab$  είναι ομομορφισμός.
3. (1) Δείξτε ότι η απεικόνιση  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ,  $f(a) = 2a$  είναι μονομορφισμός που δεν είναι επί.  
 (2) Δείξτε ότι η απεικόνιση  $h : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*$ ,  $h(a) = a^2$  είναι επιμορφισμός που δεν είναι ένα προς ένα.
4. Δώστε παράδειγμα μη-τετριμένου ομομορφισμού ή δικαιολογήστε γιατί δεν υπάρχει μη-τετριμένος ομομορφισμός  $f : G \rightarrow H$  όταν
 
$$\begin{array}{lll} f : \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_5, & f : \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_4, & f : \mathbb{Z}_3 \rightarrow \mathbb{Z}, \\ f : \mathbb{Z}_3 \rightarrow S_3, & f : \mathbb{Z} \rightarrow S_3, & f : S_3 \rightarrow S_4 \end{array}$$
5. (1) Υπολογίστε το σύνολο των ομομορφισμών  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ .  
 (2) Υπολογίστε το σύνολο των ομομορφισμών  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6$ .  
 (3) Υπολογίστε το σύνολο των ομομορφισμών  $\mathbb{Z}_6 \rightarrow \mathbb{Z}$ .  
 (4) Υπολογίστε το σύνολο των ομομορφισμών  $\mathbb{Z}_{25} \rightarrow \mathbb{Z}_{15}$ .  
 (5) Υπολογίστε το σύνολο των ομομορφισμών  $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ .  
 (6) Υπολογίστε το σύνολο των ομομορφισμών  $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ .
6. Έστω ότι  $G$  είναι μια άπειρη ομάδα. Δείξτε ότι η  $G$  είναι κυκλική αν και μόνο αν κάθε υποομάδα  $H \neq \{e\}$  της  $G$  είναι ισόμορφη με την  $G$ .

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #7

1. Βρείτε όλες τις υποομάδες των παρακάτω ομάδων και σχεδιάστε το διάγραμμα Hasse των υποομάδων της.

- (1)  $\mathbb{Z}_3$ , (2)  $\mathbb{Z}_9$ , (3)  $\mathbb{Z}_{27}$ , (4)  $\mathbb{Z}_{15}$ , (5)  $\mathbb{Z}_{45}$ , (6)  $\mathbb{Z}_{30}$ , (7)  $\mathbb{Z}_{36}$ .

2. Θεωρούμε τα ακόλουθα στοιχεία της  $S_6$ :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 4 & 5 & 6 & 2 \end{pmatrix}, \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 4 & 1 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix}, \mu = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 5 & 2 & 4 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

- (1) Να προσδιορισθούν οι τροχιές της  $\chi$  στις οποίες διαμερίζεται το σύνολο  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ , όταν  $\chi = \sigma, \tau$  και  $\mu$ .
- (2) Να προσδιορισθεί η ανάλυση σε ξένους κύκλους των  $\tau, \mu, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \sigma^4, \sigma^5, \sigma^6$ .
- (3) Να προσδιορισθούν οι τάξεις  $\text{ord}(\sigma), \text{ord}(\tau), \text{και } \text{ord}(\mu)$ .
- (4) Να υπολογιστεί η μετάθεση  $\sigma^{2018}$ .
- (5) Να υπολογιστούν τα στοιχεία:

$$\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1}, \quad \sigma^{-1} \circ \tau \circ \sigma, \quad \tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}, \quad \mu \circ \tau \circ \mu^{-1}.$$

- (6) Να επιλυθεί ως προς  $x \in S_6$  η εξίσωση:  $x \circ \sigma \circ x^{-1} = (1, 2, 3, 4, 5, 6)$ .
- (7) Να δειχθεί ότι δεν υπάρχει  $x \in S_6$  ώστε:  $x \circ \sigma \circ x^{-1} = \tau$ .

3. Να δειχθεί ότι το πρόσημο μιας μετάθεσης  $\sigma$  της  $S_n$  είναι ίσο με το πρόσημο της αντίστροφης μετάθεσης  $\sigma^{-1}$ .

4. Έστω ότι  $\sigma, \tau \in S_n, n \geq 2$ . Να δειχθεί ότι:

- (1) Ισχύει  $\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1} \circ \tau^{-1} \in A_n$ .
- (2) Ισχύει  $\sigma \circ \tau \circ \sigma^{-1} \in A_n$  αν και μόνο αν  $\tau \in A_n$ .

5. Να δείξετε ότι κάθε στοιχείο  $\sigma \in A_n, n \geq 3$ , μπορεί να γραφεί σαν γινόμενο 3-κύκλων.

6. Να δείξετε ότι αν  $n \geq 4$  η εναλλάσσουσα ομάδα  $A_n$  δεν είναι αβελιανή.

7. Να δείξετε ότι η εναλλάσσουσα ομάδα  $A_4$  έχει υποομάδες τάξεις 1, 2, 3, 4 και 12, αλλά δεν έχει υποομάδα τάξης 6.

8. Να βρεθεί το διάγραμμα Hasse της εναλλάσσουσας ομάδας  $A_4$ .

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #8

1. Έστω  $G$  μια ομάδα και  $H$  μια πεπερασμένη υποομάδα της  $G$  με την ιδιότητα ότι η  $H$  είναι η μοναδική υποομάδα της  $G$  με τάξη  $\#H$ . Να δείξετε ότι η  $H$  είναι κανονική.
2. Έστω  $(G, *)$  μια ομάδα και  $H$  μια κανονική υποομάδα της  $G$ . Έστω  $a, b \in G$  με  $a * b \in H$ . Δείξτε ότι  $b * a \in H$ . Επίσης, βρείτε υποομάδα  $H$  της  $S_3$  και  $a, b \in S_3$  ώστε  $a * b \in H$ , ενώ  $b * a \notin H$ .
3. Έστω  $G$  ομάδα. Δείξτε ότι η τομή οποιουδήποτε πλήθους κανονικών υποομάδων της  $G$  είναι κανονική υποομάδα της  $G$ .
4. Έστω  $f : G_1 \rightarrow G_2$  ένας ομομορφισμός ομάδων.
  - (1) Αν  $H$  είναι μια κανονική υποομάδα της  $G_1$ , να δείξετε ότι η  $f(H)$  είναι κανονική υποομάδα της ομάδας  $f(G_1)$ . Βρείτε παράδειγμα, όπου η υποομάδα  $f(H)$  δεν είναι κανονική υποομάδα της ομάδας  $G_2$ .
  - (2) Αν  $K$  είναι μια κανονική υποομάδα της  $G_2$ , να δείξετε ότι η  $f^{-1}(K)$  είναι κανονική υποομάδα της ομάδας  $G_1$ .
5. Θεωρούμε την υποομάδα  $\mathbb{Z}$  της προσθετικής ομάδας  $\mathbb{R}$ . Δείξτε ότι είναι κανονική υποομάδα και να βρεθούν όλα τα στοιχεία πεπερασμένης τάξης της ομάδας πηλίκο  $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ .
6. Θεωρούμε την υποομάδα  $T$  της ομάδας  $(\mathbb{C}^*, \cdot)$ , όπου
 
$$T = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$$

Δείξτε ότι η υποομάδα  $T$  είναι κανονική και ότι η ομάδα πηλίκο  $\mathbb{C}^*/T$  είναι ισόμορφη με την πολλαπλασιαστική ομάδα των θετικών πραγματικών αριθμών.
7. Βρείτε τις τάξεις των ομάδων πηλίκο
 
$$\mathbb{Z}_6 / \langle [3]_6 \rangle, \quad \mathbb{Z}_{60} / \langle [12]_{60} \rangle, \quad \mathbb{Z}_{60} / \langle [39]_{60} \rangle.$$
8. Βρείτε την τάξη του στοιχείου:
  - (1)  $[5]_{12} + H$  στην ομάδα πηλίκο  $\mathbb{Z}_{12}/H$ , όπου  $H = \langle [4]_{12} \rangle$ .
  - (2)  $[26]_{60} + H$  στην ομάδα πηλίκο  $\mathbb{Z}_{60}/H$ , όπου  $H = \langle [12]_{60} \rangle$ .
9. Να δειχθεί ότι υπάρχουν ισομορφισμοί ομάδων:
  - (1)  $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z})/H$  με την ομάδα  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}$ , όπου  $H = \langle (2, 2) \rangle$ .
  - (2)  $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4)/H$  με την ομάδα  $\mathbb{Z}_2$ , όπου  $H = \langle ([0]_2, [1]_4) \rangle$
  - (3)  $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4)/H$  με την ομάδα  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ , όπου  $H = \langle ([0]_2, [2]_4) \rangle$ .

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #9

1. Δείξτε ότι τα επόμενα σύνολα μαζί με τις αναφερόμενες πράξεις αποτελούν δακτυλίους:

- (1)  $R = \{m/n \in \mathbb{Q} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$  μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού των ρητών αριθμών.
- (2)  $R = \{m/2^k \in \mathbb{Q} \mid m, k \in \mathbb{Z}\}$  μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού των ρητών αριθμών.
- (3)  $R = \{a + b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$  μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού των πραγματικών αριθμών.
- (4)  $R = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{2}\sqrt{3} \mid a, b, c, d \in \mathbb{Q}\}$  μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού των πραγματικών αριθμών.
- (5)  $R = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$  όπου  $i^2 = -1$ , μαζί με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού των μιγαδικών αριθμών.

2. Να δειχθεί ότι το σύνολο μιγαδικών  $2 \times 2$  πινάκων

$$\mathbb{H} = \left\{ \begin{pmatrix} a & c \\ -\bar{c} & \bar{a} \end{pmatrix} \mid a, c \in \mathbb{C} \right\}$$

με τις συνήθεις πράξεις πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού πινάκων αποτελεί ένα δακτύλιο διαίρεσης. Ο δακτύλιος  $\mathbb{H}$  καλείται ο δακτύλιος διαίρεσης των τετρανίων του Hamilton.

3. Έστω  $(R, +, \cdot)$  ένας δακτύλιος. Να δείξετε ότι το υποσύνολο

$$Z(R) = \{r \in R \mid r \cdot x = x \cdot r, \forall x \in R\}$$

είναι ένας υποδακτύλιος του  $R$ . Ο υποδακτύλιος  $Z(R)$  καλείται κέντρο του δακτύλου  $R$ . Για  $n \geq 2$  βρείτε το κέντρο του δακτύλου  $\mathbb{R}^{n \times n}$  των  $n \times n$  πραγματικών πινάκων.

4. Να προσδιοριστούν όλοι οι διαιρέτες του μηδενός των επόμενων δακτυλίων:

- (1)  $\mathbb{Z}_4$ ,
- (2)  $\mathbb{Z}_5$ ,
- (3)  $\mathbb{Z}_6$ ,
- (4)  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ ,
- (5)  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ .

5. Να προσδιοριστούν τα αντιστρέψιμα στοιχεία των επόμενων δακτυλίων:

- (1)  $\mathbb{Z}_{10}$ ,
- (2)  $\mathbb{Z}_{11}$ ,
- (3)  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_4$ ,
- (4)  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ ,
- (5)  $\mathbb{H}$ .

6. Έστω  $R$  πεπερασμένος δακτύλιος με μονάδα  $1_R$  και τουλάχιστον δύο στοιχεία. Υποθέτουμε ότι αν  $a, b \in R \setminus \{0\}$  τότε  $a \cdot b \neq 0$ . Δείξτε ότι ο  $R$  είναι δακτύλιος διαίρεσης.

7. Έστω  $R$  πεπερασμένη ακέραια περιοχή. Δείξτε ότι ο  $R$  είναι σώμα.

# Αλγεβρικές Δομές I (2018-2019)

## Φροντιστηριακές ασκήσεις #10

1. Έστω  $R, S$  δακτύλιοι με μονάδα και έστω  $f : R \rightarrow S$  ένας μη μηδενικός ομομορφισμός δακτυλίων. Να δείξετε ότι  $f(1_R) = 1_S$ , σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  - (1) Ο ομομορφισμός  $f$  είναι επιμορφισμός.
  - (2) Ο δακτύλιος  $S$  δεν έχει διαιρέτες του μηδενός.
2. Έστω  $R, S$  δακτύλιοι με μονάδα και έστω  $f : R \rightarrow S$  ένας ομομορφισμός δακτυλίων με την ιδιότητα  $f(1_R) = 1_S$ . Δείξτε ότι για κάθε αντιστρέψιμο στοιχείο  $x \in R$  το στοιχείο  $f(x) \in S$  είναι αντιστρέψιμο και ισχύει  $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$ .
3. Έστω  $R$  μεταθετικός δακτύλιος με μονάδα και  $1_R \neq 0_R$ . Δείξτε ότι ο  $R$  είναι σώμα αν και μόνο αν ο  $R$  έχει ακριβώς δύο ιδεώδη.
4. Έστω  $f : R \rightarrow S$  ομομορφισμός μεταθετικών δακτύλιων με μονάδα με την ιδιότητα  $f(1_R) = 1_S$ .
  - (1) Δείξτε ότι αν  $J$  ιδεώδες του  $S$  τότε το  $f^{-1}(J)$  είναι ιδεώδες του  $R$ . Επιπλέον δείξτε ότι αν το  $J$  είναι πρώτο ιδεώδες του  $S$  τότε και το  $f^{-1}(J)$  είναι πρώτο ιδεώδες του  $R$ .
  - (2) Δείξτε ότι αν  $f$  επιμορφισμός και  $J$  μεγιστοτικό (maximal) ιδεώδες του  $S$  τότε το  $f^{-1}(J)$  είναι μεγιστοτικό ιδεώδες του  $R$ .
  - (3) Έστω  $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$  η ένθεση. Δείξτε ότι η  $f$  είναι μονομορφισμός δακτυλίων. Βρείτε μεγιστοτικό ιδεώδες  $J$  του δακτυλίου  $\mathbb{Q}$  ώστε το  $f^{-1}(J)$  να μην είναι μεγιστοτικό ιδεώδες του  $\mathbb{Z}$ . Επίσης δείξτε ότι αν  $n \geq 2$  ακέραιος και  $I = n\mathbb{Z}$ , τότε το  $I$  είναι ιδεώδες του  $\mathbb{Z}$ , αλλά το  $f(I)$  δεν είναι ιδεώδες του  $\mathbb{Q}$ .
5. Να βρεθεί, για  $n \geq 2$ , η χαρακτηριστική των δακτυλίων
$$\mathbb{Z}_{15} \times \mathbb{Z}_{10}, \quad \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{15}, \quad \mathbb{Z}_n[x], \quad \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad (\mathbb{Z}_2)^{2 \times 2}.$$
6. (1) Έστω  $S$  υποδακτύλιος του δακτυλίου των ακεραίων  $\mathbb{Z}$ . Δείξτε ότι υπάρχει  $n \in \mathbb{Z}$  με  $S = n\mathbb{Z}$ . Άρα το  $S$  είναι ιδεώδες του  $\mathbb{Z}$ .  
(2) Βρείτε παράδειγμα υποδακτύλιου του δακτυλίου  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ , ο οποίος να μην είναι ιδεώδες του  $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ .
7. Έστω  $n \geq 2$ . Να βρεθούν όλα τα πρώτα και όλα τα μεγιστοτικά (maximal) ιδεώδη του δακτυλίου  $\mathbb{Z}_n$ .
8. Βρείτε όλα τα ιδεώδη  $I$  του δακτυλίου  $\mathbb{Z}_{12}$ . Για καθένα από αυτά να περιγράψετε τον δακτύλιο πηλίκο  $\mathbb{Z}_{12}/I$ , δηλαδή βρείτε γνωστό δακτύλιο με τον οποίο να είναι ισόμορφος ο δακτύλιος πηλίκο  $\mathbb{Z}_{12}/I$ .